



Projekt: Svenljunga naturvårdsplan 2015 - 2017

*Förstudie av naturvärdesobjekt Svenljunga kommun samt fältinventering
av prioriterade miljöer*

2018-01-11

Marcus Arnesson och Sandra Nilsson



Innehåll

Innehåll.....	2
Uppdrag.....	2
Svenljunga naturvårdsplan – förstudiedel	3
Metodik	3
Avvägningar under förstudien	5
Avvägningar i specifika områden	7
Prioriteringar inför fältinventering.....	7
Metod fältinventering.....	7
Naturvärdesinventering	8
Resultat fältinventering.....	10
Naturvärdesobjekt	10

Beställare: Svenljunga kommun

Projekt nr: 17107

Genomförande konsult: Ecocom AB

Uppdragsledare: Marcus Arnesson

Fältarbete: Marcus Arnesson, Sandra Nilsson, Joel Hallqvist och Sofia Nygårds

Övriga medverkande: Per Österman

Framsida, bildtext: Naturvärdesobjekt 897, rikligt med slåttergubbe i betesmark vid Boda

Fotograf: Marcus Arnesson och Sofia Nygårds

Uppdrag

Ecocom AB har fått i uppdrag av Svenljunga kommun att utarbeta underlag för en kommunal naturvårdsplan. Underlaget har tagits fram i två steg. Steg ett innebar att en förstudie (ej fältarbete) över hela kommunen utfördes, vilket resulterade i en heltäckande klassning av naturvärdesobjekt med klasserna 1, 2 och 3. Förstudiearbetet inkluderade även framtagande av en förslagslista på kommunala ansvarsarter. I steg två har fältinventering utförts av prioriterade naturvärdesobjekt.

Svenljunga naturvårdsplan – förstudiedel

Resultatet av den utförda förstudien levererades i oktober 2015 till Svenljunga kommun i form av en shapefil som inkluderade samtliga identifierade naturvärdesobjekt inom kommunen. I shapefilen finns objektspecifik information som geografisk avgränsning, naturvärdesklass samt en enkel beskrivning av objekten. I förstudien kartlades sammanlagt 1 087 naturvärdesobjekt som klassificerades enligt följande fördelning: 26 objekt med klass 1, 416 objekt med klass 2 samt 645 objekt med klass 3.

I uppdraget ingick även att ta fram en förslagslista på kommunala ansvarsarter (kandidatarter), vilken levererades i oktober 2015.

Metodik

Förstudien har genomförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) på förstudienivå. Den detaljeringsgrad som användes var översikt, vilket innebär en minsta obligatorisk karteringsenhet för ytor om 1 hektar och för linjeformade objekt längden 100 m och bredden 2 m. Inventeringsområdet utgjordes av hela Svenljunga kommun.

En förstudie, enligt metodiken för NVI, omfattar en analys av dokumenterad information som finns att tillgå om naturen i inventeringsområdet och som sedan ligger till grund för en preliminär naturvärdesbedömning samt avgränsning av potentiella naturvärdesobjekt.

Faktaunderlag

Kunskap om området inhämtades från bland annat ArtDatabanken, Skogsdataportalen, Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Jordbruksverkets databas TUVa och tidigare genomförda inventeringar i kommunen (tabell 1). Inventeringsområdet flygbildstolkades med infraröda flygbilder från år 2010–2011 med upplösningen 0,5 m/pixel i digital stereoutrustning. Dessutom studerades ortofoton från år 2014.

Med grund i flygbildstolkningen och övriga kunskapsunderlag avgränsades naturvärdesobjekt i inventeringsområdet. För varje objekt gjordes en naturvärdesbedömning. Bedömningen markerades som preliminär i de fall där tillräckliga data inte fanns tillgängliga för att göra en säker naturvärdesbedömning utan fältbesök.

Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förstudien naturvårdsplanen i Svenljunga kommun. De underlag som finns som digitalt GIS-skikt är markerade med ett 'x'.

Underlag	Källa	GIS-skikt
Artrapporter från Lomregistret (små- och storlom)	Kommunen	x

Underlag	Källa	GIS-skikt
Hasselmusinventering 2008	Kommunen	x
Artfynd (naturvårdsarter, inklusive rödlistade och skyddsklassade arter)	ArtDatabanken (Artportalen och Observationsdatabasen)	x
Tips om fågellokalerna/häckningar från VgOF	Kommunen	x
Naturvärdesinventering av Ätran och stränder 2006	Kommunen	x
Inventering av skyddsvärda träd och dess värdetrakter 2011–2014	Kommunen	x
Åtgärdsprogram för öring i Ätran och biflöden 2008	Kommunen	x
Skogsbruksplan för kommunens mark	Kommunen	x
Kommunala fastigheter	Kommunen	x
Vattenkemi – pH i sjöar	SLU, SMHI	x
VISS – övervakningsstationer, statusklassningar av vattenförekomster	Länsstyrelserna, Hav- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna	x
Naturanaturtypskartan	Naturvårdsverket	x
Inlandssandmarker från baskartering	Naturvårdsverket	x
Grus- och sandtag	Fastighetskartan	x
Sand- och grusjordar	SGU	x
SLU Skogskarta	SLU	x
Utförd avverkning	Skogsstyrelsen	x
Avverkningsanmälningar	Skogsstyrelsen	x
Skyddsvärda träd	Länsstyrelsen	x
Naturminnen	Naturvårdsverket	x
Djur- och växtskyddsområden	Naturvårdsverket	x
Biotopskydd odlingslandskap	Länsstyrelsen	x
Biotopskydd skog	Skogsstyrelsen	x
Ängs- och betesmarksinventeringen	Jordbruksverket	x
Nationellt värdefulla ängs- och hagmarker 1997	Länsstyrelsen	x
Ängs- och hagmarksinventeringen 1986–1991	Länsstyrelsen	x
Natura 2000-områden	Naturvårdsverket	x
Nationalparker	Skogsstyrelsen	x
Naturreservat	Skogsstyrelsen	x
Naturvårdsområden	Skogsstyrelsen	x
Naturvårdsavtal	Skogsstyrelsen	x
Nyckelbiotoper	Skogsstyrelsen	x
Nyckelbiotoper storskogsbruket	Skogsstyrelsen	x
Objekt med naturvärden	Skogsstyrelsen	x
Sumpskogsinventeringen	Skogsstyrelsen	x
Lövskogsinventering 1988	Länsstyrelsen	x
Myrskyddsplan 2007	Naturvårdsverket	x
Våtmarksinventeringen	Länsstyrelsen	x
Regionalt värdefulla odlingslandskap	Länsstyrelsen	x
Nationellt värdefulla odlingslandskap 1997	Länsstyrelsen	x
Riksintresse för naturvärden	Naturvårdsverket	x
Skogliga värdetrakter	Länsstyrelsen	x
Natur i Älvsborgs län	Kommunen	x
Fastighetskartan	Kommunen	x
Ortofoton 2014	Lantmäteriet	x
Infraröda flygbilder 2010–2011	Lantmäteriet	x
Sjöar i Älvsborgs län 1989	Länsstyrelsen	
Översiktsplan Svenljunga kommun	Kommunen	
Sand- och grusförekomster 1984	Kommunen	
Musselinventeringar 2011, 2012	Kommunen	
Inventering av vildbin i Mårdaklev 2013	Kommunen	
Restaurering av Ätran 2005	Kommunen	
Växtlokaler i Kalv	Kommunen	
Trädvårdsplan för särskilt skyddsvärda träd 2015	Kommunen	
Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011–2013	Länsstyrelsen	

Avvägningar under förstudien

Landskapsobjekt

Att identifiera landskapsobjekt och erhålla ett rättvisande underlag på landskapsnivå är tidskrävande och att enbart kartera ett antal stora objekt med flera olika naturtyper tillför inte kommunen någon användbar information. Bedömningen gjordes att det är mer effektivt att göra ytterligare analyser på landskapsnivå efter det att naturvärdesobjekten blivit slutligt bedömda. Inga landskapsobjekt identifierades därför i förstudien.

Avvägningar i olika naturtyper

Djup sjö och Grund sjö

Enligt svensk standard för NVI (SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) har alla mer eller mindre naturliga sjöar, som utsatts för liten till måttlig mänsklig påverkan, vanligtvis åtminstone påtagligt naturvärde. Onaturliga sjöar är till exempel sådana som är uppdämda eller dikade, vilket är mycket svårt att avgöra utifrån endast flygbilder. Mänsklig påverkan kan till exempel vara förurning, och i vissa fall bör sådan påverkan anses vara måttlig till stark. I Naturvårdsverkets handledning anges att pH under 5,6 är mycket surt. För en rättvisande bedömning bör man ta fram referensvärden för sjöar i kommunen.

Naturvärdesbedömningarna i förstudien utgick från bedömningar i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där dessa finns att tillgå. Sjöar som i VISS fått minst måttlig ekologisk status, bedömdes till minst påtagligt naturvärde. I de fall det finns data gällande förekomst av naturvårdsarter har detta vägts in i bedömningen, vilket i en del fall har höjt naturvärdesklassen.

Sjöar som inte är bedömda i VISS har generellt sett inte bedömts som naturvärdesobjekt. Andra data har i vissa fall medgett att sjöarna trots allt karterats, antingen om det finns data på förekomst av naturvårdsarter, eller om det finns mätvärden på pH efter år 2005. I nämnda fall har sjöar med pH över 6 inkluderats som naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde.

Myrsjöar

Myrsjöar ingår ofta i våtmarkskomplex och har därför naturvärden knutna till våtmarken som helhet. Myrsjöar har ofta stor betydelse för till exempel fågellivet, inte minst för vadare. När det finns en sjö eller göl i en myr är detta positivt för hela myrens fågelliv. Under förstudien karterades alla sjöar som ligger i en åtminstone delvis öppen myr som naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. Genom att inkludera alla myrsjöar undviker man att indirekt visa vilka sjöar som har häckande smålom, till skillnad från om endast häckningssjöar skulle inkluderas.

Vattendrag

Enligt standarden har alla mer eller mindre naturliga vattendrag som utsatts för liten till måttlig mänsklig påverkan normalt åtminstone påtagligt naturvärde. Bedömningar i VISS utgjorde utgångspunkten för naturvärdesbedömningen i förstudien, och vattendrag med minst måttlig ekologisk status inkluderades som naturvärdesobjekt. Andra underlag, som biotopkarteringar och artfynd, har i enstaka fall motiverat att vattendrag med otillfredsställande ekologisk status i VISS likväl bedömdes ha påtagligt naturvärde.

Mindre vattendrag, dvs sådana som endast utgörs av linjer på fastighetskartan och inte av ytor, har generellt sett inte tagits med som naturvärdesobjekt, även om de är bedömda i VISS.

Småvatten

Enligt standarden har de flesta småvatten åtminstone påtagligt naturvärde. Det är dock svårt att avgöra naturvärdet utifrån flygbilder, och dessutom är småvatten per definition mindre än 1 ha vilket är den nedre gränsen för vad som behöver identifieras med detaljeringsgrad översikt. Generellt har därför småvatten inte karterats som naturvärdesobjekt. Ett undantag är korvsjöar längs Ätran. Ätrandalen är ett landskap med värden knutna till vattenmiljöer och kan anses utgöra ett viktigt spridningsområde för organismer knutna till dessa miljöer. Korvsjöar har uppkommit på ett naturligt sätt, och har således åtminstone visst biotopvärde. Eftersom korvsjöarna ligger i Ätrandalen, kan man förvänta sig att de innehåller naturvårdsarter, och följaktligen att de har åtminstone visst artvärde. I förstudien klassades därför alla korvsjöar längs Ätran till påtagligt naturvärde.



Naturvärdesobjekt 375 utgörs av en mycket artrik slåtteräng som hävdas på traditionellt vis genom slåtter med lie och hässning av slaget ängshö. Arealen slåtteräng har minskat drastiskt under 1900-talet, och det är viktigt att bevara de rester av naturtypen som ännu hävdas. Naturvärdesobjekt 375 var ett av få objekt som erhöll högsta naturvärde, klass 1. Objektets höga naturvärden är framförallt knutna till den mycket artrika kärlväxtfloran med flera rödlistade arter.

Myr

Karteringen av myrar har utgått från gränser i våtmarksinventeringen, där flera objekt utgörs av åtskilda delytor. Under förstudien eftersträvades att behålla detta upplägg, så att hydrologiska enheter ingår i samma naturvärdesobjekt. Det finns ett värde i att ett myrkomplex innehåller både öppna ytor, sumpskogar och fastmarkholmar. Om det

uppenbart finns mänsklig påverkan i någon del, t ex en torvtäkt eller en skogsväg som påverkar hydrologin, har begränsade områden ritats bort från objekten.

Skog och träd

Nyckelbiotoper som utgörs av enskilda ädellövträd (t ex vid Bocksbol-Boda) har inte bedömts utgöra naturvärdesobjekt, på samma sätt som enskilda skyddsvärda träd inte tas med som naturvärdesobjekt. Om det däremot i ett litet område, exempelvis vid en kyrkogård, förekommer ett flertal skyddsvärda träd (storleksordningen 10–20 träd) har detta bedömts utgöra ett naturvärdesobjekt.

Avvägningar i specifika områden

I riksintresseområdet Vassjögården ligger ett antal sjöar, som är s k dödissjöar. Dessa sjöar har inte bedömts utgöra naturvärdesobjekt eftersom data om naturvärden saknas, förutom obekräftade uppgifter om fåglar. Att ett område ligger inom ett utpekad riksintresse motiverar således inte i sig att det ska ingå som ett naturvärdesobjekt.

Vid Lalarp ligger en anlagd våtmark som bedömdes nå naturvärdesklass 3. I närheten ligger ett fågeltorn, och det finns en del observationer av rödlistade arter, dock främst tättingar. Inget tyder på att området utgör någon särskilt viktig häckningsbiotop för (rödlistade) vadare.

Kring Ätran har det under år 2006 gjorts en naturvärdesinventering. Naturvärdesobjekten som har karterats i denna studie följer i stora delar bedömningarna i 2006 års inventering, men för vissa objekt har en annan bedömning gjorts utifrån tillgängliga underlag. Eftersom inventeringen gjordes för tio år sedan kan det förväntas att vissa förändringar har skett i området.

Prioriteringar inför fältinventering

I dialog med Svenljunga kommun bestämdes följande prioriteringsordning för fältarbetet 2016 - 2017:

1. Naturvärdesobjekt på kommunala fastigheter
2. Klass 2-objekt där det kan förekomma kandidatarter och som ligger i intressanta landskap - företrädesvis ängs- och betesmarker
3. Objekt med myrmark med potential att hysa höga naturvärden knutna till barrskogsmiljöer

Metod fältinventering


Fältinventering genomfördes av Marcus Arnesson och Sofia Nygårds, Ecocom AB, 2016 samt av Marcus Arnesson, Sandra Nilsson och Joel Hallqvist, Ecocom AB, 2017. Vid fältinventeringen användes främst handdator av modellen Getac PS236/PS336. Inventerade objekt digitaliserades i fält med ArcPad 9.3 samt med Collector for ArcGIS. Justeringar av de digitaliserade objekten gjordes därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid fältinventeringen utgjordes av Terrängkartan och ortofoto.

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält under maj-september 2016 samt under september-november 2017. Metodiken följer svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014). För fältinventering av ängs- och betesmarker användes detaljeringsgrad *detalj*, vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 10 m², och för linjeformade objekt längden 10 meter och bredden 0,5 meter. För övriga naturtyper utfördes fältinventeringen med detaljeringsgraden *översikt*, vilket innebär en minsta obligatorisk karteringsenhet för ytor om 1 hektar och för linjeformade objekt längden 100 meter och bredden 2 meter. Inventeringsområdet utgjordes av hela Svenljunga kommun.

Inventeringen innefattar följande tillägg enligt NVI 4:5:

- 4.5.3 Generellt biotopskydd
- 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst




Figur 1. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000:2014

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom ett avgränsat utredningsområde identifiera och dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Områdena avgränsas som naturvärdesobjekt och bedöms med avseende på naturvärde enligt följande skala; 1. högsta naturvärde, 2. högt naturvärde och 3. påtagligt naturvärde. En fjärde, klass 4 visst naturvärde, kan användas som ett tillägg, vilket dock inte gjordes vid denna inventering.

Ett naturvärdesobjekt ska domineras av en naturtyp och tilldelas en gemensam naturvärdesklass. En sammanvägning av förekomsten av arter och förekomsten av värdefulla biotoper leder till en viss naturvärdesklass enligt en fastställd matris (figur 1). Artvärdet omfattar en bedömning av förekomst av naturvärdsarter (typiska arter, signalarter och

ansvarsarter), hotade arter, rödlistade arter och relativ artrikedom. De artvärdesaspekter som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen.

Biotopvärdet avgörs genom en samlad bedömning av olika kvalitetsfaktorer samt sällsynthet och hot. Biotopkvaliteter kan exempelvis vara förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms i ett regionalt, nationellt samt internationellt perspektiv och är kopplad till biotopens bevarandestatus. De biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen i figur 1.



Slättergubbe Arnica montana är en rödlistad art som klassas som hotad (VU). Slättergubbe är relativt spridd i Svenljunga, men sett till hela landet är arten kraftigt minskande. Bilden visar en ängshumla som besöker en slättergubbe i naturvärdesobjekt 257 vid Fjärhestra.

4.5.3. Generellt biotopskydd

Generellt skyddade biotoper utgörs av vissa lätt identifierbara småbiotoper som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet. Följande småbiotoper ingår i det generella biotopskyddet: Allé (enkel eller dubbel om minst fem lövträd), odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, åkerholme, källa i jordbruksmark, småvatten och diken i jordbruksmark samt pilevall. Vid inventeringen i Svenljunga kommun har element som ingår i det generella biotopskyddet lokaliserats till specifikt naturvärdesobjekt, mer detaljerad information har ej registrerats.

4.5.5. Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget *detaljerad redovisning av artförekomst* innebär att förekomster av naturvårdsarter ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet av 10–25 meter, undantagsvis har noggrannheten varit 100 meter. Detta innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje påträffad förekomst redovisas med noggrannhet. Arter som ingår i detaljerad redovisning i föreliggande inventering är: rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter. Rödlistade arter kategoriseras enligt: *Akut hotad* (CR), *Starkt hotad* (EN),

Sårbar (VU) och *Nära hotad* (NT). De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut.



Backtimjan Thymus serpyllum är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Arten finns i små förekomster i flera betesmarker inom Svenljunga kommun. I betesmarker där hävden försvagas eller upphör påverkas backtimjan negativt av att mer högvuxen vegetation konkurrerar ut arten. Bilden är från naturvärdesobjekt 205 vid Påvarp.

Resultat fältinventering

I fältinventeringen 2016 ingick 33 objekt som är belägna på kommunens mark samt 109 objekt som utgjordes av prioriterade ängs- och betesmarker. Inventeringen resulterade i att sammanlagt 143 naturvärdesobjekt bedömdes uppnå klass 1,2 eller 3. Ett fåtal objekt bedömdes inte uppnå någon av de nämnda klasserna, samtidigt tillkom några nya objekt genom att objekt med skiftande naturtyper med fördel kunde delas i olika objekt.

I fältinventeringen 2017 ingick 44 objekt där samtliga bedömdes uppnå klass 1, 2 eller 3. Lokalisering samt objektspecifik information om samtliga objekt finns tillgänglig i shapefiler i projektionen Sweref99 13 30. I samma koordinatsystem finns även information om påträffade naturvårdsarter. Minst två fotografier från varje naturvärdesobjekt finns tillgängliga för användning.

Objekts-id följer den numrering som angivits i förstudien. Av denna anledning har de fältinventerade objekten inte en komplett numerisk ordning.

Naturvärdesobjekt

Nedan följer en redovisning av samtliga naturvärdesobjekt. Detta inkluderar en kort beskrivning av objektet och dess värden. Angivet finns också aktuell naturvärdesklass samt påträffade naturvårdsarter och element ingående i det generella biotopskyddet. Objekt med asterisk har besökts i fält.

Naturvärdesobjekt 3

Vid Hinnared ligger en gran- och björksumpskog med litet inslag av tall, asp, rönn och ek. Rikligt med död ved i form av högstubbar, lågor och torrträd förekommer. En bäck rinner genom skogen. Objektet har tidigare inventerats i nyckelbiotopsinventering.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 5

Lasjön ligger i åkermark mellan Bränngårde och Torsered. I väster omges sjön av skogsmark som är avverkad. Sjön är mycket värdefull för fågellivet. Gulspurv (VU), sävsparv (VU), stare (VU), spillkråka (NT), ängspiplärka (NT), hussvala (VU), buskskvätta (NT) och sånglärka (NT) har noterats inom objektet.

Area: 13,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): gulspurv (VU), sävsparv (VU), stare (VU), spillkråka (NT), ängspiplärka (NT), hussvala (VU), buskskvätta (NT), sånglärka (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 9

Norr om Högalid ligger ett ädellövskogsbestånd beläget på en udde vilket domineras av bok i en svagt kuperad sydslutning ner mot Såken. Området genomdras av fuktstråk. Klen till medelgrov bok dominerar med inslag av ek, björk och lönn. Enstaka grova-mycket grova träd förekommer. Objektet är ett Natura 2000 område och omfattas av ett naturvårdsavtal. Ett kalhygge kantar objektet i väst.

Area: 15,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 16

Norr om Skedskamma ligger en gransumpskog med inslag av vårtbjörk, klibbal och tall. Granlångor, högstubbar och rotvältor förekommer tämligen allmänt. Spår av lövträdssocklar av klibbal finns också. Ett fuktstråk kantar i norr vilket troligtvis är ett dike eller ett uträtat vattendrag. Viss negativ påverkan förekommer från omgivande avverkningar samt väg vilken kantar området. Objektet omfattas av biotopskydd och skogstrappmossa (NT) har noterats.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): skogstrappmossa (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 18

Vid Påtebo finns en aspskog med inslag av gran. Även litet inslag av björk, al, rönn, lönn och sälg samt enstaka gamla grova aspar förekommer. Död ved finns i begränsad omfattning. Olivbrun gytterlav (NT) har noterats inom objektet. Objektet inventerades under lövskogsinventeringen.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 20

I närheten av Skedskamma ligger en lövskogslund som domineras av klibbal och asp. Här finns en rik förekomst av skrymslen och värdefull kryptogamflora. Området är översilat. Stengärdesgård förekommer. Skogen kantar jordbruksmark och i närområdet ligger flera gårdar. Guldlocksmossa och lunglav (NT) har noterats inom objektet. En ask har noterats i området vid inventeringen av skyddsvärda träd och en kommentar var att en insats kan behöva göras inom 3–10 år. Objektet har inventerats under lövskogsinventeringen.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): guldlocksmossa, lunglav (NT),

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 23

I närheten av Skedskamma finns en klibbalsumpskog med stort inslag av gran och björk samt enstaka tall. Socklar och död ved förekommer rikligt. Även rik förekomst av tickor. Åkrar kantar området, och närområdet är präglad av jordbruksmark. Objektet klassades som klass 3 under lövskogsinventeringen.

Area: 2,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 25

I närheten av Skedskamma ligger en gransumpskog med inslag av klibbal, tall och vårtbjörk. Stillastående vatten förekommer. Gamla senvuxna granar är allmänt förekommande, liksom alsocklar och granlågor. Omgivningen är präglad av skogs- och jordbruk, och objektet kantas av hyggen åt flera håll. Objektet var inkluderat i sumpskogsinventeringen.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 27

Norr om Hillared, nära sjön Såkern, ligger en lövängsrest vid ett gammalt torp. Här står gamla askar med spår av hamling. Även gran, vårtbjörk, lind, rönn och asp förekommer. Närområdet är präglad av skogsbruksmark och avverkning har skett åt alla håll runt om. Objektet har inventerats som en nyckelbiotop. Läderlappslav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats inom objektet.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), grynig filtlav (NT),

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 28 och 42

Objektet utgörs av en lövängsrest och lövskog med inslag av hamlade träd i den södra delen. Ask, ek, gran, enstaka säl, rönn, vårtbjörk och apel förekommer liksom grov gammal ask förekommer. I buskskiktet finns glest med brakved och fältskiktet är av frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp. Objektet är en nyckelbiotop (objekt med naturvärden), har skyddsvärda träd samt klassades som klass 3 under lövskogsinventeringen. Arter som lunglav (NT), almlav (VU) och grynig filtlav (NT) har noterats inom objektet.

Area: 0,2 ha och 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), almlav (VU), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 29 *

Väster om Mostorp ligger ett varierat naturvärdesobjekt där den dominerande naturtypen är skogsbevuxen myr. Klibbalsumpskog, lövsumpskog med inslag av barr samt gransumpskog med 120-åriga träd finns även. Allmänt med död ved i form av lågor förekommer, liksom vindfällan och torrakor i olika nedbrytningsstadium (nydöd och murken ved). Påtagligt med död ved finns i vissa partier. Trädskiktet har åldersvariation och gamla tallar förekommer (150–200 år), samt gamla träd av björk, klibbal och gran. En bäck rinner igenom objektet (i kanten), bäckdråg går genom objektet (naturlig hydrologi) och flera myrgölar påträffas. Rikligt med missne växer i de blötare partierna, men även kärrsilja, kärrtistel, vitag, tuvull, kråkbär, lingon, blåbär, klocklång, och ljung hittas. Flera naturvårdsarter som västlig hakmossa, stor revmossa, tjäder, långfliksmossa, brunpudrad nållav (NT), blåmossa och revlumner noteras inom objektet. Vitmossor, eldticka, alticka, violticka, knölticka, fnösketicka, björkticka, klibbticka, stinkmussling, gammelgranslav, gullhorn och vargmjolk finns. Objektet är även VMI klass 2.

Area: 17,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, stor revmossa, tjäder, långfliksmossa, brunpudrad nållav (NT), blåmossa, revlumner

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 31 *

Objektet utgörs av en blandsumpskog vid Nättlebo med klibbal, gran, sälg, asp, ek, björk och rönn. En liten bäck rinner genom objektet. Död ved förekommer allmänt. Gamla grova exemplar av ask och lind nära gården ingår i objektet. I vissa av ädellövträden finns utvecklade håligheter.

Skötselöverslag: För att gynna naturvärden bör området få utvecklas relativt fritt. Det är dock positivt om gran försiktigt huggs bort, till fördel för övriga trädslag. Undvik åtgärder som riskerar att dränera området.

Area: 1,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: almlav (VU), rostfläck, guldlocksmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa, missne, svarta vinbär, bäckbräsma

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 32

Fegen är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Fegen har en varierad strandkontur med små grunda skyddade vikar och utskjutande uddar sam ett 70-tal öar och skär. Sjön är näringsfattig, och av stor betydelse för bl a fågellivet. Fegen är ett naturreservat, Natura 2000 område och riksintresse för naturvård. Arter som skaftslamkrypa (EN), flytsäv (VU), sjötåtel (VU), strandlummer (NT).

Area: 1616,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: skaftslamkrypa (EN), flytsäv (VU), sjötåtel (VU), strandlummer (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 34 *

Objektet utgörs av ett större myrkomplex med variation, i närheten av Mostorp, bl.a med inslag av blåttåteläng, öppen myr, och holme med yngre gran, men största delen av området är skogsbevuxen myr dominerad av tall. I norr finns en liten lövsumpskog med översilningskärr. Myrarna Lomsjön och Trollsjön ingår i objektet. Jämnt med tall, inslag av björk och gran förekommer. Även brakved och klibbal finns i små mängder. Allmän förekomst av torrakor, men högstubbar och lågor finns. Äldsta träd är 100–150 år, och vissa bestånd är relativt jämnåriga. I markskiktet hittas borsttåg (NT), hjortron, knapptåg, lingon, blåbär, klockljung, ljung, kråkbär, tuvull, rosling, blåttåtel och pors. I blötare partier hittas även vattenklöver, flaskstarr, trådstarr, hundstarr, revlummer, kråklöver, sjöfräken, topplösa, kärrviol, vitag, kärrsilja och kallgräs. Bottensiktet innehåller bl.a väggmossa, vitmossor (bl.a granvitmossa) samt renlav. Även gammelgranslav, blåmossa, västlig hakmossa, svart spiklav och björkticka finns. Objektet är även VMI klass 2.

Främmande arter som kanadensiskt gullris och blomsterlupin påträffas i närområdet. Direkt påverkan av järnvägsvall och intilliggande skogsväg, samt dikning och intilliggande kalhyggen.

Area: 4,0 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: blåmossa, västlig hakmossa, borsttåg (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 36 *

Objektet utgörs av en betesmark vid Ekebo som är glest bevuxen av lövträd och buskar. Vissa delar slås med maskin. Gamla lövträd och storvuxen hassel finns. Ytor som slås har en trivial flora. På andra delar finns en hävdgynnad flora med arter som hirsstarr, ängsvädd, liten blåkllocka, stagg, prästkrage, gökärt, vårbrodd och backtimjan (NT). Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. Närområdet är präglat av jord – och skogsbruk samt att Ätran passerar objektet i den sydöstra kanten.

Area: 4,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: krushättemossa, backtimjan (NT), buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse.

Naturvärdesobjekt 37

Nordöst om Frackebo ligger en blandsumpskog med gran, glasbjörk, klibbal samt enstaka tall. Stort inslag finns av senvuxna träd. Döende träd, högstubbar och lågor förekommer sparsamt. En bäck rinner genom området. Omgivningen präglas av skogs- och jordbruk, och avverkningar har skett i anslutning till objektet.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 38 *

Väster om tätorten Hillared rinner Lillån som är ett varierat vattendrag omgivet av lövskog bestående av klibbal, sälg, hägg, lönn, asp, björk och rönn. Trädsiktet innehåller allmänt gamla träd och död ved, och här finns vedsvampar som alticka och kantöra. Vattendraget har höga biotopvärden knutna till en meandrande sträckning med strukturer som block, grusbottenar, sandbottenar, strömmande partier och djuphålur. Sydväst om Lillån breder svämplanet ut sig och ingår i en större betesfålla som delvis är bevuxen av björk och klibbal. Närmast vattnet växer vasstarr, bunkestarr, blåstarr och sjöfräken. Längre från ån finns fuktängsvegetation med hirsstarr, stagg, blodrot och ängsvädd.

Skötselförslag: För att gynna naturvärden bör området närmast Lillån bevaras som en intakt lövridå, och det är viktigt att ingrepp undviks i detta område. Biotoprestaurering i form av tillskapandet av lekbäddar för öring har utförts i Lillån. Det är positivt om fler åtgärder som ökar variationen i vattendraget utförs. I objektets sydvästra del, som betas, finns viss igenväxning av främst ung björk. Viktigt är att beteshävden kan fortgå samt att insatser vidtas som tar bort ung björk och hindrar ytterligare igenväxning.

Area: 6,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: krushättemossa, svarta vinbär, rankstarr, nattviol

Generellt biotopskydd: odlingsröse



Kommunen har gott om värdefulla vattendrag med höga naturvärden knutna till både vattenmiljön och närliggande kantzoner. Bilden visar Lillån som rinner genom naturvärdesobjekt 38. Biotopvårdande åtgärder har utförts i form av tillskapande av lekbädd för öring.

Naturvärdesobjekt 39 *

Vid Pjukabo ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr, med en liten del öppen myr och sumpskog. Trädsiktet är blandat med gran, tall, löv (främst björk) och någon en. Objektet har allmänt med död ved, både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier. Flera tallar är 125 – 135 år, och förnygring sker främst av gran. Vegetationen innehåller revlumner, tuvull, odon, väggmossa och lingon. Även klibbticka och björkticka hittas. Objektet är något dikat vilket har lokal påverkan.

Area: 7,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: revlumner

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 41 *

Objektet utgörs av en svämlövskog med dominans av klibbal söder om Hillareds samhälle med bitvis stort inslag av gran, längs Ätran och dess biflöden. Frodig flora med arter som majbräken, strandklo, kabbeleka, bunkestarr, flasstarr, palmmossa samt flera olika signalarter förekommer. Objektet är uppdelat i tre delobjekt. Ätran är stillaflytande samt svagt strömmande på några kortare sträckor inom området.

Skötselöverslag: I den nordöstra delen av objektet har en hel del träd tagits ned intill ån. Det är viktigt att avverkning undviks i möjligaste mån och att en intakt lövridå kan bevaras närmast Ätran. Däremot kan de promenadstigar som löper längs vattendraget finnas kvar och bitvis förstärkas. Granskogen närmast ån är ung-medelålders och saknar särskilda naturvärden. Särskilt i det södra delobjektet bör en försiktig plockhuggning av gran utföras, så att lövträd får möjlighet att växa upp på platsen. I övrigt bör området få utvecklas relativt fritt.

Area: 2,9 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: krushättemossa, rankstarr, strutbräken, svarta vinbär, kärrfibbla, smörboll, nattviol, västlig hakmossa, bäckbräsmå, trubbfjädersmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 43 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark i östsluttning vid Bäckhagen. Varierande träd- och buskskikt förekommer. Enstaka äldre ekar finns, i övrigt dominerar medelålders tall, björk och en. Floran är artrik med växter som blåsuga, prästkrage, ängsvädd, blodrot, liten blåklocka, gökärt, slåttergubbe (VU), stor blåklocka och backtimjan (NT). Örnbräken förekommer på vissa partier i den södra delen av objektet.

Area: 4,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), fällmossa

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 45

Öster om Ätran, norr om Veka, finns ett större område som betas med nötdjur. Området är omväxlande med öppna gräsmarker ned mot ån och små kullar bevuxna med medelgrov ek, björk, rönn, tall, gran och hassel. I fältskiktet förekommer bl a ängsvädd, gökärt, svinrot och vårbrodd. Objektet inventerades under ängs – och betesmarksinventeringen.

Area: 3,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 46 *

Objektet utgörs av igenväxande torr betesmark strax sydväst om Hillareds kyrka som inte betats på flera år. Floran innehåller flera hävdindikatorer som exempelvis ängsvädd, ängshavre, liten blåklocka, gökärt och blodrot samt vanlig backsippa (VU). En långsam igenväxning pågår vilket resulterat i ett jämnt utställt trädskikt med björk, tall, gran, en samt hallon och lövsly.

Skötselöförslag: Det är viktigt att hävden återupptas, antingen genom årlig slåtter eller med betesdjur. Det bör även genomföras en försiktig röjning av gran, lövsly, hallon och enstaka uppvuxna träd. Det är också viktigt att röjningen inte blir för kraftig eftersom det kan leda till mycket stor tillväxt av lövsly, hallon och andra oönskade arter.

Area: 0,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 47 *

Objektet utgörs av Lockrydsmossen som är glest bevuxen av senvuxen tall och delvis helt öppen. Vegetationen domineras av vitmossor, tuvull, tranbär, kråkbär, dystarr, trådstarr, snip och vitag. Rikkärtsarter som axag och nålstarr finns i sydost. I den sydöstra delen finns det bitvis även gott om bladvass. I den västra delen ingår ytor som tidigare kan ha odlats, men som på grund av igenväxta diken nu blivit helt försumpade. Vattenavrinningen sker åt öster, och utloppet i den östra delen, Lockrydsmossen, bär spår av äldre ingrepp i form av dike. Enkelbeckasin häckar i objektet.

Skötselförslag: Förtätning av vedartad vegetation sker över stora delar av mossen, bland annat i den sydöstra delen där det finns rikkärtsvegetation. För att bevara öppenheten i området med rikkärtsvegetation (söder om utloppet) bör manuell röjning av uppväxande träd göras i detta område. Ängsstarr och borsttåg (NT) är kända från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 57,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 53

Strax väster om Kristinelund ligger en sekundär ädellövnaturskog med rikligt av död ved. Bok dominerar liksom ek. Inslag av gran, björk, rönn och asp finns även. Gammal bok är sparsamt förekommande. Håligheter och mulm förekommer. Västlig njurlav (VU) och lunglav (NT) har noterats och objektet har klassats som klass 3 i lövkogsinventeringen. Omgivningen präglas av skogsbruk och avverknings har skett i anslutning till området.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): västlig njurlav (VU), lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 55 *

Objektet består av trädklädd betesmark vid Lockryd med varierat trädskikt som till stor del utgörs av ask och lönn. Men det förekommer även ek, tall, rönn, sälg, gran och vildapel. Hålträd och gamla träd förekommer allmänt, även solbelyst död ved finns spritt. Byggnadsgrunder finns. Fältskiktet är delvis näringspåverkat och hyser växter som hallon, smörblomma, brännässla och ängssyra. Betestrycket är relativt svagt och hävdgynnade arter förekommer endast fläckvis.

Skötselförslag: Det är viktigt att beteshävdan fortsätter och gärna intensifieras. Områdets värden är främst knutna till lövträd, både levande och döda. Det är därför betydelsefullt att området regelbundet röjs så att igenväxningsvegetation trycks tillbaka och de äldre lövträden i området gynnas och får tillräckligt med solljus och utrymme.

Area: 1,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: sydlig blekspik (EN), krushättemossa, lönnlav

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 57 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Ledsgården som är helt öppen med undantag av enstaka ask, tall, en och gran. Marken innehåller fuktiga partier med växter som tuvtåtel, veketåg, älggräs och ryltåg. I övrigt förekommer arter som vitklöver, smörblomma och krusskräppa samt även hävdgynnade arter som hirsstarr, liten blåklocka, gråfibbla, käringtand, blodrot och gökärt. Grova askar med värdefull kryptogamflora växer i anslutning till den norra delen av objektet. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: guldlockmossa, lönnlav, sydlig blekspik (EN)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 59 *

Norr om Åkerhuset ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr och öppen myr som delvis håller på att växa igen. Även två myrgölar hittas bl.a st. Lommagölen. Myren är svagt sluttande. Trädsiktet domineras av tall, ca 110 år, men inslag av gran och björk finns. I det södra området påträffas även två myrgölar. Död ved förekommer sparsamt och då främst torrakor. Vegetationen består av bland annat tuvull, klockljung och renlav. Objektet fortsätter utanför kommungränsen. Ett dike korsar objektet och löper ut i en av gölarna och avverkning har skett i anslutning till objektet.

Area: 10,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 61

Nordväst om Bålared ligger en sekundär lövnaturskog i en sluttning ned mot en myr. Ek dominerar med stort inslag av asp och gran samt enstaka rönn, björk, bok, sälg och tall. Gamla aspar finns tämligen allmänt och död ved i måttlig mängd. Odlingsrösen förekommer. Omgivningen är präglad av skogsbruk, men väster om objektet finns ett större område med myr och fuktig mark.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 63 *

Nordöst om Bålared ligger ett varierande objekt med skogsbevuxen myr och två myrgölar där området ansluter till Porssjön i nordväst. I den södra delen finns skogsbevuxen myr med ren tallskog och åldersvariation. Övriga objekt har mer inslag av björk och gran. En stor del av objektet har gamla träd bl.a. tallar ca 250 år samt mycket gammal och grov död ved. Här hittas även naturligt öppna gläntor från fallna träd.

Vegetationen innehåller bland annat tuvull, lingon, blåbär, klockljung och kråkbär.

Även bitterticka, långfliksmossa, vågbandad barkbock och dallergröppa påträffas.

En väg korsar objektet i den västra delen och flera diken finns. I vissa delar kantar även objektet kalhyggen.

Area: 32,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 65 *

Objektet är varierande med skogsbevuxen myr, blandsumpskog, fuktstråk med blåtåtel och tre myrgölar med gungfly. I den västra delen påträffas även ett naturligt bäckflöde, och även mellan myrgölarne hittas naturligt vattenflöde. Andelen död ved varierar och i vissa delar förekommer det rikligt och i olika nedbrytningsstadier och grovlek, medan det i övriga områden förekommer mer sparsamt. Trädsiktet består av tall, björk och gran. Stor del av tallarna är yngre och äldre med träd över 200 år, dock saknas medelålders träd.

Vegetationen innehåller bland annat tuvull, vitmossa och kråkbär. Även småmussling, öronmussling, stor revmossa, västlig hakmossa, blåmossa, eldticka, brödticka, klibbticka, fnösketicka och björkticka hittas.

En väg kantar objektet och dikning har skett, vilket ger lokal påverkan. Objektet kantar även till viss del kalhygge.

Area: 19,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: stor revmossa, västlig hakmossa, blåmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 66

Objektet utgörs av bokskog med naturskogsqualiteter nordöst om Björkekulla, med enstaka björk och gran. Senvuxna träd förekommer tämligen allmänt, och högstubbar och lågor sparsamt. Området har en värdefull kryptogamflora. Fältsiktet, där det förekommer, är av torr gräs-ristyp. Klosterlav (VU), rosa lundlav (VU), bokvårtlav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats inom objektet. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3. Omgivningen är präglad av jordbruk, och skogsbruk förekommer in på objektet.

Area: 1,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): klosterlav (VU), rosa lundlav (VU), bokvårtlav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 67

Objektet utgörs av betesmark vid Frackebo med bitvis ganska slutet trädskikt, men öppna partier förekommer. Det är svagt hävdad. Torr-frisk mark med fårsvingel, gullris, knägräs, liten blålocka, stagg, vårbrodd och ängsvädd. I trädskiktet dominerar ek och bok.

Area: 1,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 69

Vid Sönsås ligger en välhävdad betesmark med flera skyddsvärda träd: ek samt ask med spår av hamling. Även grövre bok finns och fäll- och guldlocksmossa hittas på ask. Området delas av en väg. Mosaik av torrare kullar med mager flora och mer kväverik mark förekommer. Bockrot, knägräs, ärenpris och skräppor finns. Objektet har klassats som klass 3 i lövskogsinventeringen. Jord- och skogsbruk präglar området vilket även kantar objektet.

Area: 6,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa, guldlockmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 77

Öster om Mellantorpet ligger en sekundär ädellövskog på en kulle. Trädskiktet domineras av ek och gran, med inslag av asp samt enstaka rönn och vårtbjörk. Senvuxna och döende träd förekommer sparsamt, liksom död ved, både liggande och stående. Lunglav har tidigare noterats inom objektet. Öster om objektet ligger en grustäkt, och omgivningen består till stor del av jord- och skogsbruksmark.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 78 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Picke glest bevuxen av tall, björk och vildapel. Marken är uppdelad i fållor som betas med häst. Vissa ytor är hårt betade medan vissa steniga partier inte alls betas. I fältskiktet finns arter som vitklöver, stenmåra, rölrika, ängsvädd, blodrot, gullris. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,6 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 79

Söder om Gåsekila ligger en källpåverkad granskog intill Ätran. Inslag finns av tall, asp, ek, rönn och vårtbjörk. Enstaka gammal ek med håligheter, samt grannlågor förekommer. Objektet kantar skogsplanteringar, hyggen och till viss del även jordbruksmark.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 80

Mellan Gåsekila och Mellantorpet ligger en sekundär ädellövnaturskog med rikligt av grova träd. Ek dominerar, även asp, gran samt enstaka bok, rönn, sälg, lind, björk och klibbal finns. Gammal asp förekommer tämligen allmän, med bohål. Lågor är sparsamt förekommande. Lunglav har tidigare noterats inom objektet. Ätran rinner förbi i öster och norr, i väster finns jordbruksmark och en grusstäkt.

Area: 5,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 86

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog nordöst om Nättsjö, som domineras av asp med inslag av ek och glasbjörk samt enstaka gran, sälg, bok och rönn. Gammal asp finns allmän, och gammal sälg sparsamt. Enstaka lågor sparsamt förekommande. En väg korsar objektet. Omgivningen präglas av skogs- och jordbruksmark. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 88 *

Objektet utgörs av betesmark bestående av sandig sluttning vid Buttorp intill Ätran. Även frodig bård med klibbal närmast vattnet ingår. Här växer kärrfibbla, backbräsa, älgört och rankstarr. Den norra delen är välhävdat, medan större delen är svagt betad med utbredning av hundäxing samt högvuxen starr närmare Ätran. På de välbetade delarna finns en hävdgynnad flora med arter som bockrot, liten blåklocka, gulmåra, åkervädd, ängsvädd, blåmunkar, svinrot och käringtand. Sandblottor förekommer på några platser i sluttningarna. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: rankstarr, bäckbräsa, kärrfibbla, grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 92

Objektet utgörs av ohävdad, halvöppen betesmark vid Joarsbro intill Fegens strand. I fältskiktet märks knägräs, stenmåra, svartkavle, ängsvädd och örnbräken. Skogsbruk förekommer i omgivningen men betesmarken tillhör ett komplex av flera betesmarker som sträcker sig norrut.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 95 *

Objektet utgörs av öppen slåtteräng vid Krukatorpet som kantas av gamla lönnar och askar med värdefull kryptogamflora. Svinrot dominerar ängen, men även många andra hävdgynnade arter frodas, exempelvis slåttergubbe (VU), blodrot, prästkraze, åkervädd, liten blåklocka, gökärt, rödklöver, åkervädd, vårbrodd, svartkämpe och ängsskallra. Mindre ytor med högvuxna örter förekommer också.

Area: 0,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grynig filtlav (NT), slåtterfibbla (VU), fällmossa, vitskivlav, almlav (VU)

Generellt biotopskydd: allé

Naturvärdesobjekt 97

Norr om Svanabo ligger en välhävdad halvöppen-öppen betesmark vid Nordre Svansjöns östra strand. Ek förekommer i trädsiktet. Jord och skogsbruk förekommer i närområdet. Rödlänke har tidigare noterats.

Area: 3,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): rödlänke (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 98

Objektet utgörs av ädellövskog vid Götshult med grov bok och ek. Inslag av lind, lönn, asp, rönn, björk, gran och klibbal finns. Gamla aspar, ekar och bokar är sparsamt förekommande. Död ved finns i måttlig mängd. Hassel förekommer i buskskiktet, och fältskikt är av torr ört-typ. Lunglav (NT) har tidigare noterats inom objektet. Omgivningen består till största delen av skogsbruk, men flera ädellövskogar förekommer.

Area: 3,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 99

Objektet utgörs av ädellövskog vid Götshult mot Kalvsjöns östra strand. Ek dominerar över bok, och enstaka lind förekommer. Gamla ekar är allmänt förekommande, liksom gammal bok och lind. Håligheter och mulm finns sparsamt. Rikligt med grova träd. Fäll- och guldlockmossa förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk, men flera ädellövskogar finns i närområdet.

Area: 7,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), guldlockmossa, fällmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 101 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark söder om Stora Snärsbo som är glest bevuxen av björk, rönn, tall och gran. Några björkar är gamla och grova samt har håligheter. Marken innehåller både fuktstråk och torrbackar. Inslaget av kvävegynnade arter är påtagligt. Dock finns även ytor med hävdgynnad flora där det förekommer arter som backtimjan (NT), ängshavre, knölsmörblomma, stenmåra, gråfibbla, bockrot, blåsuga och liten blåklocka.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: sotlav, backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 102

Nordväst om Yttre Störshult ligger en källpåverkad granskog i sluttning. Inslag av tall, björk och al. Stort inslag finns av senvuxna granar, och rikligt med död ved, både liggande och stående. Omgivningen präglas av jord- och skogsbruk, och ung plantering finns strax söder om objektet.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 103

Norr om Gåsekila ligger en ekskog intill Ätran vid Skåpanäs kraftverk. Inslag av ask, sälg, björk, tall och gran finns. Rikligt med döda träd och högstubbar, jätteträd förekommer. Aspar med håligheter. En större väg korsar objektet.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 104

I Gåsekila ligger ett litet objekt med gamla, grova spärrgreniga lönnar samt ek och enstaka asp och vårtbjörk. Objektet ligger i anslutning till en gård med Ätran som flödar förbi i söder. Omgivningen domineras av jord- och skogsbruk, med löv och ädellövskogar insprängda i produktionsskogarna. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 105 *

Objektet utgörs av gårdsnära och svagt hävdad betesmark vid Billeberg som är bevuxen av tall, björk, gran, en och sälg. Marken är torr och hyser hävdgynnade arter som backtimjan (NT), liten blåklocka, backnejlika, åkervädd och gökärt. Vanlig backsippa (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 106

Mellan Gåsekila och Öv. Skåpanäs ligger en källpåverkad sekundär lövnaturskog i en sluttning ned mot Ätran. Ek, gran, glasbjörk med inslag av asp, klibbal, gråal, vårtbjörk, hägg och sälg förekommer. Gammal asp finns. Död ved finns i måttlig mängd. I norr dominerar klibbal. Objektet klassades som klass 3 under lövskogsinventeringen och berörs av ett naturvårdsavtal. Omgivningen präglas av jord- och skogsbruk med en åker i anslutning till objektet.

Area: 4,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 107 *

Objektet utgörs av en lövsumpskog med klibbal, ek, tall, gran, sälg, rönn och häggmispel längs Ätran norr om Hagalund. Gamla träd förekommer i anslutning till ån, i övrigt dominerar medelålders träd. Död ved förekommer sparsamt. I den södra delen ingår ett parti med blandskog som har 140-åriga tallar. Floran är generellt frodig med arter som getrams, svinrot, kärrfibbla, älgört, nickstarr och strandlysing. Inom objektet finns flera småvatten som skapats genom Ätrans förändrade vattenlopp, och det finns även en mindre bäck.

Skötselöverslag: Försiktig plockhuggning av gran kan utföras, för att gynna lövträd och tall. I övrigt bör området få utvecklas relativt fritt.

Area: 2,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: krushättemossa, kärrfibbla, svarta vinbär

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 112 *

Objektet utgörs av varierad betesmark i sjönära läge vid Rysjö, glest bevuxen av björk, ek, en, klibbal, asp och rönn. Djuren betar ut i sjön, vilket skapat en så kallad blå bård. Vissa delar hävdas genom sent betespåsläpp vilket ger en slätterängsliknande flora. Hävdgynnade arter dominerar, exempelvis slättergubbe (VU), blodrot, svinrot, ängsvädd, grönvit nattviol, blåsuga, stagg, ängsskallra, prästkrage, liten blåklocka, gråfibbla och gökärt. Granspira (NT) är känd från området men kunde inte hittas vid besöket 2016.

Area: 5,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 113

Vid Kristinelund ligger ett litet område med hamlade askar, även med gammal sälj samt inslag av apel, ek och glasbjörk. Området har kulturhistoriska värden vid torpruin, med stengärdesgård och fläckar med gräsmarksväxter. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3. Grynig filtlav (NT) har tidigare noterats i objektet. Skogsbruk dominerar området med produktionsskog och hyggen.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 114

Söder om Hjälsås ligger en ekskog med riklig förekomst av senvuxna ekar draperade med hänglavar. Litet inslag finns av glasbjörk, rönn och sälj. Området har tidigare betats och odlingsrösen förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk och en stor andel av detta är hyggen.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsrösen

Naturvärdesobjekt 116

Objektet utgörs av gammal bokskog vid Bäck, med inslag av ek, gran och vårtbjörk. Odlingsrösen förekommer. Äldre uppgifter anger förekomst av traslav och klipplav. Hasselmus har hittats i objektet. Omgivningen består till stor del av skogsbruk, och avverkning har gjorts i anslutning till objektet.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): hasselmus, traslav

Generellt biotopskydd: odlingsrösen

Naturvärdesobjekt 118 *

Objektet består av öppen betesmark vid Lilla Snärsbo, belägen på sluttning mellan åkrar. Marken är torr till frisk och präglas av riklig förekomst av odlingsrösen. Hävdgynnad flora dominerar, exempelvis backtimjan (NT), liten blåklocka, pillerstarr, ängsvädd, stagg, blodrot och gökärt. Vanlig backsippa (VU) är känd från området men återfanns ej under fältbesöket 2016.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 119 *

Objektet utgörs av trädbevuxen och svagt hävdad betesmark vid Brännabo, där björk och sälk förekommer. Marken är frisk och domineras av arter som lentåtel, kruståtel, harstarr och örnbräken. På vissa partier finns hävdgynnad flora med växter som prästkraige, blodrot, slåttergubbe (VU), hirsstarr, gökärt och knippfryle.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), Jungfru Marie nycklar

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 120

I Svanabo ligger en öppen betesmark med enstaka bok och ek. Hassel, rosor och vildapel förekommer också. Fältskiktet är friskt-fuktigt med hirsstarr och stagg. Även brännässlor och skräppor förekommer sparsamt. Delar av objektet är tydligt kvävepåverkat. I norr består omgivningen till största delen av jordbruksmark och åkrar, med flera större gårdar. I söder dominerar skogsbruksmark.

Area: 1,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 123 *

Objektet utgörs av välskött betesmark söder om Rysjö som är glest bevuxen av björk, ek, sälk och en. Hävdgynnade arter dominerar, exempelvis gråfibbla, käringtand, svartkämpe, liten blåklocka, darrgräs, svinrot, ängsvädd, grönvit nattviol, slåttergubbe (VU), stagg, gökärt och prästkraige. Granspira (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 124 *

Sydväst om Hallatorpet ligger Torvhultsmossen som är ett varierande objekt med skogsbevuxen myr, öppen myr, myrgöl och bäck med fuktäng. Objektet domineras av skogsbevuxen myr med tall ca 90 – 110 år (och enstaka äldre träd). Allmänt med död ved finns i kanterna och någon torraka står mer centralt i objektet. Fuktängen domineras av blåtåtel, men även pors samt enstaka exemplar av ung björk och gran hittas. Flera grusvägar korsar objektet, med diken, vilket ger lokal hydrologisk påverkan. Dikning har även skett på platser utöver vid väg.

Area: 35,9 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 125

Vid Hjärmsås ligger en lövskogslund som tidigare betats. Ek dominerar med stort inslag av asp, liksom vårtbjörk samt enstaka lind, ask, gran, sälg och rönn. Ask och lind är gamla med spår av hamling. Torrträd förekommer sparsamt. Området har även kulturhistoriska värden. Omgivningen präglas av skogsbruk och flera hyggen förekommer i närområdet. En väg korsar objektet. Under lövskogsinventeringen fick området klass 2.

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 126

Mindre bokskog vid Ekenäset. Inslag finns av vårtbjörk och asp samt enstaka gran och rönn. Högstubbar och lågor allmänt förekommande. Omgivningen består till största delen av produktionsskog, varav stor del är ung skog. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 127

I Näs finns en ädellövskog med naturskogskaraktär, i norr lövängsrest. Ek dominerar i söder och ask i norr. Inslag av lind och lönn (även hamlade) samt enstaka sälg, asp, björk, bok och gran. Gamla träd förekommer, och död ved i måttlig mängd. Objektet har värdefull kryptogamflora med bl.a fynd av lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), liten blekspik (VU), grå jordlav (VU), läderlappslav (NT), blek kraterlav (VU), brunskaftad blekspik (VU) och klosterlav (VU). Objektet korsas av väg. Omgivningen domineras av skogsbruk och objektet ansluter till sjön Fegen i sydöst. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse.

Area: 2,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), liten blekspik (VU), grå jordlav (VU), läderlappslav (NT), blek kraterlav (VU), brunskaftad blekspik (VU), klosterlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 130 *

Objektet utgörs av välhävdat och till stora delar öppen betesmark vid Stora Apelnäs. Förekomst av björk, sälg, tall, hassel, rönn och ek finns framförallt i objektets norra och västra delar. Marken är torr till frisk och till betydande del bevuxen av kvävegynnade arter som hundkex, tuvtåtel och smörblomma. Men på vissa partier finns en artrik flora med exempelvis slåttergubbe (VU), ängsvädd, svinrot, brudborste, liten blåklocka, gökärt, blodrot och åkervädd.

Area: 2,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 136 *

Objektet utgörs av öppen betesmark strax norr om Påbo med enstaka gran, en och björk. Marken är i huvudsak torr och stenbunden, men fuktiga och stenröjda ytor finns. Skiftet är rikt på mossor och gräs. Över hela området finns dock hävdgynnade flora som knölsmörblomma, ängsvädd, svinrot, slåttergubbe, stagg, knägräs, blodrot, gökärt och gråfibbla.

Area: 1,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 137 *

Objektet består av betesmark norr om Roasjö med enstaka vildapel, lönn, björk och tall. Igenväxning av gran och örnbräken förekommer. Marken är torr till frisk och domineras av hävdgynnade arter som ängsvädd, knägräs, gökärt, blodrot, stagg, åkervädd, prästkraze, slåttergubbe (VU), liten blåklocka, rotfibbla, hirsstarr, ängsfryle och käringtand.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 142

Söder om Rösarp ligger en bokskog med lång kontinuitet, på östsluttningen av en drumlin. Inslag finns av gran. Högstubbar och lågor förekommer sparsamt. En skogsväg skär området i nord-sydlig riktning. Tidigare har bokvårtlav (NT), lunglav (NT), grynig filtlav (NT) noterats. Objektet blev klassad klass 1 under lövskogsinventeringen. Omgivningen består till stor del av jord- och skogsbruksmark, med Kalvsjön i öst.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): bokvårtlav (NT), lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 145

Söder om Rösarp ligger en betesmark som till hälften betas av nötdjur och resten av får. Södra delen är ringa-tydligt kvävepåverkad. Resterande del är i princip opåverkad. Fältskikt med blodrot, stagg, stenmåra, tuvstarr och veketåg. I trädskiktet hittas gammal lönn samt sälg i norr. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark med flera områden av betesmark och lövskog.

Area: 3,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 146 *

Objektet utgörs av betesmark norr om Kolarp som är glest bevuxen av björk, ek, asp och tall. Hålträd finns. Den västra delen av marken har en hävdgynnad flora med växter som gråfibbla, gökärt, svartkämpe, liten blåklocka, svinrot, slåttergubbe (VU), blodrot och käringtand. Objektet sambetas med omkringliggande vallar.

Area: 2,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 147

Nordväst om Öv. Störshult ligger en granskog i rasbrant ned mot öppen våtmark. Stort inslag av tall samt enstaka bok, rönn, glasbjörk och sälg finns. Rikligt med död ved, samt rik förekomst av block. Bergväggar med sprickor, lodytor, skravelsten förekommer. Skogsproduktion är påtagligt i området och ett hygge kantar objektet i väst.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 148 *

Väster om Kvarnåsaberget ligger ett objekt som varierar med skogsbevuxen myr och fuktäng/sjömad. Den skogsbevuxna myren domineras av tall med inslag av björk, och några högstubbar av gran hittas. Tallarna är medelålders med några exemplar 130 – 140 år samt enstaka äldre gran. Fuktängen med blåtåtel och flaskstarr har flödande vattendrag som meandrar naturligt. Vegetationen består av bland annat vitmossor, tuvull, pors, lingon, myrlilja, blåtåtel och flaskstarr. Även björkticka, stor revmossa, fnösketicka, gammelgranlav och klibbticka hittas. Objektet kantar kalhygge i vissa delar, och några partier saknar skyddzon mot myr.

Area: 9,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: stor revmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 150

Objektet utgörs av ädellövnaturskog vid Tranered med ek och bok samt inslag av vårtbjörk, rönn och gran. En jätteek förekommer, även skyddad som naturminne. Gammal bok är tämligen allmän, och gammal ek sparsam. Vissa av träden har håligheter. Amlav (VU) har tidigare hittats inom objektet. Omgivningen består av mosaik av myrar, men även skog som till viss del är produktionsskog. En väg korsar även objektet i den södra delen.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 155

Sydost om Bökåsen ligger en blandsumpskog med gran, klibbal och glasbjörk. Hög och jämn luftfuktighet och ett ymnigt mosstäck. Lågor är allmänt-rikligt förekommande. Sockelbildning finns. En bäck rinner genom området. Omgivningen är till stor del produktionsskog och ett hygge ansluter till området i den södra delen.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 158 *

Objektet består av ohävdad betesmark mellan Per-Olsgården och Ringstena som håller på att växa igen med gran, asp, björk och tall. Fältskiktet domineras ännu av hävdgynnade arter som blodrot, gökärt, ängsvädd, käringtand, ängshavre, blodrot, åkervädd, vårbrodd och liten blåklocka. Marken är rik på tuvor. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 160

Vid Åsebo ligger tre mindre bestånd med naturskogsartad gammal bokskog med lång kontinuitet. Enstaka gran, rönn, björk och ek förekommer. Död ved finns bitvis rikligt, både lågor, högstubbar och torrträd. Värdefull kryptogamflora och stora botaniska värden. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 1, och är ett Natura 2000-område samt har biotopskydd. Omgivningen domineras av barrskog, varav stor del är produktionsskog.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), örtlav (EN), grymig filtlav (NT), bokfjädermossa (NT), garnlav (NT), bokvårtlav (NT), borkantlav (NT), kortskaftad parasitpik (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 162

Vid Skeppshult ligger en sekundär ädellövnaturskog som domineras av bok, med inslag av ask och asp. Enstaka ek, björk, klibbal, sälg och rönn finns. Gammal bok förekommer sparsamt. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Rikligt med död ved och en bäck förekommer. Området har även kulturhistoriska värden. Vid lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 163 och 164

Väster om Skeppshult ligger två små, litet äldre naturskogsartade bokbestånd med riklig förekomst av liggande och stående död ved. Flera av de grövre bokarna har artrik lavflora med flera sällsynta och rödlistade arter. Fältskiktet är bitvis örtrikt med b.la blåsippa. Omgivningen består till stor del av produktionsskog, och jordbruksmark förekommer, men även myr och andra våtmarker. Ätran flödar förbi i öst. Under lövskogsinventeringen klassades båda objekten som klass 1, och de är även Natura 2000-områden och har biotopskydd.

Area: 1,9 ha och 4,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): kortskaftad parasitpik (VU), bokvårtlav (NT), gul pysslinglav (VU), bokkantlav (NT), lunglav (NT), bokfjädermossa (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 165

Skeppshultskogen är kommunens största bokskog, bitvis med högsta naturvärde. Det aktuella området består mest av klenare bok, inslag av björk, ek och gran. Bitvis källpåverkat och med stora botaniska värden. Under lövskogsinventeringen klassades området som klass 1. Objektet ligger i anslutning till naturvärdesobjekt 163 och 164, och har naturvårdsavtal.

Area: 4,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 174

I Rösarp ligger ett litet lövskogsbestånd med naturskogskaraktär och något blockrik. Asp och ek dominerar med inslag av bok, vårtbjörk och rönn. Lågor finns sparsamt, och håligheter förekommer. Odlingsrösen och stengärdesgård finns. Objektet ligger i anslutning till jordbruksmark och kantar flera betesmarker och lövskogsbestånd.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsrösen, stengärdesgård

Naturvärdesobjekt 175

Sydöst om Rösarp ligger en källpåverkad lövskog dominerad av klibbal och glasbjörk, med inslag av bok, ek, gran och sälg. Hög och jämn luftfuktighet. Död ved finns måttligt-rikligt, och lövträdssocklar förekommer rikligt. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. Objektet ansluter till flera betesmarker och lövskogsbestånd och omgivningen är till stor del jordbruksmark med Kalvsjön som ligger i öst.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 185 *

Vid Göpudden, Västra Fegens östra strand, ligger en skogsbevuxen myr med senvuxna tallar ca 110–130 år som till viss del kantar sjöstrand. Föryngring av gran och inslag av björk hittas. Sparsamt med död ved, både lågor och torrakor förekommer. Vegetationen innehåller bland annat klockljung, fönsterlav, vitmossor, tuvull och lingon. Även tjäder påträffades inom objektet. Objektet har spår av plockhuggning och avverkning har skett i närområdet.

Area: 6,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: tjäder

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 188

Objektet utgörs av en gransumpskog söder om Näs med stort inslag av glasbjörk samt klibbal, asp och enstaka ek samt bok. Rikligt med död ved. Välutvecklade lövträdssocklar. Området är beläget vid Fegens västra strand. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse för naturvård. Omgivningen är till stor del barrskog med viss produktionsinriktning med hyggen och yngre planteringar.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 189

Söder om Näs ligger en ädellövskog med naturskogskaraktär i stark sluttning ned mot Fegen. Bok dominerar med stort inslag av ek, samt vårtbjörk och gran samt enstaka asp. Gammal bok, döende träd, högstubbar och lågor förekommer, liksom mosklädda block och håliga träd. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Objektet tillhör naturreservat och riksintresse för naturvård. Skogen blev även klassad till klass 3 under lövskogsinventeringen.

Area: 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 191 *

Mellan Tranebäck och Sjölid ligger Tranemosse som är en skogsbevuxen myr, men inslag av öppen myr finns. Senvuxna tallar dominerar och flera träd är ca 130 år. Sparsamt med död ved förekommer, vilken återfinns i kanterna av objektet. Vegetationen domineras av tuvull och vitmossor. Sotticka och stor revmossa hittas även.

Påverkan finns från dikning och korsande vägar (med diken), och delar av objektet kantar hyggen.

Area: 46,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: stor revmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 192 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark, strax nordost om Brostorp, belägen vid en äldre husgrund. Marken är glest bevuxen av björk, asp, hassel, syren och gran. I fältskiktet växer storvuxna arter som hundäxing, knylhavre, kirskål och lentåtel. Men det finns även hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, gökärt, svartkämpe och blodrot.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 195

Vid Rönneabben ligger en ädellövskog i nordvästvärd bergbrant. I trädsiktet finns bok, gran, vårtbjörk, ek, asp och enstaka rönn. Gammal bok och asp förekommer. Lågor finns sparsamt. Block och lodytor är allmänna. Värdefull kryptogamflora förekommer. Omgivningen består till stor del av barrskog och produktionsskog med hygge som ansluter i väst. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse för naturvård och har naturvårdsavtal.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 196

Objektet utgörs av bokskog av naturskogskaraktär vid Holmen öster om Västra Fegen. Här finns även enstaka ek, asp och björk. Rikligt med död ved och vedsvampar förekommer. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse naturvård och under lövskogsinventeringen klassades det som klass 2.

Area: 4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 197

Objektet utgörs av ädellövskog med bok och ek vid Holmen, öster om Västra Fegen. Här finns även inslag av apel, sälg, tall, lind och björk. Hassel och en finns i buskskiktet. Vid Holmens gård står ett tiotal grova hamlade askar. Flera rödlistade lavar kopplade till ädellövsträd finns registrerade från området. Objektet tillhör naturreservat, är riksintresse för naturvård och under lövskogsinventeringen klassades det som klass 2.

Area: 9,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), grymig filtlav (NT), liten blekspik (VU), sydlig blekspik (EN), gulvit blekspik (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 201 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark sydost om Brostorp som i huvudsak är öppen. Enstaka gamla ekar och björkar finns. Igenväxning sker sakta av lövsly och gran. I fältskiktet förekommer ännu gott om hävdgynnade arter som backtimjan (NT), slåttergubbe (VU), ängsvädd, blodrot, gullris, åkervädd, liten blålocka, käringtand, gökärt, svartkämpe. Det finns omfattande vildsvinsskador på vegetationen.

Area: 1,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: rostfläck, backtimjan (NT), sotlav, slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 202 *

Objektet är ett varierande objekt med skogsbevuxen myr, öppen myr med blåtåtel- och myrliljestråk samt barrskog med äldre granar och tallar beläget vid Hörnhult. Senvuxna tallar dominerar (med några upp till ca 170 år) men inslag av bl.a äldre granar med gammelgranlav och björk. Död ved förekommer allmänt till sparsamt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt torrakor. Vegetationen innehåller förutom blåtåtel och myrlilja även tuvull, lingon, blåbär, odon och vitmossor. Även vednål, björkticka, hänglavar, blåmossa, gammelgranlav, och violticka förekommer. Objektet har vid våtmarksinventeringen klassats som klass 3.

Objektet har flera gamla diken samt flera djupa som går genom och runt området. I vissa delar kantar även objektet kalhyggen.

Area: 42,8 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: blåmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 205 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark sydöst om Påvarp bevuxen av ek, björk, en, hassel, gran och rönn. Igenväxning förekommer. Fältskiktet är delvis artrikt med växter som slåttergubbe (VU), nattviol, ängsvädd, gökärt, käringtand, ängshavre, stagg, prästkrage, åkervädd och backtimjan (NT). På andra delar dominerar högvuxna arter som hundäxing, tuvtåtel och hundkex.

Area: 2,8 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 210

Mellan Rösarp och Åsen ligger en gransumpskog med inslag av tall, glasbjörk och enstaka rönn. En bäck rinner genom området. Gamla senvuxna granar är sparsamt förekommande, och död ved finns i måttlig mängd. Lövträdssocklar förekommer. Skogen har hög och jämn luftfuktighet. Området är starkt präglad av skogsbruk med hyggen som kantar objektet.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 211 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark sydväst om Påbo som är delvis bevuxen av ek, björk asp och gran. Enstaka grov ek finns. Arter som rajgräs, veketåg och vitklöver tyder på att marken är näringsrik. Vissa partier har dock en mer varierad flora med arter som gökärt, stenmåra, stagg, åkervädd, brudborste och blodrot. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten

Naturvärdesobjekt 212

Objektet utgörs av ädellövnaturskog i sydvästvärd bergbrant, öster om Tranered. Bok dominerar över gran, ek och enstaka rönn. Värdefulla strukturer finns såsom block och bergväggar. Högstubbar, torrträd och lågor förekommer i måttlig mängd. Arter som lunglav (NT) och grymig filtlav (NT) har tidigare noterats i området. Närområdet präglas av skogsbruk där avverkning har skett tätt inpå och plockhuggning har gjorts inom objektet.

Area: 3,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grymig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 213

Åsamossen vid Våkö är en välutbildad högmossa med ett jämnt och nästan trädfritt mosseplan. Sluttningen mot de välutbildade laggarna är brant. Åt söder sträcker sig ett långsmalt myrstråk med blandade mossar och slingrande fuktstråk. Under våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1.

Area: 195,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 215 *

Objektet utgörs av blandbarrskog söder om Kronäng med tydlig påverkan från skogsbruk. Ett äldre tallbestånd, 100–150 år, dominerar. Granarna är yngre men nära ån finns även äldre och ofta grova granar. Vid ån finns en smal bård av gamla klibbalar. Död ved förekommer allmänt. På vissa ytor finns stort uppslag av lövsly. I fältskiktet finns arter som revlummer, klotpyrola, björkpyrola, väggmossa och husmossa.

Skötselöverslag: För att gynna naturvärden rekommenderas att området får utvecklas till stor del helt fritt. Åtgärder för att öka mängden död ved är positivt. Försiktig plockhuggning av gran kommer inte att påverka naturvärdet negativt, men troligen öka uppslaget av lövsly. På sikt är det dock positivt med en större lövinblandning i området.

Area: 3,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: nattviol, revlummer, långfliksmossa

Generellt biotopskydd: -



Ädellövsmiljöer inom kommunen förekommer främst i anslutning till bebyggelse och ofta på relativt små arealer. Gamla träd finns som enskilda exemplar och är sällsynta. Bilden visar ekhagar i naturvärdesobjekt 227 vid Ringhestra.

Naturvärdesobjekt 219

Objektet utgörs av gransumpskog nordöst om Åsebo med hög och jämn luftfuktighet. Inslag av tall, glasbjörk och klibbal finns. Torrträd och granlågor är allmänna, rotvältor och döende träd är sparsamt förekommande. En bäck rinner genom området. Omgivningen är till största del barrskog med skogsbruk. En väg kantar objektet i öst.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 221

Objektet utgörs av ädellövträd vid Åsebo. Allmänt med gamla askar, även gammal ek förekommer sparsamt liksom enstaka lönn och säl. Askarna bär spår av hamling. Flera är angripna av askskottsjuka. Ett stort antal rödlistade arter har noterats i objektet. Omgivningen består till största del av barrskog med produktion, men det finns flera lövskogsområden i närheten av varandra.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), örtlav (EN), almsnabbvinge (NT), mindre hackspett (NT), gröngöling (NT), spillkråka (NT), buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 223

Vid Vallen ligger en klubbsumpskog med inslag av björk samt enstaka rönn och asp. Sparsam förekomst finns av gammal asp. Alsocklar förekommer allmänt. Här finns en källa och rännilar. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 2. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark, men även produktionsskog.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 224

Vid Vallen ligger en ekdominerad naturskog i stark sluttning. Stort inslag finns av tall, samt björk, rönn och asp. Gammal ek och tall förekommer allmänt, död ved rikligt. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 2. Objektet ligger i anslutning till naturvärdesobjekt 223.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 225 *

Objektet utgörs av betesmark vid Kärrsgärde som är glest bevuxen av spärrgreniga ekar, björkar och vildaplar. Smågran växer dock in i skiftet. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, gökärt, grönvit nattviol, slåttergubbe (VU), ängsvädd och hirsstarr. Granspira (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 2,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 226 *

Väster om Mårdaklev ligger Byamossen som varierar med både skogsbevuxen och öppen myr. Centralt finns ett helt öppet mosseplan, endast bevuxet av knähöga tallar. Åt sidorna ökar frekvensen av senvuxen tall, och i kanten finns en blötare zon i form av laggkärr. I övrigt är objektet relativt torrt och variationen är låg. Den öppna ytan bedöms kunna utgöra häckningsplats för arter som ängsbiplärka (NT) och stora delar passar arter som buskskvätta (NT) vilken trivs med buskhög vegetation. Tall dominerar, och flera tallar är omkring 100 år. På en holme i nordost finns även äldre tall och gran, samt allmän förekomst av död ved. Avsnitt runt kärr i västra kanten är näringsfattigt men med variation i form av höljar och fuktdrag. Stora bestånd finns av kallgräs. I fältskiktet dominerar tuvull, ljung, kråkbär, vitmossor, renlav samt klockljung. Gnag från vågbandad barkbock och granbarkborre hittas inom objektet. Under våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 2.

Area: 66,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 227 *

Objektet utgörs av kuperad betesmark vid Ringaberg som är bevuxen av björk, ek, gran, tall, asp och en. Bitvis är trädskiktet alltför slutet och skuggar ut betesmarksfloran. Örnbräken finns också över stora ytor. I övrigt dominerar hävdgynnade arter som stagg, knägräs, slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, pillerstarr, blodrot och vårbrodd.

Area: 2,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), västlig hakmossa

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 228 *

Objektet utgörs av betesmark belägen i den västra delen av Mansås som delvis är bevuxen av ek, björk, hassel, asp och gran. Flera av ekarna utgörs av typiska hagmarksekar med spärrgreniga kronor. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, åkervädd, ängsvädd, hirsstarr, vårbrodd och svinrot. Objektet består av två delobjekt.

Area: 3,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 229

Vid Hussered, öster om Åsamossen, ligger en lövskogslund som domineras av ek med inslag av bok, lönn, asp och vartbjörk. Enstaka ask, tall, gran, rönn, skogslind och sälg förekommer. Gammal asp och sälg är sparsamt förekommande. Hamlade träd och vårdträd finns enstaka. Lågor tämligen allmänt. Arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. Omgivningen är präglad av skogsbruk med hyggen i anslutning till objektet.

Area: 1,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 230 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Kärrsgärde som är glest bevuxen av spärrgreniga ekar, lindar och björkar samt hagtorn. Sent betespåsläpp ger mycket blommande växter som prästkrage, blåkllocka, ängsvädd, åkervädd, liten blåkllocka, svinrot, gökärt, slättergubbe (VU), käringtand, nattviol och grönvit nattviol.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), nattviol, grönvit nattviol, rostfläck

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 232 *

Vid Slättemossen, norr om Tranered, ligger ett varierande objekt med skogsbevuxen myr, taiga och blandsumpskog. Långsträckt fuktstråk förekommer med en till stor del opåverkad hydrologi. En naturlig bäck rinner i västra kanten, vilken kantas av blandsumpskog med mycket klibbal, björk och gran. Bäckens går ihop med ett diffust flöde från öster och rinner över en öppen myr till Traneredssjön belägen i den södra delen av objektet. Trädsikt är av varierande ålder och gamla träd finns ställvis. Tall dominerar men det finns betydande inslag av gran, björk och klibbal. På vissa ytor förekommer död ved rikligt, annars allmänt till sparsamt. Vegetationen domineras av blåtåtel, flaskstarr, trådstarr, tuvull och vitmossor. Brunpudrad nållav (NT), klibbticka, fnösketicka, violticka, vedmussling, blåtticka, alticka samt knölticka. Även gnag från thomsons trägnagare hittades, samt gröngöling (NT). Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3.

Area: 13,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: brunpudrad nållav (NT), thomsons trägnagare, gröngöling (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 233

Mellan Fridhem och Hässelhult, i anslutning till Åsamossen ligger barrskog i stark sluttning. Gran dominerar, stort inslag av tall finns samt enstaka glasbjörk liksom stort inslag av gamla senvuxna granar. Lågor och lodytor förekommer allmänt. Omgivningen består till stor del av skogsbruksmark med hyggen, men flera myrar och våtmarker ligger utspridda i landskapet.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 234 *

Objektet utgörs av trädklädd betesmark norr om Ringhestra som är bevuxen av ek, hassel, björk, en och brakved. Enstaka grova och håliga ekar finns. Floran är artrik med växter som svinrot, ängsvädd, slåttergubbe (VU), karingtand, grönvit nattviol, prästkraige, blodrot och gökärt.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol.

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 236 *

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Päreckulla som är glest bevuxen av björk, hassel, ek, en, asp och vildapel. Den välhävda marken domineras av arter som slåttergubbe (VU), blodrot, liten blålocka, ängshavre, gråfibbla, ängsvädd och gökärt. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 237

Vid Hässelhult ligger en sekundär ädellövnaturskog som domineras av bok. Stort inslag finns av gran, även björk, asp och ek. Gammal bok finns rikligt, med håligheter. Död ved är allmän-rikligt förekommande. Blottor förekommer. Värdefull kryptogamflora finns med bl.a. fynd av lunglav (NT) och grynnig filtav (NT). Omgivningen domineras av skogsbruk med hyggen i anslutning till objektet.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynnig filtav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 238 *

Objektet utgörs av korvsjö i Svenljunga som vid högre vatten är förbunden med Ätran. Oval form. Vegetation i kanterna består av vasstarr, sjöfräken, gäddnate och gul näckros. Korvsjön är omgiven av askog med allmän förekomst av döda träd. Fisk förekommer.

Skötselåtgärder: Bevara miljön och undvik påverkan i kantzoner och på hydrologin.

Area: 0,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: svarta vinbär

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 240

Objektet utgörs av ädellövskog med ask (vissa hamlade), alm, lönn, bok, ek och lind vid gården Hjärtanäs öster om Kalvsjön. Ett stort antal rödlistade arter och signalarter knutna till gamla ädellövträd finns registrerade från området.

Area: 2,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT), läderlappslav (NT), liten blekspik (EN), rosa lundlav (VU), grynig filtav (NT), guldlocksmossa, fällmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 244 *

Objektet utgörs av ekskog omgiven av bebyggelse vid idrottsplatsen i Svenljunga. Förutom ek finns inslag av tall, björk, asp, rönn, hägg, lönn, fläder och skogsalm. Medelålders träd dominerar, och äldre ekar förekommer främst vid hembygdsgården. Enstaka hålträd av asp och ek finns spritt. Mestadels tät undervegetation av lövsly. I fältskiktet finns arter som ekorrbär, liljekonvalj, ärenpris, vårbrodd, gökärt, pillerstarr, vitsippa och hundäxing. Flera stigar går genom området.

Skötselöverslag: Försiktig framröjning av de spärrgreniga ekar som finns i området, vilket främst gäller i kantzoner och särskilt i brynmiljön i den sydvästra delen av objektet. Att öppna upp för mycket riskerar att leda till stort slyuppslag. Generellt gäller att mängden död ved i området bör ökas, vilket kan ske genom tillförsel av död ved från andra områden. Ett annat alternativ att öka områdets värden skulle kunna vara att utföra så kallad veteranisering på några av de medelålders ekarna. Detta innebär att träden utsätts för åtgärder eller skador som skyndar på bildandet av strukturer viktiga för naturvärden, exempelvis håligheter, savflöden, död ved etc.

Area: 5,9 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: rostfläck

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 245 *

Objekt med dominans av öppen myr med skogsbevuxen myr i kanterna, beläget nära Äskås med senvuxna tallar och inslag av gran och björk. Sparsamt med död ved och främst som torrakor men även lågor finns. Vegetationen domineras av tuvull, klockljung och blåbär. En bäck rinner genom objektet i den sydöstra kanten.

Väg korsar i den södra och nordvästra delen av objektet med diken som kantar. Kalhyggen och trädplanteringar kantar objektet i vissa delar.

Area: 43,0 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 246 *

Objektet är ett större objekt i närheten av Trollås och Gammalsjö, ett varierande myrkomplex bestående av flera fristående områden. Bitvis har objektet mycket höga naturvärden som främst är knutna till gran- och lövsumpskog. Dessa miljöer har god variation i trädålder med riklig förekomst av gamla träd liksom död ved i olika nedbrytningsstadier. De talldominerade områdena har mer homogena trädbestånd med sparsam förekomst av död ved. Flera naturliga vattenflöden ringlar genom objektet. Det ingår även flera gölar som ligger i direkt anslutning till våtmarken, där gölen i Lommamossen ansluter till Västra Fegen. Fältskiktet domineras av blåtåtel, vattenklöver, flaskstarr, trådstarr och vitmossor i de fuktigare partierna, och i de talldominerade områdena hittas tuvull, ljung, kråkbär och klockljung. Övriga arter som påträffas är långfliksmossa, kornknutmossa (NT), vågig sidenmossa, glansfläck och kattfotslav. Även gnag från bronsbjon och vågbandad barkbock hittades. Smålom har tidigare påträffats i området, men vid senare besök har den ej återfunnits. Objektet tillhör ett naturreservat, är ett riksintresse för naturvård och vissa delar är Natura 2000-område. Det har även klassats som klass 1 vid våtmarksinventeringen. Omgivningen består till stor del av jord- och skogsbruksmark, men även mosaik av flera större myrar och sjöar.

Objektet kantar till viss del hyggen, och vägdragning och gamla diken ger lokal påverkan.

Area: 92,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, kornknutmossa (NT), vågig sidenmossa, kattfotslav, glansfläck, bronsbjon, vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 248 *

Objektet utgörs av betesmark norr om Rydshult, belägen i svag östsluttning och glest bevuxen av björk, ek, vildapel, rönn och en. Marken ingår i en större betesfålla som restaurerats. I fältskiktet finns hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, pillerstarr och ängsvädd.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 251

Vid Kalv ligger en naturskogsartad ädellövskog med stort inslag av gamla senvuxna ekar. Även gammal asp förekommer. Stort inslag av bok, enstaka tall, rönn och björk finns. Lövskogsinventering anger granlundlav (EN), men inga sentida uppgifter finns om arten. Objektet står under biotopskydd. Närområdet består till stor del av jordbruksmark och åker samt fastigheter. En väg korsar objektet i den södra delen.

Area: 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 252

Objektet utgörs av naturskogsartad bokskog med inslag av ek på Kalvs krona. Även enstaka björk, lönn och tall finns. Gammal bok är allmänt förekommande, och högstubbar och lågor sparsamt. Området har en värdefull kryptogamflora. Omgivningen består till största delen av jordbruksmark med Kalvsjön i väst, och Kättarpsån i syd. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 254

Mellan Övre Högshult och Sävshult ligger en äldre hagmark med öppna gräsytor omväxlande med lövdungar vid en ödegård. Gran och ek dominerar. Gamla askar med spår av hamling, gammal lönn, gammal asp, enstaka björk och sälj förekommer. Objektet kantar lövskog och produktionsskog med barr. Flera naturvårdsarter har tidigare registrerats såsom läderlappslav (NT), almlav (VU), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT), och objektet klassades som klass 2 under lövskogsinventeringen.

Area: 4,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), almlav (VU), lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 255

Mellan Övre Högshult och Sävshult ligger en stor trädklädd betesmark med al, lind, björk och bok vid gammal torpmiljö ute i skogen. Stora hållar, rejäla hasselbuketter, terrasskanter och odlingsrösen förekommer. Mycket smågran är på väg upp. I fältskiktet finns blodrot, hirsstarr, ljung och stagg. Objektet kantar lövskog och produktionsskog med barr.

Area: 7,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 257 *

Objektet utgörs av betesmark vid Fjärhestra, belägen i brant nordsluttning bevuxen av björk, hassel, ek, asp, en, ek och en grov lind. Flera av hasselbuskarna är väl utvecklade och av ansevärd ålder. Den välbetade marken domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, svartkämpe, vårbrodd, slåttergubbe (VU) och gökärt. Objektet ligger i anslutning till jordbruksmark och barrskog.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 259

Objektet utgörs av liten betesmark vid Gutterorp. Torr grusås med rished, med arter som fårsvingel, gråfibbla, knägräs, kruståtel, lingon, ljung, rotfibbla och stagg. En värdefull björk finns. Marken är opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Närområdet är åker och jordbruksmark med betesmarker med lövskog. Även barrskog och myr förekommer. Objektet är riksintresse för naturvård.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 260

Objektet utgörs av betesmark i Gutterorp. Fossila åkrar med terrasskanter och rösen förekommer. Svagt hävdad, hälften svag-tydlig kvävepåverkad. I fältskiktet finns ängsvädd, knägräs, brännässla och skräppor. Tre värdefulla aspar och ekar förekommer. Likt naturvärdesobjekt 259 är närområdet främst åker och jordbruksmark samt flera betesmarker med lövskog.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 261 *

Objektet utgörs av blandsumpskog norr om Svedjan med gran, klibbal, björk och tall kring ett mindre bäckflöde. Enstaka gamla klibbalar med utvecklade alstolar finns, i övrigt dominerar medelålders träd. Död ved förekommer allmänt. I fältskiktet finns arter som hultbräken, majbräken, vattenklöver, kråklöver och humleblomster.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, västlig hakmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 266 *

Objektet utgörs av ädellövskog öster om Svedjan med alm, lind, lönn, asp och björk som växer runt en stenruin. Flera gamla träd samt hålträd som till stor del står i rader förekommer. Undervegetationen är bitvis mycket tät med arter som hallon, jasmin, kornell, häggmispel och rönnspirea. Blek kraterlav (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Skötselöverslag: Området är mycket igenväxt, men detta skadar inte de nuvarande trädvärdena direkt. Dock kan igenväxningen hämma nyetablering av vissa trädslag. En viss röjning av området, genom att exempelvis skapa öppna stråk som kan användas som stigar, skulle tillgängliggöra och skapa variation i objektet. Det är dock viktigt att större lövträd och död ved inte påverkas negativt vid åtgärder i området. Två äldre lindar öster om ruinen bör stamkvistas.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: skogsalm, lönnlav, guldlockmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 267

Vid Guttorp ligger en liten betesmark som betas av får. De få hävdgynnade arter som finns kvar finns runt stenrösena: blåsuga, brudbröd, knägräs, ängsvädd. Här finns även bergrör och vecketåg. Marken är frisk och välhävdat, med ingen-svag kvävepåverkan. Närområdet består till stor del av jordbruksmark och betesmark med lövträd.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 271 *

Söder om Totebo ligger Totebomossen som är ett område bestående till stor del av öppen myr med fuktäng av blåtåtel och flaskstarr. I kanterna består området av blandsumpskog dominerad av björk med inslag av gran och tall samt skogsbevuxen myr. Tallarna i den skogsbevuxna myren är ca 90–110 år, men även flera äldre individer ca 170 år påträffas. Föryngring av tall finns, men även av gran och björk.

I området hittas allmänt till sparsamt med död ved, främst lågor men torrakor finns.

Vegetationen består av bland annat odon, björkticka, vitmossor, tuvull, klocklång, ljungrör och myrlilja. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3.

Objektet kantar till viss del kalhygge, men har påverkad hydrologi i form av diken och vägdrainage.

Area: 18,8 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 272

Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Skattegården. I fältskiktet finns gulmåra, hirsstarr, knägräs, krypvide, stagg, stenmåra, svinrot, veketåg, älggräs, ängshavre och ängsvädd. Svag hävd, svagt kvävepåverkad. I trädskiktet finns bl a björk och al. Närområdet domineras av jordbruksmark men även hyggen och produktionsskog kantar objektet till viss del.

Area: 3,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 273 *

Nordost om Manås ligger ett objekt som domineras av öppen myr och skogsbevuxen myr. Den öppna myren håller på att växa igen med föryngring av tall. Trädskiktet domineras av tall ca 90 – 110 år, men även flera individer ca 170 år. Trädskiktet har även inslag av yngre björk och medelålders gran. Vegetationen består av bland annat vitmossor, tuvull och klockljung. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3.

Hydrologin är något påverkad med diken som kantar samt korsar myr, vilket troligtvis bidrar till igenväxningen. Objektet kantar även till viss del produktionsskog och hyggen.

Area: 21,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 276

Objektet utgörs av välhävdad betesmark vid Baskered med glest trädskikt som innehåller enstaka spärrgreniga ekar. Marken är frisk med arter som grönvit nattviol, kattfot, knägräs, slåttergubbe (VU), stagg och stenmåra. Betesmarken kantar jordbruksmark, men även barrskog och myr.

Area: 8,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 277 *

Objektet utgörs av gransumpskog söder om Svedjan med bitvis stort inslag av klibbal, björk och sälg. Död ved förekommer rikligt. Medelålders träd dominerar, men enstaka gamla träd finns. Ett bäckflöde rinner i den norra delen, medan den södra delen av objektet är torrare. Påverkan av angränsande hygge är tydlig. I fältskiktet finns växter som stjärnstarr, gråstarr, tuvull, humleblomster, blåtåtel och kärrviol.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: bäckbräsmå, västlig hakmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 279 *

Objektet utgörs av gransumpskog norr om Stora Byrhult med inslag av klibbal och björk. Död ved förekommer allmänt. Medelålders träd dominerar. Bäckflöde rinner genom den södra delen. Marken domineras av mossor som björnmossa, vitmossor, vågig sidenmossa, husmossa och skuggstjärnmossa.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: vågig sidenmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 280 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark väster om Prästgården som är glest bevuxen av björk och gran. Den västra delen är relativt nyröjd. Den östra delen är generellt mer påverkad av högre näringstillförsel. Vegetationen består växlande av triviala arter som röllika, ängssyra och vitklöver samt hävdgynnade arter som ängsvädd, backtimjan (NT), blodrot och liten blåklocka.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 281 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark öster om Prästgården som är bevuxen av enbuskar och små betespräglade granar. Marken är stenbunden och svagt kuperad. Ett dike rinner genom den södra delen. Det nordvästra hörnet har en kvävegynnad vegetation, i övrigt dominerar hävdgynnade arter som exempelvis slåttergubbe (VU), stagg, hirsstarr, knägräs och ängsvädd.

Area: 2,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 282 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Grimstorp som i huvudsak är öppen med undantag av medelålders tall och björk i den norra delen. Marken är lätt stenbunden. Visst inslag av veketåg och tuvtåtel finns, i övrigt dominerar hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), stagg, liten blåklocka, gråfibbla, knägräs och ängsvädd.

Area: 4,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 284 *

Objektet utgörs av betesmark vid Fällhult som är glest bevuxen av medelålders ek, björk, asp, klibbal och hassel. Lövsly förekommer. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som ängsvädd, blodrot, vårbrodd, gökärt, svartkämpe, grönvit nattviol, borsttåg (NT), gråfibbla, käringtand, svinrot och knägräs. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 4,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: borsttåg (NT), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 285 *

Objektet utgörs av slåtteräng nordost om Gnipebo som består av åkerholme bevuxen av enstaka ek och hassel. Den torra marken domineras av hävdgynnade arter som vårbrodd, gökärt, stenmåra, åkervädd, käringtand, blodrot, ängshavre, gråfibbla, liten blåklocka, bockrot och svinrot. Dock förekommer även liljekonvalj rikligt. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 286 *

Objektet utgörs av ett stort myrkomplex väster om Svenljunga som består av flera fristående delområden. Helt öppna myrar finns, men ofta är de glest bevuxna av småvuxna tallar. Blandskog förekommer även inom objektet (främst tall, gran och björk), taiga, betad mad, svagt välvd mosse med tall, gran och björkar (ca 100–150 år) samt vägkanter med mycket pors. Dominerande ytor utgörs av skogsbevuxen myr med tallskog som ofta är relativt mogen men kanterna har mer variation i trädslag där man hittar inslag av gran och björk. Gamla träd förekommer sparsamt, däremot är död ved allmänt i området. I objektets ytterkanter finns blandsumpskogar och partier med frisk granskog (taiga). Inom objektet finns en varierande hydrologi med naturliga, meandrande vattendrag och strömmande partier, men även vattendråg, höljor och gölar. En bro passerar ett opåverkat vattenflöde som går igenom en gammal slåttermad. I fuktigare partier hittas manngräs, sjöfräken, trådstarr, kärrsilja och flaskstarr. Vegetationen som dominerar är tuvull, ljung, klockljung, lingon, blåtåtel och blåbär. Citronticka, klippfrullania, långfliksmossa, kortskaftad ärgspik (NT), knölticka, björkticka och klibbticka påträffades också. Även gnag från thomsons trägnagare och vågbandad barkbock finns. Grönvit nattviol växer i närområdet och kungsfågel (VU) noterades. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1 och är riksintresse för naturvård.

Stor påverkan finns från vägar och dikningsingrepp samt närliggande hygge utan skyddszon.

Area: 29,9 ha

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: klippfrullania, långfliksmossa, kortskaftad ärgspik (NT), kungsfågel (VU), thomsons trägnagare, grönvit nattviol, vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 287

Objektet utgörs av betad strand intill Vännebosjön. Hälften av stranden är våt, och resten består av frisk och fuktig mark. Marken är helt öppen med välhävdad och opåverkad mark. I fältskiktet finns hirsstarr, ängs-/blek-/svartfryle, ängsvädd, och veke-/knapptåg. Enstaka odlingsrösen finns. Närområdet domineras av jordbruksmark, men även stråk med lövskog.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 288

I gårdsnära miljö i Rädslarö ligger en trädklädd betesmark, där ek dominerar i trädskiktet som innehåller många värdefulla träd. Fällmossa har noterats på ek. Inslag finns även av björk, en, gran, lönn, oxel, rönn och tall. Fältskikt med knägräs, stagg och stenmåra. Under lövskogsinventeringen klassades betesmarken klass 3.

Objektet kantar skogsbruksmark och ett hygge hittas i norr men utöver det är området opåverkat.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 289 *

Objektet utgörs av slåtteräng nordost om Gnipebo, i område längs vägen. Objektet är bevuxet av enstaka björk och ek. Fältskiktet har dominans av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, svinrot, ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängshavre. Liljekonvalj förekommer bitvis rikligt.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 292 *

Objektet utgörs av träd- och buskbevuxen mark belägen mellan åkrar nordost om Gnipebo. Här växer en bitvis artrik flora med växter som ängshavre, blodrot, gökärt, liten blåklocka, åkervädd, liljekonvalj, röllika, smultron, pillerstarr och svinrot. Skiftet hävdas ej. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Naturvärdesklass: 4

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 291

I södra Baskered ligger en sekundär lövnaturskog som domineras av asp med inslag av ek och enstaka björk, rönn och sälg. Odlingsrösen förekommer. Gammal asp med grov skorp bark är allmänt förekommande. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3. Objektet är gårdsnära och kantar till stor del jordbruksmark och en väg korsar i nord-sydlig riktning.

Area: 1,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 295 *

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Gnipebo med ek, björk, asp, klibbal och hassel. Trädsnittet domineras av medelålders träd. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), stagg, gråfibbla, hirsstarr, vårbrodd, svinrot, ängsvädd, liten blålocka och pillerstarr. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 2,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten

Naturvärdesobjekt 297 *

Objektet utgörs av öppen ohävdad betesmark vid Gnipebo i sluttning som ligger i direkt anslutning till en lada. Fläckvis domineras florans av kvävegynnade växter som brännässla, hundkex och timotej. På stora delar finns dock hävdgynnade arter som svartkämpe, liten blålocka, backtimjan (NT), bockrot, ängshavre, svinrot, åkervädd och brudbröd. Den naturvårdsintressanta arten vädssandbi noterades inom objektet. Vanlig backsippa (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: backtimjan (NT), vädssandbi

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 298

Vid Vännebo ligger en betad granskog med stort inslag av asp samt enstaka ek, björk och rönn. Gammal asp allmän, torrträd, lågor och högstubbar sparsamt förekommande. Värdefull kryptogamflora med noteringar av lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT) och västlig njurlav (VU), och objektet har kulturhistoriska värden.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT), västlig njurlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 299 *

Öster om Landbogården ligger denna betesmark som i söder är torr-frisk och i norr fuktig. Den norra delen är bortstängslad och hävdas inte, och där finns rikligt med videbuskar och ung björk samt älgört, gökblomster och starrar. Övriga delar är mest välhävdade och öppna. I söder står några vidkroniga ekar samt rönn, björk, tall och enbuskar. Något norr om detta finns en torrbacke med bland annat vanlig backsippa (VU). Andra hävdgynnade arter som förekommer är liten blåkllocka, ängsvädd, gulmåra, vårbrodd, ärenpris, gökärt och ängsskallra. Slåttergubbe (VU) är tidigare noterad från området men kunde inte återfinnas under 2016.

Area: 2,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 300 *

Objektet utgörs av svagt hävdad björkhage söder om Gnipebo med inslag av asp, klibbal och en. Marken är frisk till fuktig och domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, svinrot, ängsvädd, liten blåkllocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, slåttergubbe (VU) och prästkrage.

Area: 0,4 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse, småvatten

Naturvärdesobjekt 301 *

Väster om Landbogården ligger en öppen betesmark med några grova ekar och en grov eklåga. Även en rönn förekommer. Marken är mager, frisk och välhävdad, men en del slyuppslag förekommer i söder mot vägen. Här finns flera hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU), stenmåra, liten blåkllocka, gökärt, svinrot, vårbrodd, ängsvädd, blodrot, gulmåra, svartfryle och styvmorsviol. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 302 *

Objektet utgörs av betesmark söder om Gnipebo, som är glest bevuxen av en. Hela objektet utgörs av en åkerholme. Betestrycket är svagt. Den torra marken domineras av hävdgynnade arter som liten blåkllocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, ängshavre och åkervädd. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: åkerholme, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 303 *

Objektet utgörs av betesmark sydväst om Gnipebo, som delvis är bevuxen av björk, rönn, brakved och ek. Marken går från torr till fuktig. En äldre odlingsyta ingår. Floran utgörs av arter som röllika, rödklöver, vårbrodd, gökärt, stenmåra, tuvtåtel, åkervädd, kärrviol, blåttåtel, stagg, gråfibbla och hirsstarr. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,6 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 304 *

Objektet utgörs av betesmark söder om Gnipebo, som består av åkerholme, bevuxen av enstaka ek, björk och rönn. Hävden är svag. Den torra marken domineras av hävdgynnade arter som bockrot, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, slåttergubbe (VU) och käringtand.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: åkerholme, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 305 *

Objektet utgörs av betesmark sydsydväst om Gnipebo som är glest bevuxen av en. Hela objektet utgörs av en åkerholme som är belägen mot grusvägen. Betestrycket är svagt. Den torra marken har spridda förekomster av hävdgynnade arter som liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, ängsvädd, ängshavre och åkervädd.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: åkerholme

Naturvärdesobjekt 306

Objektet utgörs av värdefulla lövträd kring torpet Hallalyckan, asp, vårtbjörk, gran, enstaka sälk och lönn. På lönnen finns grynig filtlav (NT). Högstubbar och lågor av asp är sparsamt förekommande. Objektet är riksintresse för naturvård. Väster om objektet kantar ett hygge, och en väg korsar i nord-sydlig riktning centralt. I övrigt består närområdet av produktionsskog och barrskog med något lövinslag.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), olivbrun gytterlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 307 *

Objektet utgörs av sidvallsäng sydväst om Gnipebo, belägen inom en flikig åkermark och som delvis ligger under kraftledning samt utmed väg. Marken är öppen med undantag av viltbetad lövsly. Floran består av arter som slåttergubbe (VU), käringtand, gråfibbla, liten blåkllocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, åkervädd och liljekonvalj.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), rostfläck

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 308 *

Objektet utgörs av åkerholme sydväst om Gnipebo som är bevuxen av medelålders ek, björk, rönn och lönn. Igenväxning av lövsly förekommer. Floran domineras av liljekonvalj.

Betydande partier är artrika med växter som prästkrage, blodrot, gökärt, slåttergubbe (VU), åkervädd, svinrot, ängshavre och vårbrodd. Marken har under lång tid varit ohävdad.

Objektet är även riksintresse för naturvård.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse, åkerholme

Naturvärdesobjekt 309

Objektet utgörs av skogsbyte i barrskog, vid Redslared, med luckighet och stigar. Fyra värdefulla granar förekommer, även tall, björk och en. Stagg och stenmåra är måttlig-rikligt förekommande. Objektet är välhävdad och opåverkat av produktionshöjande åtgärder.

Omgivningen varierar med jordbruksmark, och skogsbruksmark med hyggen och myr.

Area: 1,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 310 *

Vid Redslared ligger Store Mossen som består av en stor del öppen myr (med mindre tallar), med skogsbevuxen myr i kanterna (dominerad av tall). I objektets syd-östra del finns ett nyckelbiotopsklassat område, barrskog med björkslag, bestående av äldre gran och tall.

Det nyckelbiotopsklassade området har rikligt till allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadier, både torrakor och lågor samt åldersvariation. Violticka, fnösketicka, gullgröppa, klibbticka, björkticka, vednål, trådticka, blåtticka, strålticka, långfliksmossa, blåmossa, vitmossav och skägglav hittades inom objektet (NB), och tidigare har även vedtrappmossa (NT) påträffats (vilken ej återfanns under fältbesöket 2017). Markskiktet består till större delen av ljungr, blåttåtel, lingon och blåbär. Tjäderhöna påträffades i kanten.

Påverkan från dikning finns i området, kraftledningsgata samt kalhyggen utan/med liten skyddszon.

Area: 100,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: gullgröppa, tjäder, långfliksmossa, blåmossa, vitmossav

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 311

Objektet utgörs av frisk betesmark vid Realskäl, välhävdad och bitvis svagt kvävepåverkad samt trädklädd med asp och björk, och delvis igenväxande med asp. Marken är artfattig, dock förekommer stenmåra och stagg talrikt. Betesmarken är belägen i jordbruksmark med produktionsskog och barrskog i omgivningen. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 3.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 312 *

Objektet utgörs av ett större myrkomplex sydost om Svenljunga vilket är dominerat av skogsbevuxen myr. Blandsumpskog med mycket björk finns, samt laggkärr med främst björk. Trollsjön ligger i den södra delen av objektet. I den nordöstra delen finns skogsbevuxen myr med tall som gränsar till kraftledningsgata. Trädskiktet domineras av tall, varav största delen är i ålder 90–100 år. Vissa delar av objektet är inhägnade och har både hjort och vildsvin som betar. Flera äldre tallar hittades (145–160 år), men även äldre björkar (över 100 år). Åldersvariation finns och måttligt med död ved, både lågor och torrakor. Vegetationen domineras av tranbär, tuvull och blåbär i torrare partier, och i de fuktigare delarna dominerar flaskstarr, pors, blåtåtel och vattenklöver. Även svart spiklav, vitmossor, björnmossa och blåmossa hittades.

Området är påverkat av vägar som korsar områden, samt flertalet ledningsgator och stängsel. Flera kalhyggen finns utan skyddszon mot fuktigare partier.

Area: 99,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: blåmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 313

Objektet utgörs av gransumpskog vid Orrekullen, med stort inslag av glasbjörk, liksom tall och enstaka sälg. Senvuxna granar, döende träd, torrträd och lågor är allmänt förekommande. En nbäck rinner genom området. En väg skär av och avverkning har skett nära inpå skogen.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 316 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Bocksbol som består av ett högre parti vilket omges av två svackor med fuktig mark. Den norra delen är bevuxen av björk, tall, ek, vide och rönn. Det välbetade fältskiktet domineras av hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), borsttåg (NT), ängsvädd, stagg, knägräs, hirsstarr, käringtand och liten blålocka.

Area: 3,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), borsttåg (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 317

Söder om Rydshult ligger en skog där den södra delen av området är en lövsumpskog kring en bäck med klibbal, björk och gran, med inslag av tall, sälg och rönn. En källa finns. Lågor förekommer sparsamt. Vid vägen i norr står en gammal hålig jätteask med almlav (VU), grynig filtlav (NT) och trädporella. Omgivningen domineras av jord- och skogsbruksmark, men även flera lövskogar hittas.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), grynig filtlav (NT), trädporella

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 319 *

Objektet utgörs av välskött och varierad betesmark vid Lilla Hulan, glest bevuxen av betespräglade träd och buskar. Riklig förekomst finns av hävdgynnade arter som gråfibbla, blodrot, vårbrodd, käringtand, stagg, knägräs, åkervädd, hirsstarr, blåsuga, gökärt, prästkrage och jungfrulin. Vid kanter finns utbredda bestånd av örnbräken. En mindre bäck, som bitvis kantas av missne, rinner genom objektet.

Area: 3,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), missne

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 320

Objektet utgörs av lövnaturskog i stark nordvästvänd sluttning öster om Rydshult. Ek, asp, björk, gran samt enstaka rönn, sälg och skogslind förekommer. Senvuxna ekar och lågor samt mosklädda block är allmänna. Enstaka gammal sälg med bukettformigt växtsätt förekommer. Objektet har ett naturvårdsavtal. Lövnaturskogen kantar b.la skogsbruk med hygge och jordbruksmark.

Area: 2,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 321

Mellan Västerlid och Pilalycken ligger en gransumpskog i sluttning. Enstaka tall förekommer. Ymnigt mossetäcke finns. Rännilar förekommer. Omgivningen domineras av skogsbruk, och det är avverkat tätt inpå skogen.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 322

Objektet utgörs av ädellövskog vid Verås, åtminstone tidigare betad och eventuellt pågår bete fortfarande. Ek, ask, lind, björk, asp, samt enstaka rönn, sälg, lönn och alm finns. Enstaka hamlade askar och gammal alm förekommer. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT) och lunglav (NT) har tidigare noterats i området. Odlingsrösen finns. Hassel i buskskikt. Skogen kantar hygge och jordbruksmark. Objektet har ett naturvårdsavtal.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 323 *

Vid Månsagården ligger en måttligt-välhävdat betesmark. Den västra delen är mest öppen medan den östra delen är trädklädd. Trädskiktet utgörs av ek och björk. Någon grov ek förekommer. I den sydöstra delen har ekar nyligen friställts. Marken är frisk och till största delen opåverkad eller endast svagt påverkad av näringstillförsel. Här finns flera hävdgynnade arter som stagg, jungfrulin, vårbrodd, gökärt, liten blåklocka och blodrot. Ett parti i den västra delen är dock tydligt kvävepåverkat med vitklöver, gatkamomill, röllika, skräppor och brännässla. Örnbräken förekommer i några delar. Slättergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 3,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -



Tallskog i anslutning till den norra delen av Åstarpamossen, naturvärdesobjekt 329, med riklig förekomst av blommande tuvull. Träden är relativt smala, men borring visade att flera av tallarna har en ålder över 150 år. Kommunens barrskogar utgörs till stor del av produktionspräglade skogar. Mer varierade barrskogar förekommer, exempelvis i anslutning till myrar.

Naturvärdesobjekt 325

Objektet utgörs av bestånd med ädellövträd söder om Grebo, där gammal lönn, ask och asp, även ek, björk, sälg och rönn förekommer. Värdefull kryptogamflora med lunglav, grynig filtlav, almlav, fällmossa, guldlocksmossa och traslav. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark och öppna ytor med lövträd, men även produktionsskog med barr förekommer. En väg korsar skogen i den östra delen.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), fällmossa, guldlocksmossa, traslav

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 327

Objektet utgörs av ekskog med upphörd beteshävd, söder om Verås. Rik hänglavsforekomst. Inslag av björk, asp, gran, enstaka rönn, tall, lind och sälg finns. Vissa av ekarna har håligheter. Gammal glasbjörk är allmänt förekommande. Död ved finns i måttlig mängd. Objektet ligger i anslutning till ekskog med lägre prel. naturvärdesklass (naturvärdesobjekt 318).

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), skrovellav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd:

Naturvärdesobjekt 329 *

Objektet utgörs av Åstarpamossen med intilliggande sumpskogar. Stora delar av närliggande sumpskogar är dock inte med i objektet på grund av tydlig påverkan från skogsbruk eller från tidigare torvtäkt. Centralt har mossen ett relativt öppet område, med forekomst av ängspiplärka (NT) och buskskvätta (NT). Dock förekommer enstaka senvuxna tallar även i de mest öppna partierna. I nordväst finns tallsumpskog med naturliga bäckdrag och allmän forekomst av gamla tallar och död ved. Påverkan från dikning och vägar är tydlig på flera platser i objektets utkanter. Loppstarr (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016. Även *Nemoura dubitans* har tidigare noterats.

Skötselöverslag: Generellt är det viktigt att området får en fortsatt fri utveckling, med opåverkad hydrologi och förutsättningar som medger att sumpskogar kan bli gamla och hysa mycket död ved. Den öppna delen av mossen hotas av en sakta igenväxning, troligen p.g.a äldre dikning. Igenläggning av diken för att höja vattennivån bör övervägas.

Area: 112,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, orre, ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 331 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Lockryd som är glest bevuxen av björk, en, slån och rönn. Enstaka odlingsrösen finns. I fältskiktet växer arter som rödven, svartkämpar, blodrot, gökärt, vårbrodd och mandelblom.

Skötselöverslag: Objektet är i stort behov av återupptagen hävd för att naturvärden inte ska förloras. Igenväxningen har dock inte gått så långt ännu.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 334

Vid Dumsäng ligger en hagmark med spärrgreniga grova träd, gamla lövträd allmänt, gammal ask sparsamt. Ek, björk och gran samt enstaka ask, asp, rönn och sälg finns. En bäck rinner genom området. Värdefull kryptogamflora med bl a lunglav (NT) och ädellav (EN).

Hagmarken är gårdsnära och kantar andra betesmarker med lövträd, samt jordbruksmark.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), ädellav (EN)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 335 *

Vid Björnåsen ligger Källåsamossen vilken är en skogsbevuxen myr med relativt homogent bestånd av tall. Gamla träd förekommer sparsamt, liksom sparsamt med död ved. I kanter finns gran och björk. Enstaka äldre granar finns. Björnsjön ingår i objektet vilket ökar variationen. Fältskiktet domineras av arter som tuvull, kråkbär, vitmossor, pors och ljung. Knärot (NT) som tidigare har noterats från objektet kunde inte återfinnas vid inventeringen 2017.

Hydrologisk påverkan finns men avrinningen är relativt opåverkad.

Area: 30,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 336 *

Vid Reaskäl ligger Storemossen som är ett varierande objekt med en stor del öppen myr, men även skogsbevuxen myr, blandsumpskog, stråk med gransumpskog (mellan hyggen och produktionsskog) och Lillasjön. Allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadie förutom murkna exemplar finns. Trädskiktet domineras av tall, men gran, björk och klibbal förekommer. Trädåldern varierar men ålder 80 – 90 år domineras. Vegetationen domineras av blåttåtel, blåbär, vitmossor, stor kvastmossa, kråkbär, tuvull och lingon. Övriga arter som hittas är eldticka, fnösketicka och sprängticka. Gnag från bredhalsad varvsfluga och björksplintborre påträffades. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 2.

Påverkan från plockhuggning, dikning, närliggande hyggen, skogsvägar och timmerbro.

Area: 47,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 337

Objektet utgörs av glest trädklädd, svagt hävdad betesmark vid Reaskäl. Igenväxande. Extremt mycket blåttåtel förekommer, även mycket ljung och en. I övrigt finns gökärt, hirsstarr, stagg, stenmåra, svartkämpar och vårbrodd. Enstaka värdefull asp, ek och rönn finns. Betesmarken kantas av jordbruksmark och Storemossen är belägen i väst.

Area: 2,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 338 *

Vid Hultet finns en betesmark som består av två små öppna delar i öster och en större, trädklädd del i väster. De öppna delarna, särskilt den norra, är magra med flera hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), ängsfryle, gråfibbla, blodrot, liten blåklocka och vårbrodd. Den trädklädda delen består av medelålders ek med inslag av asp och rönn. Några grova rönnar förekommer. Upplag av stammar och diverse skrot finns i den centrala delen. I söder förekommer rikligt med odlingsrösen och hela området utgörs av fornåkrar. I den trädklädda delen är det skuggigt och arter som vitsippa, smörblomma och vitklöver dominerar. Längs vägen som leder upp till gården står hamlade askar och lönnar med guldlocksmossa.

Area: 3,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), långfliksmossa, guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 340

Sydost om Ambjörntorp ligger en gransumpskog med stort inslag av tall. Torrakor och lågor är sparsamt förekommande. Gransumpskogen kantar Nycklamossen och naturvärdesobjekt 286. Objektet är ett riksintresse för naturvård.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 341

Sydost om Ambjörntorp ligger en granskog i anslutning till trädklädd myr. Likt naturvärdesobjekt 340 kantar objektet Nycklamossen (och naturvärdesobjekt 286) samt är ett riksintresse för naturvård. Omgivningen domineras av myr och barrskog/produktionsskog.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 342

Vid Ambjörnstorp finns ett antal gamla lönnar och aspar tillsammans med ask, glasbjörk och gran. Håligheter förekommer på asp. Värdefull kryptogamflora finns med olivbrun gytterlav (NT), skorpigelav(NT), lunglav (NT) och gryinig filtav (NT). Objektet är gårdsnära och i väster kantar ett hygge.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): olivbrun gytterlav (NT), skorpigelav (NT), lunglav (NT), gryinig filtav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 343

Objektet utgörs av betesmark vid Kattarp, med svag-tydlig påverkan, troligen konstgödslad in på 1970-talet. Relativt artfattig men arter som gökärt, svartkämpar, stenmåra, ärenpris, ängsvädd är vanliga. Även hundkex och skräppor förekommer. Halvöppen med bl.a. ek, lind och rönn. Närområdet domineras av jordbruksmark, men söder om betesmark ligger ett hygge. Skogs- och jordbruksmark dominerar omgivningen.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 347

Objektet utgörs av halvöppen, mestadels opåverkad mager betesmark vid Öja. Varierat betetryck finns, ohävdad-svagt-välhävdad. Frisk-torr mark med blodrot, gökärt, knägräs, liten blålocka, stagg, stenmåra, och svartkämpar. I trädskiktet förekommer asp, björk, en, gran och rönn. Objektet är beläget i jordbruksmark men flera myrar och våtmarker finns i omgivningen. Även en del skogsbruk pågår med bl a hyggen. Betesmarken tillhör riksintresse för naturvård.

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd:

Naturvärdesobjekt 348 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Skallamoga som delvis är svagt kvävepåverkad men även opåverkade, torra partier förekommer med fin hävdgynnad flora. Här finns slättergubbe (VU), vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), ängsvädd, liten blålocka, gökärt, ärenpris och käringtand. I det glesa trädskiktet finns ek, tall och björk. Även enbuskar förekommer.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 353 *

Väster om Mårdaklev ligger ett stort myrkomplex med Hestramossen och Store mossen, med flera helt öppna ytor (öppen myr) och inslag av trädbevuxen myr. Varierade hydrologiska strukturer finns med dråg och höljor samt meandrande vattendrag vilket bidrar med ytterligare variation i myren. Trädskiktet är talldominerat, men rikligt med inslag av framför allt björk och gran förekommer. I de skogsbeklädda partierna i öst finns mycket varierande skogar med gott om gamla träd samt rikligt med död ved i samtliga nedbrytningsstadier. I myrens kanter finns arter som trådtåg, vattenklöver, trådstarr, blååtäl och flaskstar. De större öppna ytorna domineras av tuvull, vitmossor, tranbär och ljung. Även eldticka, klibbticka, knölticka, fnösketicka, björkticka och blåtticka finns, samt kungsfågel (VU) och kornknutmossa (NT). Gnag från thomsons trägnagare, bronsbjon och vågbandad barkbock hittas. Objektet är ett riksintresse för naturvård, och blev klassad klass 1 under våtmarksinventeringen.

Flera vägar kantar objektet, med diken vilka har en hydrologisk påverkan. Hyggen kantar även komplexet på flera ställen, och en kraftledningsgata går i sydvästlig riktning, i den östra delen.

Area: 279,9

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: thomsons trägnagare, bronsbjon, kornknutmossa (NT), vågbandad barkbock, kungsfågel (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 354 *

Vid Kronogården ligger en större, mestadels öppen betesmark. Marken är torr-frisk med fuktiga partier. Hävden är överlag god, men i fuktiga delar är hävden svag. Mindre partier är svagt näringspåverkade men den största delen av betesmarken är opåverkad. Här finns flera torrbackar med backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) och slättergubbe (VU). Andra hävdgynnade arter som förekommer är grönvit nattviol, ängshavre, gråfibbla, svartkämpar, liten blåklocka, ängsvädd, prästkrage, gökärt, bockrot, vårbrodd, stagg och gökblomster. I det glesa trädskiktet finns björk, sälg, apel, asp och rönn. Någon grov björk och enstaka gammal sälg förekommer. Buskskiktet är mycket glest och utgörs av enbuskar och aspsly.

Area: 11,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 358

Söder om Skogen ligger en källa som omges av källpåverkad mark med gran med inslag av lövträd. Området har även kulturhistoriska värden. Omgivningen består till stor del av jord- och skogsbruksmark men flera större våtmarker finns.

Area: 0,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 359 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Ryd som delvis är igenväxt av brakved, björk, rönn och gran. Enstaka äldre ek och apel finns. Fältskiktet är påverkat av körsdador. Över hela objektet finns spridd hävdgynnade arter som stagg, knägräs, gråfibbla, gökärt, blodrot, hirsstarr, rotfibbla och svinrot. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 360

Objektet utgörs av grandominerad barrskog med stort inslag av tall och enstaka vårtbjörk belägen mellan Kroksjön och Tranesjön söder om Hännåsen. Gamla senvuxna granar är rikligt förekommande. Döende träd förekommer sparsamt. Allmänt med högstubbar, lågor och torrträd. Objektet har biotopskydd. Omgivningen varvar mellan skogsbruksmark och våtmark i form av myrar och mossar. Skogsväg korsar objektet i söder.

Area: 7,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 361

Objektet utgörs av sekundär ädellövnaturskog vid Inganäs som domineras av ek med inslag av lind samt enstaka asp och björk. Området är blockrikt och åtminstone tidigare betat. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2. Objektet kantar jordbruksmark i öst, och i väst ligger hyggen.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 362

Objektet utgörs av långsmal betesmark vid Övre Lönnhult, tydlig kvävepåverkad vid ladugård, ganska fint i smal del i norr men där igenväxt. Blodrot, grönvit nattviol, gökärt hirsstarr, jungfrulin, knägräs, revfibbla, stagg och stenmåra förekommer. Enstaka värdefulla ekar finns. Betesmarken kantar jordbruksmark i väst, och produktionsskog med hygge i öst.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 364

Objektet utgörs av betesmark vid gården Källhult. I söder finns flera värdefulla träd, bl.a några hamlade askar, samt björk och ek. Tydligt kvävepåverkad vid ladugården, annars mest opåverkad. Svag hävd. Gråfibbla, gökärt, liten blålocka, stenmåra och svartkämpar finns i området. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Betesmarken kantar jordbruksmark och lövskog.

Area: 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 365

Objektet utgörs av en kulle med ekskog söder om vägen vid Källhult. Inslag av asp och gran samt enstaka tall och bok finns. Rikligt med död ved, även döende träd. Lågor, högstubbar och block förekommer också. Ekskogen kantar naturvärdesobjekt 364 i norr, och barrskog i söder.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 366

Sydväst om Sparyd ligger en strandvåtmark längs Spadens norra sida. Öppet eller täckt med buskar. Förhållandevis naturlig. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 2. Våtmarken kantas bl.a av produktionsskog och hygge.

Area: 21,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 367 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Hökaberg som är glest bevuxen av ek, hassel, björk, tall, gran och rönn. Det finns gamla spärrgreniga ekar och björkar samt grova hasselbuskar. Marken är svagt hävdad vilket påverkar floran, men ännu finns hävdgynnade arter som knägräs, gökärt, blodrot, slättergubbe (VU), stenmåra, stagg, vårbrodd och blåsuga. Borsttåg (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 4,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), sotlav, rostfläck, krushättemossa

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 369 *

Objektet utgörs av betesmarken i Örsås som består av två delar åtskilda av stängsel. Den norra delen är välhävdat men artfattig och svagt näringspåverkad. Söder om detta finns en sydvästsluttning som är ohävdad sedan många år men ännu hyser en relativt artrik hävdgynnad flora med slättergubbe (VU), gråfibbla, liten blåklocka, käringtand, blodrot, svartkämpar, åkervädd, ängshavre, gulmåra, smällglim, ärenpris, prästkrage, äkta johannesört och stenmåra. Även sexfläckig bastardsvärmare (NT) noterades vid besöket. Marken är tydligt tuvad med väggmossa och ljung. Buskskiktet utgörs av enbuskar och hägg.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), sexfläckig bastardsvärmare (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 370

Objektet utgörs av en liten åkerholme i Gnipebo vilken brukas som slätteräng. Slyuppslag från buskarna har hållits efter. Mycket gökärt, blodrot, vit- och stenmåra, liten blåklocka samt prästkrage och ängsvädd förekommer. Opåverkad, frisk mark. Objektet kantar b.la jordbruksmark och andra ängar.

Area: 0,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 372

Söder om Skinnarebo ligger en tidigare hagmark som domineras av ek med inslag av asp och andra lövträd, enstaka ask och vårtbjörk. Gamla aspar finns allmänt, liksom enstaka torrträd av asp. Värdefull kryptogamflora med bl.a. skrovellav (NT) och grynig filtlav (NT). Hagmarken kantar ung barrskog och blandskog.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): skrovellav (NT), grynig filtlav (NT).

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 373 *

Objektet utgörs av frodig blandskog vid Axelfors invid Ätran som innehåller en djup ravin vilken går parallellt med Ätran. Gamla träd och död ved förekommer allmänt. Gråal, klibbal, björk, gran och hägg är vanliga inslag. I fältskiktet växer hultbräken, ekbräken, kransmossa, rödblåra, kabbeleka, rörflen, älgört, skogssäv samt flera signalarter för fuktig lövskog.

Isättningsplats för kanoter i Ätran finns inom objektet.

Skötselöverslag: Generellt är det viktigt att området får en fortsatt fri utveckling så att träd tillåts bli gamla och död ved kan bildas. Försiktiga åtgärder kan vara nödvändiga för att bibehålla möjligheten att sjösätta kanoter i Ätran.

Area: 3,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: ormbär, stubbspretmossa, västlig hakmossa, storrams, svarta vinbär, krushättemossa, strutbräken

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 375 *

Objektet utgörs av slåtteräng vid Lillabacka med enstaka björk, en, tall och klibbal. En bäck rinner genom skiftet. Skötseln är traditionell lieslåtter med efterbete. I den norra delen av objektet ingår en gammal hålväg i det slåtttrade området. Marken hyser en mycket artrik flora, utan påverkan från negativa indikatorarter. Bland arterna märks svinrot, ängsvädd, knägräs, blodrot, ängsskallra, jungfrulin, kattfot, slåttergubbe (VU), borsttåg (NT), backtimjan (NT), stagg, ängsfryle, grönvit nattviol och gråfibbla.

Area: 0,8 ha

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, kattfot, borsttåg (NT), backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: småvatten

Naturvärdesobjekt 377 *

Objektet utgörs av slåtteräng vid Lillabacka som utgörs av en i huvudsak öppen kulle. Skötseln är traditionell lieslåtter med efterbete. Floran är artrik med arter som ängsvädd, slåttergubbe (VU), jungfrulin, ängshavre, svinrot, knägräs, gråfibbla, gökärt, blodrot, liten blåklocka och åkervädd.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 380

Mellan Backen och Björkås ligger en betesmark med fossila åkrar och många rösen. De gamla åkerytorna är kultiverade och de gamla slåtterytorna är även de påverkade med bland annat hundäxing och nässlor. Det finns stenmåra, gökärt och blodrot samt gammal rönn och grov hassel. Jord- och skogsbruk dominerar i omgivningen, med barrskog och flera hyggen.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 383

Objektet utgörs av hedekskog på en kulle vid Ödgärdarp. Stort inslag av tall samt enstaka gran, vårtbjörk, rönn och asp. Döende ek är allmänt förekommande och rikligt med döda träd och högstubbar samt rik hänglavsforekomst. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3. Objektet kantas av skog- och jordbruksmark.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 384

Objektet utgörs av svag-välhävdat betesmark vid Backgården. Vissa delar är svagt-tydligt kvävepåverkade. Enstaka träd finns, liksom en del buskar: björk, ek, en, hallon, rosor, rönn och sälg. Brudborste, gulmåra, hirsstarr, knägräs, rödklint, stagg, stenmåra och svinrot hittas i fältskiktet. Betesmarken kantar jordbruksmark och andra lövklädda marker.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 386 *

Öster om Stora Björstorp ligger Kråkemossen som är ett varierande objekt dominerad av blandsumpskog med gran, tall och björk. Även öppen myr som genomströmmas av ett naturligt bäckflöde finns. Runt det ringlande vattendraget är det relativt öppet, med undantag av enstaka björkar varav flera är döda. Gamla träd finns och förekommer främst i formen av senvuxna granar men även enstaka äldre tallar hittas. Död ved förekommer allmänt. Fältskiktet domineras av blåtåtel, tuvull, vattenklöver, stjärnstarr, myrtilja och klockljung. Även kattfotslav och gammelgranslav påträffas inom objektet.

Objektet omges av hyggen och homogena barrplanteringar.

Area: 24,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: kattfotslav

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 388

Nordväst om Boda ligger en gransumpskog med stort inslag av gamla, senvuxna granar. Även tall, björk, klibbal och asp förekommer. Lågor och högstubbar sparsamt förekommande. En bäck rinner genom området vilken ansluter till en öppen myr. Objektet kantar våtmarksområde i nordväst, och hygge i nordost.

Area: 1,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 389

Väster om Boda ligger en barrnaturskog med gran och stort inslag av tall. Även enstaka rönn och björk. Gammal grov gran förekommer rikligt, även gammal tall, och björk sparsamt. Grova torrträd finns enstaka. Götabäcken rinner genom området som ansluter till öppen myr. Objektet kantar bl.a skogsbevuxen myr.

Area: 2,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 391

Väster om Grevabo ligger en myr kring Knapasjöå som är påverkad av intilliggande avverkning men förhållandevis naturlig. Öppen-glest trädklädd. Sumpskogspartier förekommer där tall dominerar. Vattenförekomsterna Svanatjärn och Skäringen ingår i objektet. Variation med förekomst av vattendrag och öppet vatten. Under våtmarksinventeringen klassades myren klass 2.

Area: 2,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 393

Objektet utgörs av frisk, välhävdat betesmark vid Mjoghult med flera gamla träd. Hamlad ask och sälg, enstaka grova ekar, samt hålig oxel, rönn och sälg. Ingen-svag påverkan, med mest naturlig flora i den norra delen. Knägräs, stagg, brännässla, skräppor och vecketåg förekommer i fältskiktet. Objektet kantar b.la jordbruksmark och lövskog.

Area: 1,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 394

Objektet utgörs av åkerholme i Moghult, tidigare hävdad som äng och nu svagt betad av häst. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, prästkrage, skallror och svinrot förekommer i fältskiktet. Objektet är i stort sett opåverkat av produktionshöjande åtgärder. Objektet kantas till största delen av jordbruksmark.

Area: 3,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 398

I Anfastorp ligger en betesmark med gammal grustäkt som inte används längre. Blåmunkar, knägräs, ängsvädd, ärenpris, brännässla förekommer i fältskiktet. Torr-frisk mark. Enstaka håliga aspar finns. Även ek, björk, gran och tall hittas i den södra delen. Objektet omges av åkermark.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 399

Objektet utgörs av trädklädd kulle norr om Anfastorp. Ek och björk dominerar. Mycket berg i dagen och översilad håll. Hirsstarr, knägräs, stagg, ärenpris, midsommarblomster, skräppor, veketåg finns i fältskikt. Gulpudrad spiklav har noterats på ek. Kantas till största delen utav åkermark.

Area: 2,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): gulpudrad spiklav

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 400

Kring gården Anfastorp står ett antal gamla grova ädellövträd: lönn, alm, ask, skogslind. Även fågelbär, hägg och apel förekommer. Vissa av träden är hamlade. En bäck rinner igenom i södra delen. Objektet omges av åkermark.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 403 *

Vid Hylte ligger ett objekt som domineras av skogsbevuxen myr med tallar upp till 135–145 år. Öppen myr finns, men väldigt liten areal. Trädskiktet domineras av tall med individer upp till 135–145 år, men föryngring av gran och inslag av björk finns. Död ved förekommer sparsamt. Vegetationen består av bland annat tuvull, björnmossa, vitmossor, lingon, blåbär, klockljung, violticka och björkticka. Hasselmus har tidigare noterats.

Objektet kantar väg med diken vilket har lokal hydrologisk påverkan. I vissa delar kantar även myren hyggen och produktionsskog.

Area: 26,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 404 *

Vid Stockhult ligger Karsbomossen vilken är ett varierande objekt som domineras av skogsbevuxen myr, men har inslag av öppen myr och myrholme samt är en del av riksintresse (myrkomplex). En del av objektet är även blockrik barrskog. Trädskiktet domineras av senvuxna tallar upp till 120 – 130 år, men inslag av gran och björk finns. Vegetationen domineras av vitmossor, tuvull, klockljung, kråkbär, odon, björnmossa, myrlilja och flaskstarr. Även gammelgranlav, husmossa, lingon, klibbticka och violticka finns.

Vissa delar av objektet kantas av kalhygge, och en skogsväg med dike korsar i de centrala delarna.

Area: 67,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 406 *

Norr om Kalv ligger Hästamossen som är en skogsbevuxen myr med tall. Objektet är ett stort komplex med många naturtyper som taiga och öppen myr. Flera sjöar och gölar ingår i objektet. Tall dominerar men inslag av björk och gran finns. Äldre tallar (högst 120 år) finns varav vissa är senvuxna med variation i ålder, även föryngring. I markskiktet hittas borsttåg (NT) (NT), vitag, blåbär, lingon, ljung, klockljung och odon. I bottenskiktet hittas långfliksmossa, gul tryffel och blåmossa. Även björkticka och rikligt med skägglav finns. Insektsnag som hittades var från b.la thomsons trägnagare, bronsbjon och vågbandad barkbock. Orre påträffades inom objektet. Tidigare har storspov (NT) noterats inom objektet, men är dock ej påträffad vid fältinventeringen 2017. Vid våtmarksinventeringen blev objektet klassat klass 1, och det är även ett Natura 2000-område och riksintresse för naturvård.

Djupa diken kantar området på flera ställen, mycket påtagligt i områdets centrala delar där diket även rensas. Vissa områden visar tecken på gammal torvbrytning.

Area: 698,8 ha

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: borsttåg (NT), långfliksmossa, blåmossa, bronsbjon, vågbandad barkbock, orre, thomsons trägnagare

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 407

Objektet utgörs av betesmark längs Stångån, vid Barnarp. Den södra delen är mycket fin och artrik, i norr förekommer mer trivial flora men andra värden finns såsom korvsjöar, och en del alar. Arter som backtimjan (NT), gökblomster, gökärt, käringtand, slätterfibbla (VU), slättergubbe (VU), svinrot, veketåg och älggräs hittas i fältskiktet. Stora delar av objektet kantas av jordbruksmark.

Area: 7,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): backtimjan (NT), slätterfibbla (VU), slättergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 409

Väster om Gräsdal ligger en liten betesmark intill Stångån som hävdas av häst. Knägräs, revfibbla och ängsvädd förekommer. Utmed kanterna finns enstaka al, asp, tall och en. Ingen-svag kvävepåverkan.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 412

Objektet utgörs av liten betesmark vid Annlarp med främsta värden i trädskiktet och med flertalet värdefulla ekar. Även björk, lönn, rönn, sälg, enbuskar och rosor förekommer. Troligen är objektet en f.d. slåtteräng. Blodrot, brännässla, gökärt, stagg, stenmåra och ängsvädd hittas i fältskiktet. Betesmarken omges av jordbruksmark.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 414

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Skärjebo som delas av en mindre väg. Inom objektet finns tiotalet värdefulla ekar. Här finns hävdgynnade arter som slåttergubbe, slåtterfibbla och svinrot. Vid ängs- och betesmarksinventeringen noterades björksly över stora delar av objektet vilket dock verkar vara borttaget.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU), slåtterfibbla (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 415 *

Objektet utgörs av öppen, frisk betesmark med enstaka glest spridda björkar, rönnar, lönnar och en gran. Enbuskar förekommer också. Hävden är svag, och marken är svagt påverkad av näringstillförsel. Här förekommer ett antal hävdgynnade arter som stagg, gulmåra, gökärt, svartkämpar, liten blåklocka, vårbrodd, blodrot, hirsstarr och prästkrage. Mot skogen i öster finns uppslag av björksly och örnbräken. Slåttergubbe (VU) som tidigare är noterad från betesmarken kunde inte återfinnas under inventeringen 2016.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 417

Vid Nyaled ligger en betesmark intill Stångån. I skiftet finns ett tiotal avsnörda meandrar av varierande storlek, av vilka några fortfarande håller vatten medan vissa endast är fuktiga. Två grova tallar finns intill strandkanten, i övrigt klibbal. Hirsstarr, stagg och ängsvädd förekommer i fältskiktet.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 419 *

Objektet utgörs av betesmark i den sydöstra delen av Tommared, som i väster är bevuxen av björk och i övriga delar är trädfri. Lövsly finns dock spritt över skiftet. Över hela området finns hävdgynnade arter som stagg, blodrot, hirsstarr, liten blåklocka, gökärt, borsttåg (NT), åkervädd och vårbrodd. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: borsttåg (NT)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 426 *

Vid Stora Tittebo ligger en mestadels öppen betesmark som är frisk-fuktig med torrare partier. Svag kvävepåverkan finns över i stort sett hela objektet, men i norr är påverkan kraftig och där förekommer bland annat skräppor, brännässla och groblad. Hävdgynnade arter som svartkämpar, liten blåklocka, prästkraige, stagg, blodrot och gråfibbla förekommer, men främst i den mittersta delen. I söder står fyra grova skogsalmar med lunglav (NT). Där finns även en grov hamlad ask med brösthöjdsdiameter på ca 1 m, med guldlocks-mossa och träd-porella. Längs vägen i norr står fyra hamlade askar med guldlocks-mossa. Träds-kiktet i övrigt utgörs av ek, rönn och apel. Grynig filt-lav (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 2,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: guldlocks-mossa, lunglav (NT), träd-porella

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 428

Nordost om Lillaskog ligger en hagmark med rikligt med grova ekar. Dessutom finns lind, lönn, björk, ask och asp. Hamlade lönnar och lindar. Högstubbar, torrträd och lågor förekommer. Området betas, och stagg finns i fältskiktet. Flertalet rödlistade lavar förekommer som lunglav (NT), almlav (VU), grynig filt-lav (NT), västlig njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT) och liten blekspik (VU)

Area: 11,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), almlav (VU), grynig filt-lav (NT), västlig njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT), liten blekspik (VU), desmeknopp (NT), slåttergubbe (VU), loppstarr (VU), borsttåg (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 429

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Lillaskog. Ek dominerar, inslag finns av lind samt enstaka asp, asp, lönn, fågelbär och vårtbjörk. Gammal lind och asp är sparsamt förekommande. Objektet omringas av produktionsskog och hyggen, men visst skydd ges i form av träd-bård som kantar lövnaturskogen.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 430

Objektet utgörs av lövängsrest väster om Lillaskog. Gamla hamlade askar, gammal lönn, gammal säl, även asp, rönn, glasbjörk, ek och apel förekommer. Odlingsrösen och stengärdesgård finns. Rik hänglavsforekomst och stora botaniska värden. Objektet kantar hyggen och produktionsskog, och en väg korsar objektet i nord-sydlig riktning.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grymig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsrösen, stengärdesgård

Naturvärdesobjekt 431 *

Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Pellagården. Marken är mestadels opåverkad, men närmast huset syns tydlig kvävepåverkan. I nordost är trädsnittet tätare och marken är där skuggad. I trädsnittet finns en grov lönn med guldlocksmossa och en mycket grov, halvdöd säl. I norr förekommer asp och björk. Det finns även en hel del örnbäken i fältsnittet. Hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), gökärt, blåsuga, gråfibbla, käringtand, ärenpris, vårbrodd, liten blåklocka, stenmåra och blodrot förekommer. Ett bestånd med backtimjan (NT) finns i en torr sluttning mot vägen i söder, alldeles utanför betesmarken.

Area: 1,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: odlingsröse



Blandsumpskog vid Holsjunga, objekt 435. Sumpskogens värden är beroende av oförändrad hydrologi och hög fuktighet, och utsätts för påverkan av omgivande verksamheter i form av industrier och skogsbruk.

Naturvärdesobjekt 435 *

Objektet utgörs av blandsumpskog vid Holsjunga med gran, björk, tall och klibbal. Gamla granar och död ved förekommer allmänt. Ett naturligt bäckflöde som delvis rinner under jord går genom objektet. Omgivande avverkningar och skogsbruk har tydlig påverkan.

Vegetationen utgörs av arter som tuvtåtel, älgört, skuggstjärnmossa, björnmossa, stor kvastmossa samt flera vanliga signalarter.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det öppna området direkt nordväst om objektet påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas fritt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 1,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: skärmstarr, långfliksmossa, blåmossa, västlig hakmossa, vågig sidenmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 443

Objektet utgörs av öppen betesmark vid Stommen vilken bitvis är svagt-tydligt kvävepåverkad. I fältskiktet märks vanlig backsippa (VU), bockrot, knägräs och ängsvädd. Marken är torr-frisk. Enstaka asp, björk, rönn och tall förekommer. Objektet omges av jordbruksmark.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 444

Vid gården Låkhult står några värdefulla gamla hamlade askar samt gamla lindar och ek. Flera rödlistade lavar förekommer som almlav (VU), grynnig filtlav (NT) och lunglav (NT). Omgivningen består till största delen av jord- och skogsbruksmark, men myr förekommer även.

Area: 0,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 445 *

Objektet utgörs av halvöppen betesmark som angränsar till Ugglebosjön. I trädskiktet finns björk, tall och ek. Marken ingår i ett större skifte och är svagt hävdad. Påverkan från näringstillförsel saknas, dock är den hävdgynnade floran inte särskilt artrik med vårbrodd, liten blåcklocka, ärenpris, gulmåra, gökärt, blodrot och svartkämpar. Slättergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid fältinventeringen 2016.

Area: 0,6

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 447

Objektet utgörs av betesmark intill gården Karsbo, som är välhävdat, och svagt påverkad. Värdefulla, tidigare hamlade, askar, och enstaka håliga ekar finns. I fältskiktet finns knägräs, revfibbla, stenmåra, stagg, skräppor och veketåg. Marken är frisk. Objektet omringas av jordbruksmark.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 448

Vid gård i Karsbo ligger en betad ädellövnaturskog, med rikligt med grova träd. Ek dominerar, men stort inslag finns av skogslind, liksom asp och enstaka rönn, vårtbjörk, gran och apel. Gamla lindar allmänna, enstaka hamlade, med bohål. Ornitologiska värden finns. Stagg och ängsvädd förekommer. Öppnare ytor finns. Objektet omges av jordbruksmark, men myr finns öster om ädellövnaturskogen. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 449

Norr om Rocksberg ligger Trolle mosse som domineras av glest trädklädd skogsbevuxen myr, men partier med sumpskog förekommer. Tall dominerar. Mossen ansluter till flera tjärnar. Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan. Åt flera håll kantar objektet hyggen.

Area: 3,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 450

Nordöst om Mölleberg ligger en granskog med inslag av tall, norr om Ammamossen. Kjolgranar, gamla senvuxna granar och gamla grova granar är rikligt förekommande. Torrträd och torrakor förekommer också. Skogsbruk är frekvent i omgivningen och avverkning har skett i närområdet.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 453

Objektet utgörs av lövnaturskog vid Ingärdebo med asp, ek, vårtbjörk, lönn, enstaka bok, alm, rönn, sälj, apel och gran. Allmänt med gammal asp finns liksom lönn, även gammal ek och lind. Högstubbar och lågor förekommer. Rikligt med grova träd samt block finns. Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har hittats i området. Under lövskogsinventeringen klassades skogen som klass 2.

Area: 3,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 456 *

Väster om Kärrhult ligger Tolamossen som är ett stort myrkomplex med varierande utseende. Helt öppna myrar finns centralt och i de nordöstra delarna. Tall och gran dominerar, men björk förekommer i kantzoner. I kantzoner finns även en allmän förekomst av äldre träd och död ved. Ute på myren är trädskiktet bitvis homogent och påverkat av skogsbruk. Senvuxna gamla tallar finns, dock i spridda förekomster. Fältskiktet utgörs av arter som tuvull, tranbär, blåbär, kråkbär, vitmossor, blåtåtel samt renlav. Långfliksmossa och kornknutmossa (NT) hittades, samt gnag från vågbandad barkbock.

Förekomsten av avvattnande diken är bitvis hög med en stor lokal påverkan. Påverkan finns även från korsande skogsväg och kraftledningsgata. Även angränsande skogsbruk med hyggen ger lokal påverkan på objektet.

Area: 154,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, kornknutmossa (NT), vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 457

Norr om Ögädet ligger en hästbetad betesmark med kraftigt slyuppslag över större delen av objektet. Trots detta finns mycket hävdgynnad flora som brudborste, hirstarr, knägräs, ljung, ängsvädd och ärenpris. Betesmarken är halvöppen med bl.a. al, asp, björk och hägg. Guldsandbi (NT) har noterats. Objektet omges av jordbruksmark.

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): guldsandbi (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 466 *

Söder om Enesbo ligger ett objekt som utgörs av en liten, mager, torr sluttning ned mot Storsjön. I botten av sluttningen är marken frisk. Hävden är måttlig och här finns hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), prästkrag, revfibbla, blåsuga, liten blåklocka, svartkämpar, knägräs, stagg, blodrot, gökärt, käringtand och gråfibbla. En grov gammal björk samt enstaka apel och yngre rönn och björk förekommer i trädskiktet. Jordblottor och stenrösen förekommer.

Area: 0,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 468 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Arnås som är glest bevuxen av ek, björk, vildapel, hassel och en. Området är påverkat av intensivt hästbete, vilket lett till att flera träd dött och utbredda bestånd av arter som gatkamomill, groblad och kvickrot frodas. I kanter ses hävdgynnade arter som åkervädd, käringtand och liten blåklocka. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,9 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 469 *

Objektet utgörs av trädklädd betesmark i sluttning vid Månsagården. Trädsiktet, som bitvis är relativt tätt, utgörs av björk, ek, lönn och tall. Marken är måttligt-väl hävdad och inte kvävepåverkad. Hävdgynnade arter förekommer främst i de delar som inte är skuggade. I objektet finns slåttergubbe (VU), gökärt, blodrot, fläcknycklar, ärenpris, liten blåklocka och starr. Ohäldsarter som tuvtåtel och veketåg förekommer på vissa partier tillsammans med en del björksly.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), fläcknycklar

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 475

Objektet utgörs av sydostvänd rasbrant söder om Tussered. Naturskog finns som domineras av gran, stort inslag av vårtbjörk samt enstaka asp, rönn och tall. Blockrikt, rikligt med lågor, rik förekomst av skrymslen. Torrträd förekommer sparsamt, och mosklädda block allmänt förekommande. Rasbranten kantar jordbruksmark samt skogsbruksmark med bl.a hyggen.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 476 *

Objektet utgörs av betesmark i sluttning vid Smedavallen. Den övre delen är trädklädd med ek, rönn och al. I söder ligger en solbeslyst, artrik torrbacke med bland annat ett stort bestånd av backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU), gråfibblemattor, prästkrage, rotfibbla, vårbrodd, blåmunkar, bockrot, gökärt, gulmåra, liten blåklocka och svartkämpar. I de skuggigare delarna förekommer grönvit nattviol.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 477

Objektet utgörs av sekundär ädellövnaturskog vid Källhult. Ek dominerar med stort inslag av bok och asp. Enstaka lind, ask (även hamlade), glas- och vårtbjörk finns. Ymnigt mosstäck. Döende ek finns enstaka, håliga aspar sparsamt, och lågor enstaka-sparsamt. Almlav (VU) och lunglav (NT) har tidigare noterats inom objektet. Skogen tillhör ett komplex av lövskog och betesmarker med löv.

Area: 2,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU), lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 479 *

Objektet utgörs av liten, öppen, torr-frisk betesmark som är svagt hävdad. Marken sambetas med ett större skifte söder om. Den norra spetsen var nyligen slagen vid fältbesöket i början av juli. Betesmarken får karaktär av små hållar med mindre vattensamlingar och med arter som kärleksört. I det glesa trädskiktet förekommer björk, ek, tall och gran. Marken hyser rikligt med slåttergubbe (VU), liksom andra hävdgynnade arter: rosettjungfrulin, svinrot, ängsvädd, gökärt, blodrot, vårbrodd, käringtand, svartkämpar, grönvit nattviol och liten blålocka.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 480 *

Objektet utgörs av glest trädklädd, välhävdad betesmark vid Hestra. I öster finns opåverkade delar med arter som slåttergubbe (VU), blodrot, gökärt, ärenpris, gråfibbla, liten blålocka, ängsvädd, stenmåra, ängsfryle och svartkämpar. I väster råder måttlig kvävepåverkan men enstaka hävdgynnade arter förekommer även där. Ett dike rinner i den västra kanten och kring detta förekommer rikligt med vecketåg. I trädskiktet förekommer asp, en spärrgrenig ek, apel, björk och rönn. Stenmurar och odlingsrösen förekommer. Borsttåg (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 481

Objektet utgörs av alsumpskog söder om Källhult, intill Lillesjön. Klibbal, gran och glasbjörk förekommer. Rikligt med död ved. Norr om sumpskogen finns flera lövskogar och betesmarker med lövträd, i övrigt dominerar barrskog med stor del produktionsskog. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 483 *

Objektet utgörs av trädbevuxen myr vid Åsandal som har mindre öppna ytor. Tall, gran och björk dominerar. Bitvis finns mycket rikligt med död ved. Kraftig påverkan finns från dikning och korsande skogsvägar. I fältskiktet växer vitmossor, hjortron, tranbär, ljung, klockljung, blåbär och tuvull.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 13,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 485

Objektet utgörs av grannaturskog väster om Sparyd med inslag av björk och enstaka tall. Stort inslag finns av senvuxna granar. Rikligt med död ved, högstubbar, lågor och torrträd. Gamla björkar allmänna. Ymnigt mosstäcke. Avverkning har skett i anslutning till objektet.

Area: 1,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 486 *

Objektet utgörs av betesmark längs en bäck och en väg vid Hålan. I den nordöstra delen är marken torr-frisk, mager och välhävdat. Här finns rikligt med vanlig backsippa (VU) samt backtimjan (NT), blåmunkar, revfibblemattor, styvmorsviol, käringtand, ärenpris, liten blåklocka, gråfibbla, blodrot, gulmåra och äkta johannesört. Längs bäcken står gråal. Bäckens har strömmande vatten och sandig-grusig botten med inslag av sten och en del död ved. Söder om bäcken är hävden svag och fältskiktet domineras av älgört och veketåg. Längst i söder, mot en stenmur som avgränsar skiftet, förekommer en del hävdgynnade arter, bland annat grönvit nattviol, gulmåra och liten blåklocka.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 487 *

Objektet utgörs av mosse nordost om Trollås bestående av skogsbevuxen myr (tall) med öppen myr centralt inom objektet. Skogen är delvis homogen men har spridda förekomster av äldre tallar som utskiljer sig. I kantzonen finns grov, gammal tall liksom enstaka gamla granar. Sparsam förekomst av död ved. Vegetationen domineras av tuvull, vitmossor, klockljung, tranbär, kråkbär och blåbär. I kantzonen hittas gnag från bronsbjon och granbarkgnagare

Påverkan från dikning finns, som har avvattande effekt.

Area: 42,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: bronsbjon, granbarkgnagare

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 488

Objektet utgörs av äng i Trollås, numera ohävdad, och nästan helt öppen. Frisk-fuktig mark med blodrot, blåttåtel, gökärt, hirsstarr, hundkex, kabbleka, kvanne, stenmåra, svinrot, veketåg, älggräs och ängsvädd finns i fältskiktet. Objektet ligger i jordbruksmark och mellan två större gårdar. Det ingår även i naturreservat och riksintresse för naturvård.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 489

Sydost om Roasjön ligger en ädellövskog som domineras av ek med stort inslag av tall samt enstaka björk, gran, lind och asp. Gamla ekar är allmänt förekommande. Området har åtminstone tidigare betats och här finns fläckar med gräsmarksväxter. Rikligt med grova träd. Rödlistade arter som lunglav (NT) och skrovellav (NT) har noterats i objektet. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3.

Area: 4,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), skrovellav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 490

Sydväst om Mårtenstorp ligger en barrskog intill Ätran med rikligt av grova träd och död ved. Gran, tall och klibbal dominerar med inslag av björk, rönn, asp, sälg och alm. Torrträd, lågor och högstubbar förekommer. Här finns allmänt med gamla tallar och granar. I den södra delen av objektet genomskärs skogen av väg, och i öst kantar ett hygge.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 491 *

Objektet utgörs av öppen betesmark i sluttning ned mot Ätran. I övre liggande delar finns torr-frisk mark, närmare än fuktigare och svagare hävd. Här finns arter som vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), gråfibbla, backnejlika, gökärt, ärenpris, gulmåra och liten blåklocka. I det glesa trädskiktet förekommer björk och gran och i buskskiktet finns en och fläder. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT), ormvråk, buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 493 *

Vid Bergsgården ligger en våtmark med öppen myr och skogsbevuxen myr i kanter. Trädskiktet domineras av tall, men inslag av gran och björk finns. Sparsamt med död som främst förekommer i kanterna av myren. Vegetationen domineras av tuvull, kråkbär, lingon och vitmossor. Vid våtmarksinventeringen klassades objektet klass 3. Objektet är något dikat och kantar till viss del jordbruksmark och barrskog med hygge.

Area: 15,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -



Naturvärdesobjekt 431 består till stor del utav öppen myr, gles bevuxen av senvuxna tallar. Naturtypen är en hänsynskrävande biotop och ingrepp som har avvattnande effekt (dikning, körning med tunga fordon) bör undvikas för att bibehålla den öppna ytan och förhindra igenväxning.

Naturvärdesobjekt 496 *

Nordväst om Gullskog ligger en liten, svagt näringspåverkad betesmark med värdefullt trädskikt: två grova ekar och en grov hamlad ask med guldlocksmossa. Även en bok förekommer. Hassel finns i buskskiktet. I fältskiktet finns liten blåkllocka, stor blåkllocka, ärenpris, gökärt, svartkämpar, gråfibbla, blodrot, hirsstarr och prästkraige. Slåttergubbe (VU) är tidigare noterad men kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 499

Objektet utgörs av lövnaturskog vid Bäckaholm med asp, vårtbjörk och gran. Gammal asp och björk allmänt-rikligt förekommande, vissa av asparna har bohål. Odlingsrösen finns och området är tidigare betat. Stora värden finns för fågellivet. Ett hygge kantar skogen i söder, annars domineras närområdet av jordbruksmark.

Area: 1,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 500

Objektet utgörs av eknaturskog i bergbrant strax norr om Kleven. Inslag finns av gran och tall samt enstaka bok, lönn, lind, björk, rönn och hägg. Stort inslag finns av senvuxna ekar och gamla ekar. Döende träd, högstubbar, torrträd, lågor förekommer. Rikt på skrymslen. Rödlistade arter som pulverädellav (VU) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Eknaturskogen är en del av ett komplex med flera mindre områden med löv i närheten av varandra, omgivna av yngre barrskog. Objektet blev klassat klass 3 under lövskogsinventeringen.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): pulverädellav (VU), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 501 *

Objektet utgörs av öppen betesmark med värdefulla ekar i Borryd. I den södra delen förekommer några grova och gamla ekar med grynig filtlav. Här finns även ett antal grova hasselbuketter. Även enbuskar förekommer. I trädsiktet finns också ask, lönn, björk och rönn. Död ved förekommer i liten omfattning. I betesmarken finns vissa hävdgynnade arter som liten blålocka, ärenpris, stenmåra, fläcknycklar, grönvit nattviol, gökärt, ängsfryle och hirsstarr. Bitvis dominerar ohävdarter. I den norra delen finns ett parti som är tydligt kvävepåverkat med skräppor, veketåg, smörblomma och örnbräken. Hävdnen är överlag måttlig. Slättergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 1,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, fläcknycklar, grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: stenmur

Naturvärdesobjekt 502

Norr om Kleven ligger en gransumpskog med inslag av glasbjörk samt enstaka klibbal, tall, ek, asp och ask. Lövträdssocklar är allmänna. Här finns även allmänt med lågor av gran och lövträd, senvuxna granar, högstubbar av björk och talltorrakor. Rödlistade arter som stubbtrådmossa (NT) och vedtrappmossa (NT) har tidigare noterats. Gransumpskogen är en del av naturreservat.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): stubbtrådmossa (NT), vedtrappmossa (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 503

Norr om Kleven ligger en eknaturskog, tidigare beteshävd, vid en torprest, där fläckar med gräsmarksväxter finns kvar. Inslag av björk finns, liksom enstaka gamla askar och lindar som är hamlade. Döende träd, torrträd och lågor förekommer. Flera rödlistade lavar förekommer såsom blek kraterlav (VU), almlav (VU), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT). Eknaturskogen tillhör naturreservat. Avverkning har skett i anslutning till objektet.

Area: 3,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blek kraterlav (VU), almlav (VU), lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 504

Objektet utgörs av eknaturskog norr om Kleven. Inslag av gran samt enstaka rönn och björk finns. Torrträd, grova liggande grenar, lågor och senvuxna ekar förekommer tämligen allmänt. Lunglav (NT) har noterats. Skogen tillhör naturreservat.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 511

Objektet utgörs av lövskogslund intill Storasjöns norra strand, norr om Sjöbo. Ek och asp dominerar med inslag av björk och enstaka lönn, lind, sälg, rönn och apel. Gamla aspar är allmänna, även sparsamt med gammal ek, sälg och lind. Lågor och torrträd förekommer. Rödlistade arter som oxtungssvamp (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats. Objektet har odlingsrösen. Mindre väg genomskär objektet i nord-sydlig riktning.

Area: 5,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): oxtungssvamp (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 513 *

Objektet utgörs av mestadels öppen betesmark vid Borryd. Marken är måttligt-välhävdad. I trädskiktet förekommer enstaka apel och tall samt ett dött stående träd. Buskskiktet utgörs av en och ung gran. Flera odlingsrösen förekommer. Förhållandevis artrik hävdgynnad flora finns med slättergubbe (VU), jungfrulin, fläcknycklar, gråfibbla, liten och stor blåklocka, blodrot, ärenpris, gökärt, käringtand, blåsuga, ängsvädd, hirsstarr, stagg, gulmåra och krypvide.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: fläcknycklar, slättergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 514

I Bråtås ligger en naturskogsartad ekskog med riklig förekomst av grova träd. Enstaka ask, asp, lind, lönn och fågelbär finns. Hamlad lind och lönn förekommer vid gården i norr. Gammal ek är allmänt, även gammal asp och lind. Torrträd och hålträd förekommer. Grynig filtlav (NT) har noterats. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2–3, och objektet står under biotopskydd (förutom den norra delen).

Area: 2,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 515

Norr om Lidagården ligger ett lövträdsrikt skogsbryn i stark sluttning ned mot åkrarna runt Ätran. Ek, gran och asp, enstaka rönn, säl, björk, bok och lind finns. Senvuxna ekar, högstubbar. Lågor är allmänna, även klen död ved. Block förekommer. Den västra delen kantar jordbruksmark, och den östra delen kantar hygge.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 518

Kring det övergivna torpet Grävingsås står flera gamla ekar och lindar. Även björk, ask och apel förekommer. Enstaka torrträd förekommer. Objektet omges helt av avverkade ytor.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 521 *

Vid Backen ligger Svartemossen och Brede mad. De centrala delarna utgörs av öppen myr samt följer ett naturligt vattenflöde som varierar i form och bildar b.la höljor och fuktdråg. Bitvis hittas lösbottnar. I kanterna finns skogsbevuxen myr med dominans av tall samt inslag av gran och björk. Andelen gamla träd är låg och förekommer främst i form av senvuxna tallar. Död ved förekommer sparsamt. Markskiktet består till stor del av blåtåtel, flaskstarr, trådstarr, myrlilja, tuvull, blodrot, pors, vitag, ängsull, tranbär, rosling, skvattram och vitmossor. Borsttåg (NT) har tidigare noterats men kunde inte återfinnas vid inventeringen 2017.

Hydrologisk påverkan från skogsvägar och dikning finns.

Area: 88,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 523

Vid Gammalsjö ligger en trädklädd betesmark, som är öppnare i norr. Rikligt med grova träd finns. Ek dominerar med inslag av bok, lind och vårtbjörk. Gamla ekar är allmänt, även enstaka gammal lind och björk. Lågor förekommer sparsamt. Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats. Betesmarken är del av naturreservat och riksintresse för naturvård. Objektet kantar jordbruksmark och barrskog.

Area: 3,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 524

Vid Gammasjö ligger en naturskog med ek och tall, inslag av björk samt enstaka gran, lind och lönn. Rikligt med grova träd finns. Skogen angränsar till Fegens norra strand. Gammal ek, tall och björk allmän-rikligt, döende träd, torrträd och lågor sparsamt. Lodytor förekommer. Rödlistade arter såsom grynig filtlav (NT), flytsäv (VU) och strandlumner (NT) har tidigare noterats. Naturskogen omges av jordbruksmark, dock finns det flera områden med lövskog och betesmarker med löv i omgivningen. Objektet står under biotopskydd, är del av naturreservat och är riksintresse för naturvård.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), flytsäv (VU), strandlumner (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 525

Vid Gammalsjö ligger en ädellövskog vid Västra Fegens norra strand. Ek dominerar över bok, björk och lind. Enstaka tall förekommer. Rikligt med grova träd. Området betas. Gammal ek finns rikligt, gammal lind tämligen allmän. Enstaka mulmträd förekommer. Rödlistade arter som oxtungssvamp (NT) och lunglav (NT) har tidigare noterats. Objektet kantar ekskog samt jordbruksmark. Ädellövskogen har naturvårdsavtal, är del av naturreservat samt är ett Natura 2000-område och riksintresse för naturvård.

Area: 1,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): oxtungssvamp (NT), lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 527

Vid byn Trollås ligger igenväxande lövängar och ädellövnaturskog med ek, asp, lind och glasbjörk samt enstaka ask, bok, lönn, oxel, rönn och apel. Ett stort antal gamla hamlade lindar, även hamlad björk förekommer. Gammal ek och hassel finns. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT) och blek kraterlav (VU) har tidigare noterats. Objektet har naturvårdsavtal, är del av naturreservat samt är riksintresse för naturvård. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. En väg genomsär i nord-sydlig riktning.

Area: 12,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), blek kraterlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 528

Öster om Kvarntorpet ligger en alsumpskog kring bäck som leder till Agnsjön. Inslag av björk finns samt enstaka gran och tall. Enstaka senvuxna granar. Rikligt med alsockar, även håliga alar förekommer. Objektet kantar våtmark, och omgivningen domineras av barrskog med viss produktion.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), blek kraterlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 530

Objektet utgörs av liten, svagt hävdad betesmark vid Laggared. Viss igenväxning finns. Fältskikt med blodrot, blåsuga, gökärt, smörboll, svartkämpar, vårbrodd och ängsvädd. Frisk-fuktig mark, med delvis svag-tydlig kvävepåverkan. Enstaka värdefull ek och sälg. Objektet kantar jordbruksmark och ung barrskog (med visst lövinslag).

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 538

I en betesmark och längs vägen vid Kartsnäs står ett flertal hamlade gamla askar samt gamla lönnar, ek, enstaka apel och fågelbär. Mulmträd förekommer. Här finns flera rödlistade lavar såsom lunglav (NT), grynig filtlav (NT), blylav (EN), skrovellav (NT), läperlappslav (NT) och olivbrun gyttelav (NT). Betesmarken är gårdsnära och kantar till viss del hyggen. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll, lunglav (NT), grynig filtlav (NT), blylav (EN), skrovellav (NT), läperlappslav (NT), olivbrun gyttelav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 542

Vid Handbynäs ligger en lövnaturskog med ek, ask, klibbal och glasbjörk samt enstaka rönn, alm, sälg och gran. Enstaka jätteträd förekommer. Lågor och grova liggande grenar finns. Enstaka sälg på socklar. Lunglav (NT) har tidigare noterats. Under lövskogsinventeringen klassades skogen som klass 2. Objektet kantar jordbruksmark och barrskog.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 543

Väster om Strandsjönäs ligger en gransumpskog med enstaka vårtbjörk, klibbal, sälg, rönn och asp. Rörligt markvatten, hög och jämn luftfuktighet. En bäck i den östra kanten ansluter till Lysjön. Gammal senvuxen gran är allmänt förekommande, och klen död ved finns i måttlig mängd. Området har värdefull kryptogamflora. Jord- och skogsbruksmark dominerar omgivningen.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 544

Norr om Sandsjönäs ligger en lövskogslund i nordvästsluttning med hög och jämn luftfuktighet. Ask och ek dominerar, med inslag av klibbal och björk, enstaka asp, gran, hassel, hägg och rönn. I fältskiktet har tidigare noterats blåsippa, gullpudra och bäckbräsma. Norra delen av objektet ansluter till skogsbruksmark med ung barrskog och hygge, i söder ligger jordbruksmark. Under lövskogsinventeringen klassades lunden klass 2.

Area: 4,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blåsippa, gullpudra, bäckbräsma

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 546 *

I Björlida ligger en öppen betesmark med svag-måttlig hävd. Några grova ekar förekommer, liksom björk. Buskskikt med en och uppväxande gran. Runt ett fuktstråk i objektets centrala del har gallring skett, och där finns gott om björksly. Det sydvästra hörnet av marken är tydligt kvävepåverkat, men övriga delar är i stort sett opåverkade. Slåttergubbe (VU), ängsvädd, blodrot, grönvit nattviol, gråfibbla, gökärt, ärenpris, stenmåra, krypvide och käringtand förekommer i fältskiktet.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 548 *

Nordväst om Hultet ligger Blekasjömossen som är ett mycket varierande objekt med kärr, holme, myr och större delen skogsbevuxen myr dominerad av tall. Mycket åldersvariation b.l.a med sena och småvuxna tallar förekommer och i det södra området hittas tallar upp till 250 år och flera över 200 år. Skogen har lövinslag (björk) samt gran, både återväxt och äldre träd med gammelgranlav. Äldre spår av småskaligt skogsbruk hittas i form av gamla stubbar m.m. Stående död ved, torrakor och högstubbar förekommer. I markskiktet hittas klocklång, ljungrön, odon, blåbär, lingon, hjortron, tuvull, kråkbär, pors, skvattram, och kallgräs. I bottenskiktet hittas björnmossa, vitmossor (b.l.a granvitmossa), västlig hakmossa, husmossa, kammosa och renlav. Även blek ostronmussling, vanlig flarnlav, svart spiklav och spiklav sp. finns och tranfjäder hittades.

Kalhyggen angränsar i olika riktningar och en traktorväg går över objektet vilket har en negativ påverkan på dess naturlighet.

Area: 38,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: trana, västlig hakmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 551 *

Frisk-fuktig betesmark vid Björlida. Marken är mestadels öppen men enstaka ek, björk och sälgrön förekommer. Svagt-måttligt hävdad och mest opåverkad. I fältskiktet finns ett antal hävdgynnade arter som slåttergubbe (VU), ängsfryle, svinrot, vårbrodd, liten blåklocka, gråfibbla, ängsvädd, krypvädd, stagg, blodrot, gökört, hirsstarr och svartkämpar. Flera odlingsrösen och stenmurar förekommer.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 552

Objektet utgörs av örtrik allund längs bäck vid Björkås. Stort inslag av glasbjörk och ask samt enstaka asp, sälgrön och ek. Lågor förekommer sparsamt. Området är översilat. Objektet kantar tjärn, och närområdet domineras av produktionsskog (barr).

Area: 3,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 553 *

Söder om Björlida ligger ett betat skogsbryn i sluttning. Marken är torr-frisk med ett glest trädskikt av björk, ek, rönn och gran. Buskskiktet utgörs av hassel. Marken är välhävdad och sambetas med skogen väster om samt skiftena öster om. I fältskiktet återfinns bland annat slåttergubbe (VU), svartkämpar, stenmåra, ärenpris, liten blåklocka, ängsvädd, blodrot, gråfibbla, gökört och kärleksört.

Area: 0,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 554

Ädellövträd vid torprest vid Björkås. Lönn, ask, sälg, glasbjörk, enstaka ek och apel. Enstaka hamlade lönnar. Gammal lönn och ask allmänt förekommande. Grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Här finns rikligt med bärande buskar. Jordbruksmark och barrskog omger objektet.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 557 *

Blandsumpskog sydväst om Borgåsen med tall, klibbal, gran och björk. Medelålders träd dominerar, och enstaka gamla träd förekommer. Död ved finns bitvis allmänt. Naturliga bäckflöden går genom objektet och omges av rikliga bestånd med missne. Andra arter i objektet är till exempel slidstarr, bäcknate, strandlysing, vattenklöver, ängsull och vitmossor. *Skötselöverslag:* Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet, för att undvika att exempelvis framtida skogsavverkningar får en uttorkande påverkan på objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 2,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, långfliksmossa, missne

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 558

Söder om Lövhult ligger en källpåverkad lövskog i nordvästsluttning. Klibbal, gran, glasbjörk och ask samt enstaka asp och ek finns. Högstubbar, lågor och torrträd är allmänna. Lövträdssocklar förekommer sparsamt. Närområdet består av lövskog och ung barrskog. Under lövskogsinventeringen klassades objektet som klass 3.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 566 *

Objektet utgörs av brant östsluttning norr om Överlida som domineras av gran men som på lägre delar övergår i lövskog med bok, ek, björk och klibbal. Gamla träd förekommer allmänt och mängden död ved är riklig. Omgivningarna präglas av unga barrskogsbestånd och tomtmark. Vegetationen utgörs av arter som väggmossa, husmossa, blåbär, skogsstjärna, harsyra och stor kvastmossa.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det är positivt om mängden död ved kan ökas ytterligare.

Area: 2,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: krushättemossa, västlig hakmossa, långfliksmossa, kambräken

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 571

Söder om Udden ligger en mycket liten del av myrkomplexet med Bragnusmosse och Tranåsamossen, inom kommunen. Denna del är glest skogsbevuxen och förhållandevis orörd, men skogsbruk förekommer i omgivningen och närområdet. Hela komplexet som objektet är en del av, klassades som klass 1 under våtmarksinventeringen och är riksintresse för naturvård.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 572 *

Objektet utgörs av mager betesmark vid Ararp som sambetas med gammal åkermark. Objektet består av en glest trädklädd kulle med ek, björk, asp och apel samt enbuskar. Marken är torr-frisk, och mindre partier är svagt näringspåverkade. Hävden är måttlig. I söder finns flera fina, torra varma sydsluttningar. Slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), liten blåklocka, gökärt, svartkämpar, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd, käringtand, ängsvädd, prästkraze, ängsfryle, blodrot och äkta johannesört förekommer bland annat.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 573

Öster om församlingshemmet i Sexdrega finns en trädmiljö med flera grova askar (varav ett jätteträd), en lönn och ett par balsampopplar (varav ett jätteträd). Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, fällmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 574

Objektet utgörs av lövskog vid Skogsgården. I söder finns ädellövnaturskog med ek, glasbjörk, klibbal, ask samt enstaka asp, alm, rönn, gran och hägg. Gamla ekar och askar, och rikligt med grova träd samt död ved förekommer. I öster ligger en klibbalsumpskog vid bäck med senvuxna träd. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT), desmeknopp (NT) har tidigare noterats. I den norra delen av objektet ligger en vägkorsning med vägar som korsar objektet. Hygge kantar lövskogen i söder. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2–3.

Area: 4,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), desmeknopp (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 578

Objektet utgörs av betesmark vid Stomsberg, som troligen är en gammal slätteräng, dock ej särskilt artrik. Blåsuga, gökärt, mandelblomma, svartkämpar och vårbrodd finns. Igenväxande med vecketåg och örnbräken. Enstaka värdefulla ek och lönn. Även alm, asp, björk, och gran hittas. Objektet ligger i gårdsnära miljö och kantar jordbruksmark samt skog.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 579 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark stadd i igenväxning vid Boderås. Mycket uppslag av björksly förekommer. I marken finns flera värdefulla ekar, som dock är hotade av den pågående igenväxningen. Här finns ännu relativt gott om hävdgynnade arter som slättergubbe (VU), ängsvädd, backtimjan (NT), stagg, grönvit nattviol, rotfibbla, vårbrodd, blodrot, gökärt, ärenpris, liten blåklocka, käringtand och svinrot. Signalarterna sotlav och rostfläck finns på några av ekarna.

Area: 1,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), rostfläck, sotlav

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 580

Vid kyrkogården i Sexdrega står ett tjugotal värdefulla lönnar, askar och lindar varav en del är hamlade. Läderlappslav (NT) förekommer på nästan alla träd, även flera andra rödlistade lavar har noterats.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: grynnig filtlav (NT), lunglav (NT), läderlappslav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 581 *

Objektet utgörs av ädellövskog vid Överlida med ek, alm, lönn, ask, lind, hassel, björk, sälg och hägg. Sparsamt med gamla träd och död ved förekommer, någon grov ek finns dock. Källpåverkat parti med fuktälskande flora finns centralt i objektet. I fältskiktet växer arter som majbräken, älgört, kärrfibbla, läkevänderot, vitsippa, nejlikrot, liljekonvalj och kambräken. Lunglav (NT) är känd ifrån området, men kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Behov finns dock av att försiktigt frihugga de större ekarnas kronor, så att ekarna kan utvecklas till gammelträd.

Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: krushättemossa, västlig hakmossa, kärrfibbla, kambräken

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 582

I Sjötorp ligger en liten del av Bragnumsmosse som är ett stort myrkomplex öster om kommungränsen. Myren är skogsbevuxen med liten göl. Dike från jordbruksmark korsar objektet i de centrala delarna, och mynnar i göl. Myren kantar även Locksjön där marken är fuktigare. Bragnumsmossen (inklusive naturvärdesobjektet 282) klassades som klass 1 vid våtmarksinventeringen och är riksintresse för naturvård.

Area: 2,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 586 *

Objektet utgörs av öppen betesmark vid Ängalund som ingår i större fålla. Allmän förekomst av arter som veketåg och smörblomma tyder på högre näringsrikedom. I övrigt består vegetationen av arter som stagg, hundstarr, ängsviol, harstarr, blodrot, svartkämpe och stjärnstarr. Borsttåg (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 0,3 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 587 *

Objektet utgörs av i huvudsak öppen betesmark vid Öbranstorp med enstaka förekomst av hävdpräglade träd och buskar. Berg, odlingsrösen och stenmurar förekommer. Floran är hävdgynnad med arter som slåttergubbe (VU), ängsvädd, svinrot, jungfrulin, hirsstarr, stagg, knägräs, gökärt och blodrot. Objektet ingår i två olika betesfällor.

Area: 0,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 589

Objektet utgörs av betesmark intill Ryasjön, vid Sjöbo, med torr-fuktig mark. Blodrot, gråfibbla, rotfibbla, stenmåra, veketåg och örnbräken förekommer. Glest träd- och buskskikt med björk, al, asp, rönn, en, pors och viden. Svag hävd, opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Klassad klass 3 under lövskogsinventeringen. Det ligger flera betesmarker med lövinslag runt Ryasjön, vilket står ut från omgivningen vilken domineras av produktionsskog (barr).

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 594

Norr om Gunnboås, helt omgiven av skog, ligger en betesmark vid torpmiljö, som inte är särskilt artrik men välhävdad. Blodrot, blåsuga, gökärt, liten blåklocka, prästkrage, stenmåra, svartkämpar, vårbrodd förekommer, liksom enstaka värdefull ek, lönn och rönn. Marken är opåverkad. I söder ligger det en göl strax utanför objektet, annars domineras omgivningen av produktionsskog med flera hyggen.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 596

Objektet utgörs av liten, frisk-fuktig betesmark vid Lilla Snärsbo. Hirsstarr, knägräs, krypvide, skräppor, smörboll, stagg, stenmåra, svinrot, veketåg, älggräs och ängsvädd förekommer. Enstaka al, björk, en och viden finns. Välhävdad mark, ingen-svag kvävepåverkan. Dike genomskär objektet i sydöstlig riktning. Betesmarken är omgiven av jordbruksmark.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): smörboll

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 597

Objektet utgörs av liten, halvöppen betesmark väster om Lilla Snärsbo. I trädskiktet finns ek, björk och tall. Välhävdad, torr-frisk och i princip opåverkad mark. I fältskiktet återfinns gulmåra, knägräs, revfibbla, stenmåra samt rikligt med ängsvädd. Objektet omges av jordbruksmark, men det ligger även flera betesmarker med lövinslag i omgivningen.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 598 *

Norr om Aspelund ligger St. Sjömossen som är ett varierande objekt med blandsumpskog, lövsumpskog med klibbal och glasbjörk samt öppen myr med bladvass och trådstarr. Även ett litet laggkärr dominerat av björk, med flaskstarr och vattenklöver, finns, och en liten höjd som kantar kärret har även ett fåtal enar. Objektet är delvis beläget vid Apelnässjöns norra strandkant. I den sydöstra delen finns en höjd med blandskog bestående av gamla granar och asp, även enar finns här. Allmänt med död ved och lågor finns i olika nedbrytningsstadier samt torrakor. Den döda veden är även i varierande i ålder, med både äldre och yngre träd, och trädslag. Naturlig hydrologi med utrinningsområde som leder till kärret. En bäck meandrar naturligt med strömmande och lugna partier, dock med ett dike som ansluter sig till den. I markskiktet hittas ljung, tuvull, klockljung, blåbär, kråkbär, tranbär, lingon, pors och kärrtistel. Även blåtåtel och kärrsilja finns i de mer öppnar markerna. Vitmossor, blåmossa, björnmossa och renlav påträffas. Eldticka, fnösketicka, björkticka, blåticka, trollsmör, svart spiklav, gammelgranslav, sprängticka, brundpudrad nållav (NT) och vednål förekommer. Insektsnag från större mörghorre, vågbandad barkbock och tallbock hittas.

Kalhyggen angränsar i olika riktningar med direkt påverkan på området (ingen skyddszon), och bilväg korsar objektet. Småskaligt skogsbruk med plockhuggning, dock ej i någon större utsträckning, och högstubbar har lämnats.

Area: 32,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: brunpudrad nållav (NT), vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 599

Öster om Aspelund ligger ett litet område med gamla lövträd vid en torpruin. Glasbjörk och asp dominerar med stort inslag av tall samt enstaka apel, hägg och gran. Lågor förekommer sparsamt. Området har även kulturhistoriska värden. Rödlistade arter som grynig filtlav (NT) och olivbrun gytterlav (NT) har tidigare noterats. En väg skär objektet i sydöstlig riktning.

Omgivningen domineras av skog.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT), olivbrun gytterlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 600

Objektet utgörs av litet område vid en torprest med gammal lönn och sälg. Även glasbjörk och enstaka gran förekommer. Grynig filtlav (NT) har noterats. Omgivningen består till stor del av produktionsskog och hyggen, samt skogsbevuxna våtmarker.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 613 *

Vid Övre Kläggshult ligger Ammamossen som till viss del är glest skogsbevuxen myr, men öppen myr dominerar. Trädskiktet består till största delen av senvuxna, små tallar av hög ålder men även inslag av gran och björk finns. Stora ytor är helt trädfria. Död ved förekommer sparsamt till allmänt. Objektet är relativt orört, förutom en kraftledning som korsar objektet i söder, och har bitvis välutvecklade sträng- och höljstrukturer. Området har höga värden för fågellivet och myrtyperna är representativa för regionen. Markskiktet domineras av myrlilja, pors, vass och blåtåtel. Inom objektet påträffades även kungsfågel (VU), tjäder och buskskvätta (NT). Storspov (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2017. Vid våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1, och det är även ett Natura 2000-område samt riksintresse för naturvård.

Area: 397,0 ha

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: kungsfågel (VU), tjäder, buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: -



Naturvärdesobjekt 613 har flera senvuxna och krumma tallar som kantar öppen myr. Tallen är även viktig föda för tjäder, en art som påträffades vid fältbesöket 2017.

Naturvärdesobjekt 614

Vid Eriksberg ligger en glest trädklädd betesmark med ask, asp, björk, ek, gran, hassel, hägg, lönn och rönn, som är tydligt stenbunden. Arter som hirstarr, knägräs, krypvide, revfibbla, stagg, stenmåra och ängsvädd förekommer. Svag-välhävdat med ingen eller svag kvävepåverkan. Betesmarken kantas till största delen av ung produktionsskog (barr) och lövskog/blandskog.

Area: 2,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 615

Vid Strömsberg ligger en granskog i sluttning med en källa. Enstaka asp, ek, tall och björk. Block, lågor och högstubbar är allmänna. Längre upp övergår sluttningen i en rasbrant. Här finns stort inslag av ek och rikligt med död ved: högstubbar, klen död ved, lågor av lövträd. Granskogen kantas till stor del av produktionsskog i form av hyggen och ung barrskog. Objektet har biotopskydd.

Area: 4,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 616

Objektet utgörs av källpåverkad granskog vid Strömsberg. Enstaka glasbjörk förekommer. Stort inslag av senvuxna träd. Lågor av gran finns sparsamt. Hyggen förekommer tätt inpå granskog, vilken även omges utav produktionsskog.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 617

Objektet utgörs av myr vid Götabäcken, väster om Boda. Både öppen och skogsbevuxen myr finns, och i norr ligger tjärnen Lilla Ässjö. Myren är relativt opåverkad förutom väg som korsar objektet centralt. Omgivningen har flera myrar och våtmarker som bildar ett stort komplex. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1.

Area: 73,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 620

Objektet utgörs av gransumpskog nordost om Hultaberg. Stort inslag finns av gamla senvuxna granar och enstaka gamla tallar. Även glasbjörk och klibbal förekommer. Hög och jämn luftfuktighet. Lågor och torrakor är sparsamt förekommande. Objektet fortsätter utanför kommungräns. Sumpskogen kantar hygge i väst, med liten – obefintlig skyddszon.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 622

Objektet utgörs av lövnaturskog väster om Österlid. I trädskiktet finns gran, asp, vårtbjörk och ek samt enstaka rönn, tall och klibbal. Gammal asp och ek är allmänt förekommande. Här finns håliga träd, högstubbar och lågor. Rik hänglavsforekomst finns. Odlingsröse förekommer. I omgivningen förekommer framför allt barrskog, men även områden med lövskog finns sydväst om objektet. Under lövskogsinventeringen klassades skogen som klass 3.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 624

Objektet utgörs av hagmarksskog med upphörd beteshävd vid Ånarp. Ask och ek samt enstaka gran förekommer. Gammal ask är allmänt förekommande, och gammal grov gran sparsamt förekommande. Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats. En källa och rännilar finns. Rikligt med grova träd.

Area: 2,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 625

Objektet utgörs av öppen betesmark intill Kolarpasjön, vid Kolarp som är välhävdad, med ingen-svag kvävepåverkan. Enstaka al, asp, björk, en, gran, hägg, lind, lönn och rönn finns. Vanlig backsippa (VU), blodrot, gulmåra, hirsstarr, knägräs, revfibbla, ängshavre och ängsvädd förekommer. Omgivningen består till stor del av jordbruksmark med flera betesmarker.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 629 *

Objektet utgörs av vidsträckta mader vid Håvsjön, Håcksvik, med överlag måttlig-god hävd. De grunda vattenområdena domineras av lågstarrarter, bland annat hirsstarr. Här finns även bland annat blåtåtel, ängsull, stagg, gökärt, blodrot, liten blåklocka, ängsfryle, kärrviol och ängsvädd. Området är värdefullt för fågellivet. Vid fältbesöket noterades grågäss och enkelbeckasin. Maderna är mestadels öppna men en del yngre björk samt ek och al förekommer. Längs ån finns en hel del stående död al. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 16,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: trana, buskskvätta (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 630 *

Objektet utgörs av betesmark vid resterna av torpet Skogen, norr om Snärsås. Marken är mjukt kuperad och bevuxen av enstaka ek, björk, tall och en. Hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, slåttergubbe (VU), liten blåklocka, blodrot, knägräs, hirsstarr, prästkrage, rotfibbla och gökärt finns. En mindre del av objektet gränsar till Torkelsjön.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 633 *

Vid Skeppås ligger en betesmark som delvis är öppen och delvis är trädklädd. En torr sydsluttning i den östra delen är särskilt fin med bland annat backtimjan (NT). I marken förekommer enstaka riktigt grov ek med rostfläck och två grova sälgar varav en är hålig. Även lönn och björk finns. Marken är bitvis tydligt näringspåverkad medan andra delar är opåverkade. Svartkämpar, vårbrodd, liten blåklocka, käringtand, ängsfryle, gråfibbla, gulmåra, gökärt, svinrot och ärenpris finns i fältskiktet. Vanlig backsippa (VU), dvärglin (VU) och slåttergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016, men markägaren menar att enstaka exemplar av vanlig backsippa finns i betesmarken.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: backtimjan (NT), rostfläck

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 636

Söder om Strömsberg ligger en granskogsklädd kanjondal, naturskogsartad, och rasbrant vid bäck. Stort inslag av klibbal, enstaka rönn, asp, ek och alm. Rikt på block, död ved som högstubbar, torrträd och lågor samt skrymslen. Gamla grova granar och gamla aspar är allmänt förekommande. Kanjondalen omges av hyggen i öst och väst. Den södra delen av objektet har biotopskydd.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 637

Väster om Holmarp ligger Trolle mosse vilken är till största del skogbevuxen, men partier med sumpskog förekommer. Tall dominerar. Mossen ansluter till flera tjärnar och omger till viss del Mossasjön. Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1.

Area: 79,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 639

Norr om Rocksberg ligger en liten del av Trolle mosse, söder om Sävsjön. Objektet är mestadels glest skogsbevuxen, men partier med sumpskog förekommer. Tall dominerar. Vägdragning och dikning har gett svag lokal påverkan och i vissa delar kantar objektet gamla hyggen/uppväxande barrskog. Del av objekt som har klassats klass 1 under våtmarksinventeringen.

Area: 2,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 640 *

Objektet utgörs av ohävdad, öppen betesmark vid Vrånglarp. Marken är frisk med både torra och fuktiga partier. En bäck rinner centralt i skiftet. Bäckens omges av fuktig mark med veke- och knapptåg och tistlar. Norr om bäcken finns bland annat en liten torrbacke intill en ruin efter en jordkällare där backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU) och gråfibbla växer. Övriga delar är under igenväxning och hyser enstaka hävdgynnade arter som liten blåklocka och gulmåra. Betesmarken är opåverkad av näringstillförsel.

Area: 0,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 642 *

Objektet utgörs av kuperad betesmark söder om Mjöbäck belägen på mindre åsar glest bevuxna av björk. Marken är i huvudsak torr och domineras av hävdgynnade arter som käringtand, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, stenmåra, slåttergubbe (VU), gråfibbla, blåsuga, knägräs och ängsvädd. Mindre delar av objektet ligger i anslutning till Högvadsån.

Area: 1,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 644 *

Objektet utgörs av varierad och vidlyftig betesmark vid Snärsås som är bevuxen av spärrgreniga ekar och björkar samt lönn, vildapel, hagtorn, sälg, rönn och tall. Några ekar är grova. I norr finns delar som består av fukthed med typiska arter som borsttåg (NT), klockljung, myrlilja, granspira och hirsstarr. Även i övriga delar av området finns hävdgynnad flora bestående av exempelvis prästkrag, knägräs, ängsvädd, blodrot, vårbrodd och liten blåklocka.

Area: 6,2 ha

Naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), grönvit nattviol, granspira (NT), borsttåg (NT), sotlav, rostfläck

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse.

Naturvärdesobjekt 645 *

Objektet utgörs av gransumpskog norr om Häjderna, belägen längs naturlig bäck med stort inslag av klibbal och björk. Gamla träd och död ved förekommer allmänt. Gammelgranslav draperar flera av träden. I fältskiktet finns bland annat blåtåtel, kärrviol, frossört, flaskstarr, stjärnstarr, mannagräs och blåbär.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omkringliggande skogsbruk har skapat kantzoner mot objektet vilket påverkar luftfuktigheten negativt. Det är viktigt att avsätta en skyddszon runt objektet där skogsbruket bedrivs extensivt. Åtgärder som ökar mängden död ved är positiva för naturvärdet.

Area: 0,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: missne, glansfläck, västlig hakmossa, långfliksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 648

Objektet utgörs av barrblandskog öster om Ringsås med tall och gran samt inslag av björk, rönn, ek, asp och sälg. Lågor och torrträd är rikligt förekommande. Block med mossfäll finns också. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark, och i öst passerar Ätran.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 649

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Mårtenstorp, delvis trädklädd med gran, en, björk, sälg och tall. Mest opåverkad, frisk mark. I fältskiktet märks gulmåra, knägräs, prästkrag, revfibbla, stagg, stenmåra, ängshavre, ängsvädd och ögontröstar. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark och vissa delar kantas av hyggen och uppväxande ungskog.

Area: 2,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 650 *

Vid Råhagen ligger Mårtenstorpamossen vilken är en skogsbevuxen myr dominerad av tall. Inslag av gran och björk förekommer. Tall 100–110 år och död ved i form av lågor och torrakor i olika nedbryningsstadier finns, dock många yngre exemplar. Flera betesskadade/köldskadade träd hittas inom objektet. Åldersvariation på träd med föryngring av alla trädslag. Inom objektet hittas laggkärr/björksumpskog med stående vatten och allmän förekomst av död ved i form av lågor och torrakor, vissa något äldre exemplar (av flera trädslag). Även en liten öppen myr finns. Vegetationen består av tuvull, ljung, rosling, hjortron, lingon, blåbär, klockljung, odon och kråkbär. Även vitmossor, björnmossor, mattlumner, renlav, fnösketicka, björkticka, fjällig taggsvamp samt svart spiklav finns.

Direkt påverkan av kalhyggen (f.f.a i nordvästra hörnet) utan skyddszon finns, dikning vid skogsväg i sydvästra delen, samt körskador igenom stora delar av objektet (med viss plockhuggning). Det går även en stor ledningsgata genom objektet (med bl.a enar), samt mindre ledningsgator eller ”skövlade” vägar.

Area: 33,6 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: mattlumner, fjällig taggsvamp

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 654

Objektet utgörs av lövskogslund vid Ånarp med ek, björk och gran samt enstaka tall och rönn. Stort inslag av grova träd. Gammal ek förekommer allmänt. Lågor finns sparsamt. Enstaka gammal björk, sälj förekommer också. Gammal hassel finns allmänt. Under lövskogsinventeringen klassades lunden klass 2. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark, men flera lövskogsområden ligger i närheten.

Area: 2,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 655

Sydöst om Österlid ligger en barrblandskog med gran, tall och vårtbjörk. I området finns rikligt med lågor av både gran och björk. Objektet kantar öppen myr och uppväxande hygge.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 657

Objektet utgörs av hagmarksskog vid Totebo med ek och lind samt enstaka ask, rönn, björk och lönn. Enstaka hamlad lind och ask finns. Gammal lönn, ek, lind förekommer, den sistnämnda allmänt. Lunglav (NT) har noterats. En väg korsar skogen centralt. Objektet omges av jordbruksmark men ansluter även till lövskog. Under lövskogsinventeringen klassades skogen klass 2.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 658

Vid Almesabo finns en gårdsnära lövängsrest med hamlade askar och lindar. Även ek, björk och asp förekommer. Rikligt med grova träd finns. Området har stora botaniska värden och en värdefull kryptogamflora med bl.a. almlav (VU). Under lövskogsinventeringen klassades lövängen klass 2. Objektet omges av jord- och skogsbruksmark, men ansluter även till lövskog. En väg korsar objektet.

Area: 3,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): almlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 665 *

Vid Ängasjö ligger en svagt hävdad, glest trädklädd betesmark. Marken är svagt-tydligt kvävepåverkad med enstaka hävdgynnade arter som stenmåra, gökärt, blodrot och ärenpris. Marken har höga trädvärden med ett antal grova gamla träd av ek, lind och ask med grynig filtlav (NT) och guldlocksmossa. Även bok, gran och enbuskar förekommer. En gröngöling (NT) observerades under fältbesöket.

Area: 2,3 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: grynig filtlav (NT), guldlocksmossa, gröngöling (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 667 *

Objektet utgörs av halvöppen, mestadels opåverkad betesmark vid Stockhult. Små delar är svagt kvävepåverkade. Marken har tidigare varit äng men betas nu av häst. Slyppslag förekommer på några platser. Den östra delen är välhävdad, medan delen väster om grusväg är svagt hävdad. Betesmarken är artrik med slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU), ängsvädd, gökärt, ängsskallra, hirsstarr, revfibbla, käringtand, grönvit nattviol, svartkämpar, svinrot, rotfibbla, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd och liten blåklocka. I trädskiktet finns ek, asp, björk, lind och lönn, varav några är grova. Hassel förekommer i buskskiktet.

Area: 3,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 669

Vid Grobo ligger en sekundär ädellövnaturskog med ek, lönn, asp samt enstaka ask och björk. Rikligt med död ved och grova träd finns. Gammal ek, lönn och asp finns allmänt, även enstaka gammal ask. Högstubbar, döende träd och lågor förekommer också. Rödlistade arter som lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Objektet omges främst av produktionsskog.

Area: 3,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 671 *

Objektet utgörs av svagt hävdad, torr betesmark vid Moga. Trädsiktet med björk och rönn är relativt tätt vilket gör att floran är hänvisad företrädesvis till mindre skuggade partier. Bitvis förekommer också rikligt med sly av rönn. Liten blålocka, gökärt, vårbrodd och ärenpris förekommer i fältsiktet men varken slättergubbe (VU) eller vanlig backsippa (VU) kunde återfinnas vid inventeringen 2016. Några gamla björkar finns i objektet.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 680 *

Objektet utgörs av mångformig trädklädd betesmark vid Kattarp som är indelad i fällor med varierande betestryck. Höga värden finns knutna till träd och busksikt som utgörs av ask, ek, lönn, björk, lind, sälg, hassel, rönn, vildapel och tall. Spår av hamling finns på bland annat ask vilket tyder på att vissa delar har en historia som lövängar. Flera askar har dött i askskottssjuka. På fuktiga partier finns vecketåg. Hävdgynnade arter finns spridda i objektet, exempelvis ängsvädd, stagg, liten blålocka, blodrot, gråfibbla och hirsstarr. Slättergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid besöket, dock kunde inte hela objektet besökas på grund av begränsad tillgänglighet.

Area: 10,7 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: hasselticka, rostfläck, lunglav (NT), grynnig filtlav (NT), guldlocksmossa, klippfrullania

Generellt biotopskydd: -



Naturvärdesobjekt 680 vid Kattarp hyser värdefulla ädellövsbestånd. Här påträffades flera skyddsvärda kryptogamer exempelvis lunglav, *Lobaria pulmonaria*, som är rödlistad i kategorin nära hotad (NT).

Naturvärdesobjekt 682

Vid Backgården ligger en lundartad ekskog med enstaka ask och asp. Gammal ask förekommer liksom torrträd. Här finns även odlingsrösen. Objektet omges till stor del av jordbruksmark och lövskog, men ansluter i norr till produktionsskog.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynnig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 683

Vid Revesjö ligger en sekundär ädellövnaturskog i gårdsnära miljö, med ek, asp och björk. Gamla aspar är allmänt förekommande. Döende träd, lågor, högstubbar och torrträd finns också. Området betas, och fläckar med gräsmarksväxter förekommer. I en allé står bl.a. gammal ek och lönn.

Area: 2,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), västlig njurlav (VU)

Generellt biotopskydd: allé

Naturvärdesobjekt 684

Norr om Revesjö ligger en sekundär lövnaturskog, äldre skogsbete, med stora ornitologiska värden. Asp och ek finns samt enstaka rönn och lönn. Rikligt med gammal asp med bohål. Högstubbar, torrträd och lågor är sparsamt förekommande. En bäck rinner genom området. Objektet omges till största delen av jordbruksmark, och avverkning har skett i anslutning till skogen i sydöstra hörnet.

Area: 2,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 686 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark intill Lillån, öster om Tångatorp. Längst i norr blötfuktig, sedan torrt på liten yta, vilket övergår i näringspåverkad mark. Artrikt enbart på det lilla, torra partiet. Där förekommer slåttergubbe (VU), svinrot, stagg, ärenpris, gråfibbla, ängsvädd, blodrot, gökärt, liten blåklocka och stenmåra. I norr högväxt med älgört och starrar. Björk och klibbal står i kanten till ån samt i gränsen mot den blöta delen. Den södra delen domineras av ohävdarter som tuvtåtel och andra högväxta gräs samt brännässla. Även hallon förekommer. Backtimjan (NT) som tidigare har noterats från objektet kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 2,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 695

Vid Övergården ligger en liten torrbacke som är ohävdad sedan ett antal år. Vanlig backsippa (VU), gulmåra, knägräs, stenmåra, tjärblomster och ängshavre förekommer. Enstaka asp, björk, tall och hallonbuskar. Bitvis svag-tydlig näringspåverkan. Objektet omges av jordbruksmark.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 697

Sydväst om Sjövik ligger en gransumpskog vid en källa i sluttning mot Kvarnsjön. Gran, tall, vårtbjörk, enstaka asp och klibbal. Gamla senvuxna granar allmänt förekommande. Området har rikligt med död ved, högstubbar av björk och granlågor. Knärot (NT) har tidigare hittats. Avverkningar har skett i nära anslutning.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): knärot (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 699

Objektet utgörs av gransumpskog längs en bäck öster om Sjövik. Stort inslag av tall och glasbjörk. Gamla senvuxna granar är allmänt förekommande. Rikligt med död ved: lågor av barrträd och björk, talltorrakor. Enstaka kjoigranar finns. Objektet omges av skogsbruksmark med unga barrträd och hyggen.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 700 *

Vid Kronogården ligger ett objekt dominerat av skogsbevuxen myr (tall), men inom objektet finns även göl och öppen myr med bäck som rinner igenom. Flera äldre tallar finns (155–165 år, eventuellt även äldre), men en stor del är 80–100 år. Tall dominerar men även gran, björk och ett fåtal enar hittas. Måttligt med död ved, lågor och torrakor. Lingon, ljung, blåbär, tuvull, pors, bladvass, knapptåg och vitmossor dominerar. Även björkticka, klibbticka och blödticka finns.

Stor dikespåverkan med flera diken åt många håll (gamla och nya diken). Kraftledningsgata och vägdragningsgård går genom objektet. Även viss skötsel av skog förekommer då enstaka lågor var kapade.

Area: 52,9 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 702 *

Objektet utgörs av stenbunden lätt kuperad betesmark vid Siggebo som är glest bevuxen av spärrgreniga ekar och björkar samt en och hassel. Betestrycket är mycket gott, men trots detta finns det relativt stort uppslag av små granar. Marken är bitvis karg och domineras av hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, hirsstarr, vårbrodd, gökärt, stenmåra, liten blålocka och käringtand.

Area: 3,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, sotlav och rostfläck

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 708

Öster om Ekåsen ligger en granskog med stort inslag av tall samt enstaka vårtbjörk och asp. Här förekommer rikligt med döda träd och högstubbar. Senvuxna granar är allmänt förekommande. Enstaka kjolgranar finns också liksom lågor och torrakor. Rödlistad art vedskivlav (NT) har noterats. Objektet omges av produktionsskog med flera hyggen.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vedskivlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 711

Objektet utgörs av välhävdad, något större, betesmark vid Ölebo som är mest öppen med enstaka asp, ek, hassel m.m. I fältskiktet finns blåsuga, hirsstarr, jungfrulin, knägräs, revfibbla, rotfibbla, stagg, stenmåra och ängsvädd. Ingen-svag kvävepåverkan. Objektet kantar b.l.a ung barrskogsplantering och jordbruksmark.

Area: 5,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 714

Norr om Yttre Målhult, längs en skogsväg vid en torprest står flertalet gamla, grova hamlade askar och lönnar. Längre in i skogen finns även ek, klibbal, sälg, rönn, apel samt enstaka gran. Enstaka gamla sälgar förekommer. Rödlistade arter som lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), västlig njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT) har tidigare noterats i området. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2–3. Objektet omges av hyggen och produktionsskog, och avverkning ha skett i nära anslutning till och lite inom objektet.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT), almlav (VU), västlig njurlav (VU), olivbrun gytterlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 716 *

Stor trädklädd betesmark vid Tussered. Ekar dominerar i norr, medan björk är det huvudsakliga trädslaget söder om vägen. Öppna partier förekommer också. Flera grova och gamla spärrgreniga ekar, även grova gamla björkar förekommer. Enstaka ek med oxtungssvamp, flera med rostfläck. Den största delen av betesmarken är opåverkad, men inslag av gammal åker med svag kvävepåverkan förekommer. Slåttergubbe (VU) är allmänt förekommande, liksom backtimjan (NT). Även liten blåklocka, vårbrodd, gråfibbla, ärenpris, svartkämpar, käringtand, gulmåra, gökärt, grönvit nattviol, prästkrage, ängsvädd, fläcknycklar och svinrot förekommer. Lunglav (NT) som tidigare har noterats från objektet kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 11,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, fläcknycklar, backtimjan (NT), rostfläck, oxtungssvamp (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 722

Objektet utgörs av bäckravin vid Ätran, i höjd med Axelfors, som till större delen är bevuxen med lövskog. Dominerande trädslag är gråal, klibbal och hägg men även björk, rönn och gran förekommer. Fältskiktet är friskt med bl.a. majbräken, strutbräken, ormbär och älgört.

Area: 0,03 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 724

Objektet utgörs av lövsumpskog och lövnaturskog vid västvärd strandbrink till Ätran, i höjd med Axelfors. Vid en sioravin i norr finns en källmiljö. Gråal, klibbal, sälg, gran, asp, vårtbjörk och alm förekommer. Rikligt med gammal sälg förekommer, samt enstaka gammal alm. Lågor och högstubbar är allmänt förekommande. Objektet kantar jordbruksmark.

Area: 1,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 725

Objektet utgörs av lövskogsklädd ravin söder om Axelfors kraftverk. Trädskikt med vårtbjörk, asp, rönn, hägg och sälg samt enstaka ek och tall. Rikligt med död ved finns som högstubbar av björk samt lågor. Rännilar förekommer också. Objektet kantar jordbruksmark och skogsbruksmark med bl.a. hyggen.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 726

Objektet utgörs av lövskogsklädd ravin söder om Axelfors kraftverk. Trädskikt med vårtbjörk, asp, rönn, hägg och sälk samt enstaka ek och tall. Rikligt med död ved som högstubbar av björk samt lågor. Rännilar förekommer också. Mindre hackspett har tidigare noterats. Objektet kantar jordbruksmark och skogsbruksmark med bl.a hyggen.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): mindre hackspett (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 728

Stora mossen vid Granåsen är en öppen-glest trädklädd större mosse. I kanterna är trädskiktet bitvis tätare. Strängstrukturer förekommer. En fastmarksholme med äldre barrskog finns i den norra delen av området. Myren är relativt orörd även om en väg har dragits igenom. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1.

Area: 219,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 729

Objektet utgörs av svagt hävdad, frisk betesmark vid Granåsen. Torra samt fuktiga partier förekommer. Arter som borsttåg, hirsstar, knägräs, prästkrage och stenmåra förekommer. Enstaka björk, gran, tall och enbuska finns. Ett småvatten finns också. Betesmarken kantar bl.a skogsbruksmark med ung barrskog.

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 734

Objektet utgörs av artrik betesmark vid Tittebo med bl.a slåttergubbe (VU), slåtterfibbla (VU), granspira (NT), hirsstarr, darrgräs, jungfrulin, fläcknycklar, svinrot och stagg. Större delen hävdas med bete förutom en mindre del i den nordvästra kanten. Objektet omges av jordbruksmark. Betesmarken är ett Natura 2000-område och riksintresse för naturvård.

Area: 2,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 1

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar, granspira (NT), slåttergubbe (VU), slåtterfibbla (VU),

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 736

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Riskulla med gamla träd, främst asp och björk. Flera aspar med bohål finns. Arter som blåsuga, hirsstarr, kaprifol, knägräs, stagg, ängshavre och ängsvädd förekommer, liksom enstaka ängssvampar. Svag-välhävdat. Objektet omges främst av jordbruksmark.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 744

Objektet utgörs av granskogsklädd bäckdal kring Harrbäcken, norr om Flenstorp. Enstaka klibbal och tall finns. Skogen är källpåverkad och bäcken meandrar genom den. Mosstäcket är ymnigt. Lågor förekommer rikligt, även naturliga stubbar och rotvältor finns sparsamt. Objektet omges främst av skogsbruksmark med hyggen, och en väg korsar i öst. Bäckdalen har biotopskydd, men endast väster om vägen.

Area: 3,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 745

Objektet utgörs av gransumpskog i sluttning ned mot Harrbäcken, sydost om Hylte. Stort inslag av glasbjörk finns, liksom inslag av tall samt enstaka rönn och klibbal. Rikligt med död ved, varav en del i vatten förekommer. Området är källpåverkat, med hög och jämn luftfuktighet. Gamla senvuxna granar finns. Avverkning har skett i nära anslutning till objektet.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 746

Söder om Lillabacka ligger en alsumpskog med naturskogskaraktär med inslag av gran och glasbjörk. Rikligt med död ved i form av lågor och rotvältor förekommer. En bäck rinner genom skogen, som tidvis är översvämmad. Omgivningen domineras av skogsbruk med bl.a hyggen.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 750

Objektet utgörs av lövskogslund kring en bäck i Bergagärde. Klibbal och ask dominerar, inslag av lönn samt enstaka glasbjörk och fågelbär förekommer. Gammal ask med spår av hamling är allmänt förekommande. Under lövskogsinventeringen klassades lunden som klass 3.

Objektet ligger i bebyggelse med flera hus som omger, och vägar som korsar.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 751

Objektet utgörs av lövsumpskog i stark sluttning ned mot sjön Karken, norr om Tommared. Klibbal, asp, sälg och glasbjörk, enstaka ask, gran, rönn och ek finns. Skogen är översilad och sockelbildning är vanligt. Klen död ved, rotvältor och lågor förekommer allmänt. Väg korsar objektet.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 752

Vid ödetorpet Varatorpet ligger en sekundär lövnaturskog som domineras av ek med stort inslag av asp och björk. Enstaka ask, lönn, sälg, oxel, hägg och apel förekommer. Gammal asp och ek finns allmänt, gammal sälg sparsamt. Torrträd, lågor och högstubbar förekommer. Objektet angränsar sjön Karken i syd och produktionsskog åt övriga håll.

Area: 6,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 754

Objektet utgörs av glest trädklädd betesmark vid Håkanshult med flera hagmarksekar, gamla äppelträd och några värdefulla björkar. En bäck rinner genom området. Allmänna ängsväxter är vanliga på opåverkade delar: blodrot, knägräs, liten blåklocka och stagg. Under lövskogsinventeringen klassades betesmarken klass 3. Objektet omges av jordbruksmark och barrskog, och i närområdet finns flera öppna ytor glest beklädda med lövträd.

Area: 4,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 760 *

Objektet utgörs av liten mager slätteräng vid Bäck. Marken är torr-frisk och måttligt hävdad, delvis med trimmer. Här finns ett antal hävdgynnade arter som slättergubbe (VU), ängsvädd, blodrot, gökärt, vårbrodd, käringtand, svinrot, bockrot, svartkämpar och gråfibbla. Enstaka ek, lönn, björk och lärk förekommer.

Area: 0,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 763

Vid Framnäs ligger en liten betesmark med viss hävdgynnad flora i form av vanlig backsippa (VU) och ängsvädd. Betesmarken är välhävdad, och hälften är opåverkad och hälften svagt tydligt kvävepåverkad. Enstaka asp, björk och rönn förekommer. Objektet omges av jordbruksmark.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): vanlig backsippa (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 766

Objektet utgörs av hagmark med gamla hamlade askar vid Flenstorp. Biotopkvaliteter som håligheter och mulm finns. Rödlistad art, grynnig filtlav (NT), har noterats. Under lövskogsinventeringen klassades objektet klass 2. Väg korsar objektet. Hagmarken ansluter till lövängsrest och omges av jordbruksmark.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynnig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 769

Objektet utgörs av tidigare betad lövnaturskog vid Flenstorp, som domineras av asp och gran. Enstaka ek, ask, sälg och glasbjörk förekommer. Gamla aspar är rikligt förekommande. Högstubbar och lågor av gran och asp finns sparsamt-allmänt förekommande. Lunglav (NT) och grynnig filtlav (NT) har noterats. Avverkning har skett i nära anslutning.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynnig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 770

Öster om Flenstorp, i en ravin längs Harrbäckens meandrande lopp, växer en sandbarrskog som domineras av gran, inslag av tall samt enstaka vårtbjörk. Rikligt med grova lågor av gran finns i olika nedbrytningsstadier. Signalarten långfliksmossa har noterats. Avverkning har skett i nära anslutning till objektet.

Area: 4,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): långfliksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 771

Öster om Flenstorp, strax ovan erosionsslutningen vid Assmans utlopp står fyra värdefulla aspar varav två är mycket grova, även några tämligen gamla ekar finns. Träden står i ett hygge med uppväxande gran. En rik lavflora med bl.a den starkt hotade blylaven (EN). Avverkning har skett i nära anslutning till objektet.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): blylav (EN), lunglav (NT), olivbrun gytterlav (NT), grynig filtlav (NT), västlig njurlav (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 774

Sydöst om Backen ligger Stora mossen vilken är en öppen-glest trädklädd större mosse. I kanterna är trädsiktet bitvis tätare. Strängstrukturer förekommer. En fastmarksholme med äldre barrskog finns i den norra delen av området. Myren är relativt orörd även om en väg har dragits igenom. Under våtmarksinventeringen klassades objektet som klass 1. Avverkning har skett i anslutning till objektet.

Area: 24,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 775 *

Objektet utgörs av svagt hävdad, frisk-fuktig betesmark vid Tranebäck, bitvis tydligt kvävepåverkad men i övrigt svag-ingen påverkan. Bitvis förekommer rikligt med stagg, även liten blåklocka och vårbrodd finns. I trädsiktet förekommer ask med guldlocks-mossa samt lönn och apel. Vissa partier domineras av vecketåg, tuvtåtel och brännässla. Slåttergubbe (VU) eller grynig filtlav (NT) återfanns ej vid inventeringen 2016.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: guldlocks-mossa

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 776

Objektet utgörs av ädellövträd vid Skattegården. Här finns flertalet gamla hamlade askar, även hamlad lind. Lönn samt enstaka björk, asp och sälg förekommer också. En del hävdgynnad flora vittnar om tidigare hävd. Rödlistad art, grynig filtlav (NT), har hittats. Objektet omges av jordbruksmark och lövskog och är riksintresse för naturvård.

Area: 1,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 778

Objektet utgörs av betesmark vid Ugglebo, som är halvöppen med enstaka värdefull ek och lönn, samt asp, björk, rönn, sälg, hassel och en. Vålövad, svag-ingen påverkan med arter som bockrot, knägräs, revfibbla, stagg, stenmåra, svinrot och ängsvädd i fältskiktet. Översilade hållar förekommer. Under lövskogsinventeringen klassades betesmarken som klass 2. Avverkning har skett i nära anslutning till objektet.

Area: 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 779

Objektet utgörs av liten höjd söder om Ugglebo med riklig förekomst av bockrot, även knägräs förekommer. Fårbetad, torr-frisk mark. Enstaka al, björk, en och hassel förekommer. Opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Avverkning har skett i nära anslutning till objektet.

Area: 0,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 785 *

Intill Sågebäcken, söder om Gökholme, ligger barrskog som kantar fuktäng. Barrskogen domineras av tall 90 – 110 år med inslag av gran och björk. Vegetationen består av ris i form av blåbärris, lingon, husmossa och väggmossa. Fuktängen består av starr, men även bladvass samt har öppet vatten. I kanten finns även en björksumpskog. Död ved förekommer sparsamt med både torrakor och lågor. Objektet kantar till viss del gamla hyggen.

Area: 3,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 788

Nordväst om Tomen, intill Ätran, ligger en ravin/strandbrink klädd med gran samt ek, klibbal, tall och vårtbjörk. Här förekommer rikligt med död ved, främst granlågor. Enstaka gamla ekar finns. Blottor och sanddyner förekommer sparsamt. Avverkning har gjorts i närområdet.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 791

Vid Linderyd ligger ett litet brandfält bevuxet med gran med inslag av tall. Här förekommer rikligt av döende granar. Avverkning har skett tätt intill objektet, och troligtvis något inom.

Area: 0,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 792

Vid Sandsjön ligger Lysjön som har god vattenkvalitet vad gäller försurning och övergödning. Vandringshinder förekommer dock nedströms. Det är en representativ och opåverkad klarvattensjö med förekomst av sällsynta blågrönalger av släktet Nostoc. Sjön är riksintresse för naturvård.

Area: 93,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 793

Öster om Holsljunga, kring en bäck står barrblandskog med gran och tall och inslag av klibbal och glasbjörk. Området är källpåverkat och örtrikt och har en värdefull kryptogramflora. Lågor av barr- och lövträd finns, talltorrakor sparsamma. Rikligt med gamla senvuxna granar. Avverkning har skett i nära anslutning.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 798

Norr om Arnås ligger en naturskogsartad gransumpskog i myrkant. Inslag av tall och glasbjörk. Omgivningen domineras av skogsbruksmark med hyggen och ung barrskog.

Area: 1,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 800 *

Väst om Yttre Hiå ligger ett stort myrkomplex med bl.a Paradismossen och Långemosse m.fl. som domineras av skogsbevuxen myr (tall). Objektet inkluderar områden med högt värde som öppen myr med riklig förekomst av myrlilja, blandsumpskog med dominans av äldre gran, fuktängar med dominans av blåtåtel, holmar och öppna kärr. Naturligt meandrande åar, med forsande/strömmande samt lugnare partier, som kantas av al och björk finns. Tall hittas upp till en ålder av 120 år. Död ved finns som lågor och torrakor. I några av områdena som domineras av blandsumpskog finns rikligt med död ved av äldre träd, i olika nedbrytningsstadier samt torrakor. I samma område hittas gran med gammelgranslav och kattfotslav, och flera träd runt 160 år. I markskiktet hittas pors, ljung, lingon, blåbär, och klockljung. Även enar finns sporadiskt. I bottenskiktet finns vitmossor, björnmossa, brunpudrad nållav (NT), husmossa och blåmossa. Även fnösketicka, klibbticka, björkticka och *Crepidotus cesatii* förekommer. Gnag av vågbandad barkbock påträffades.

Djup dikning finns vid vägkanter, och det förekommer dikning i kanter av stora delar av komplexet. Även viss skogsbrukspåverkad mark i form av stamkvistning, förstärkning av körvägar inne i skog finns, samt hyggen som angränsar åt flera håll. Flera grusvägar korsar vissa delar av komplexet, med diken, vilket ger lokal hydrologisk påverkan. Dikning har även skett på ställen utöver vid väg.

Area: 114,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: kattfotslav, blåmossa, brunpudrad nållav (NT), vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 801 *

Mellan Äskås och Rud ligger en frisk betesmark som till stor del är tydligt kvävepåverkad. Marken är ohävdad och svagt igenväxande. Genom objektet löper en stenmur. Främst nordväst om denna finns små partier med hävdgynnad flora med arter som liten blåklocka, gulmåra, ängsvädd, ärenpris, gråfibbla, vårbrodd, käringtand, jungfrulin, svartkämpar, krypvide, stenmåra och gökärt. Vid muren står enstaka björk, tall och apel. Slåttergubbe (VU) kunde inte återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 0,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 807 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Åsen som är glest bevuxen av spärrgreniga lövträd som ek, björk, sälg och fågelbär. Marken sluttar åt väst och övergår i väster till en fuktäng med mycket vecketåg. I övrigt domineras hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, hirsstarr och vårbrodd.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, kambräken

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 809

Objektet utgörs av liten, svag-välhävdat betesmark vid Enesbo. Liten del svagt kvävepåverkad. Tydligt stenbunden. Arter som blåsuga, hirstarr, knägräs, prästkraige, stagg och ängsvädd förekommer. Enstaka björk och ek finns. Betesmarken kantar ung barrplantering och jordbruksmark.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 810

Objektet utgörs av trädklädd välhävdat betesmark vid Enesbo. En del hävdgynnad flora finns. Trädsiktet domineras av ek och björk. Betesmarken kantas av jordbruksmark och ung barrplantering. Diken finns i kanter och inne i objektet. Under lövskogsinventeringen klassades betesmarken som klass 2.

Area: 2,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 811 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark söder om Åsen som är glest bevuxen av ask, hägg, björk, rönn och apel. Två askar är gamla, varav en hamlas. Marken har hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, käringtand, ängsvädd, liten blåklocka, knägräs, svinrot, blodrot, gökärt, stenmåra och åkervädd.

Area: 0,4 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), krushättemossa, guldlocksmossa, lönnlav

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 812 *

Öster om Borryd ligger Kolsjömossen som är ett varierande objekt med flera gölar, sjöar som Ringsjön, St. Kolsjön och L. Kolsjön, samt öppen och skogsbevuxen myr. Objektet innehåller även flera utpekade nyckelbiotoper. Tall dominerar och flera träd är 200 år eller äldre. Även flera granar är 150 år och äldre. Sparsam förekomst finns av död ved av torrakor, dock äldre och grövre exemplar. Vegetationen som dominerar är myrlilja, tuvull, blåbär, kråkbär, odon, hjortron och ljung. Även blåmossa, gammelgranslav, långfliksmossa, vargmjolk och rödbandad dödgräva hittas. Skogshönsfågel påträffades inom objektet (orre eller tjäderhöna). Hydrologisk påverkan från flera djupa diken (äldre och nyare som fortfarande rensas) finns, samt övrig påverkan från närliggande hyggen.

Area: 56,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: blåmossa, långfliksmossa, orre eller tjäder

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 813

Objektet utgörs av frisk-fuktig betesmark vid Ågärde. Hirsstarr, knägräs, krypvide, stagg, veketåg och ängsvädd finns i fältskiktet. Marken är mest öppen men enstaka björk, gran, tall och en förekommer. Svag-välhävddad, delvis svagt-tydligt kvävepåverkad. Jordbruksmark och skogsbruksmark med hyggen dominerar i omgivningen.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 815

Objektet utgörs av svag-välhävddad betesmark vid Ågärde, mest torr-frisk men även fuktiga och våta partier förekommer. Hirsstarr, jungfrulin, knägräs, slåttergubbe (VU), stagg och ängsvädd finns i fältskiktet. Enstaka asp, björk, ek, rönn, tall och enbuskar förekommer. Jordbruksmark omger objektet, och hygge kantar i norr.

Area: 1,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 819 *

Objektet utgörs av gårdsnära före detta betesmark söder om Hässelhult, som numera domineras av ung björk och granskog. Enstaka äldre ädellövträd förekommer. I gläntor finns rester av hävdgynnad flora, exempelvis knägräs, åkervädd, hirsstarr, rotfibbla, slåttergubbe (VU), backtimjan (NT) och stagg. Granspira (NT) och loppstarr (VU) är kända från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 1,0 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, backtimjan (NT), grynig filtlav (NT), guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 821

Norr om Törebo ligger en barrskog längs en naturlig, meandrande skogsbäck. Gran dominerar med stort inslag av tall samt inslag av glasbjörk och klibbal. Lågor allmänna, lövträdsocklar förekommer, liksom döende träd. Objektet omges av barrskog, och produktionsskog med bl.a hyggen förekommer i omgivningen.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 822

Objektet utgörs av välbetad mark vid Hestra. Här varvas olika gräsmarkstyper med aspdunge och mossodling. En del värdefulla träd: asp, ek och rönn. Fältskikt med brudborste, hirsstarr, klockljung, knägräs, revfibbla, stagg och stenmåra. Marken kantar hygge i norr, och flera diken korsar objekt.

Area: 7,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 825

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Borgaholm. Asp, ek och glasbjörk finns med inslag av sälk samt enstaka gran och rönn. Gammal asp och ek förekommer allmänt. Lågor, liggande grenar av ek finns också. Odlingsrösen förekommer. Den rödlistade arten grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Omgivningen domineras av produktionsskog med flera hyggen. Dock finns inslag av våtmark och lövskog.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: odlingsrösen

Naturvärdesobjekt 830 *

Objektet utgörs av halvöppen betesmark vid Näs intill Fegen. Värdefullt trädskikt finns med ask, lönn, ek, lind och apel. Några hamlade askar förekommer, liksom spärrgreniga ekar. Guldlocksmossa och grynig filtlav (NT) finns på ask. Marken är mestadels välhävdat och med svag, bitvis tydlig, kvävepåverkan. En del hävdgynnade arter som liten blåklocka, ängsvädd, svartkämpar, gråfibbla, vårbrodd, käringtand och prästkrage förekommer. Betesmarken ingår i naturreservat och är riksintresse för naturvård.

Area: 5,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: guldlocksmossa, grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 833

Vid Svensås finns en gammal löväng med flera värdefulla träd. Ek dominerar med inslag av bok, vårtbjörk och fågelbär. Även enstaka alm och asp förekommer samt några hamlade lindar och askar. Gammal ek är allmän, lågor och döende träd finns också. Lunglav (NT) har noterats. Objektet ansluter till gammal betesmark, för övrigt domineras omgivningen av jordbruksmark och skogsbruksmark med hyggen och ung barrplantering.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 835

Objektet utgörs av ohävdad betesmark/äng vid Strömsås, som är artrik trots avsaknad av hävd. Här finns darrgräs, fläcknycklar, jungfrulin, slättergubbe (VU), stagg, stenmåra och ängsvädd. Själsådd gran tätnar från två håll.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar, slättergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 840

Objektet utgörs av svagt hävdad betesmark i sluttning vid Ytter Hiås. I norr mot åker finns en fin ekdunge där fällmossa noterats. I övrigt mest öppen. Gökärt, fläcknycklar, knägräs, stagg, stenmåra, ängsvädd och vecketåg förekommer. Kvävepåverkan är svag eller obefintlig. Objektet kantar jordbruksmark, men omgivningen domineras i övrigt av skogsbruksmark med bl.a hyggen.

Area: 2,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fällmossa, fläcknycklar

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 846 *

Sydväst om Holm ligger Stensmossen med varierande naturtyper och strukturer. Myrgöl som Lommagölen, blåtåtelstråk samt skogsbevuxen och öppen myr förekommer, med skogsbevuxen myr som dominerar. Död ved förekommer sparsamt till allmänt i hela objektet, både som torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadie och tjocklek. Dominerande trädslaget är tall, och flertalet finns som är 225 år och över. Det finns inslag av gran och björk, och även föryngringen sker framför allt av dessa trädslag. Vegetationen domineras av odon, tuvull, kråkbär, skvattram, klockljung, blåtåtel, blåbär, lingon och vitmossor. Även vedspik, björkticka och klibbticka finns, samt gnag från thomsons trägnagare. Påverkan finns från vägar med diken som korsar objektet, samt stark påverkan från dikning främst i den södra delen av objektet. Även traktörvägar korsar området. Vissa delar kantar även kalhygge (utan skyddszon).

Area: 213,0 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: thomsons trägnagare

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 849

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog vid Borryd med asp, glasbjörk och gran samt enstaka tall. Gammal asp allmänt förekommande, med bohål. Högstubbar och asplågor förekommer sparsamt. I skogen finns odlingsrösen och en stengärdesgård. Grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. I närområdet finns flera betesmarker med löv.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse, stengärdesgård

Naturvärdesobjekt 851

Objektet utgörs av slätteräng runt åkrarna söder om Borryd. Yngre björk och ek har tillåtits växa upp och beskuggningen är negativ. Floran finns framförallt i sydväst och den finaste floran finns utanför, längs vägen. Brudborste, svinrot och ängsvädd förekommer i fältskiktet. Objektet kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med löv finns i området.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 852

Objektet utgörs av trädklädd betesmark väster om vägen i Borryd. Frisk-fuktig mark med brudborste, hirsstarr, knägräs, stagg, stenmåra, ängsvädd. Några värdefulla almar, aspar och björkar finns. Björk dominerar i trädskiktet. Svag-välhävdad, mest opåverkad. Objektet kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med löv finns i området.

Area: 1,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 854

Objektet utgörs av slätteräng mot vägen i Borryd. Svag hävd. Brudborste, gulmåra, knägräs och prästkrage förekommer. Mest öppen mark men en grov ek finns. Hassel i buskskiktet. Ingen-svag näringspåverkan. Objektet kantas av jordbruksmark och flera betesmarker med löv finns i området.

Area: 0,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 857 *

Vid Annelund ligger ett myrkomplex med Hästö mossen, Bjällermossen, Kärrbacksmossen och Mossö mossen, vilket även fortsätter utanför kommungränsen. Naturtypen som dominerar är skogsbevuxen och öppen myr. Tall och gran dominerar, men även inslag av björk och andra lövträd finns. Stor åldersvariation av det dominerade trädslaget tall med flera 200 år eller äldre. Områden finns med rikligt med gran som ligger på en ålder 100 – 150 år, och även äldre finns. Fuktstråk med dråg förekommer som bidrar till variationen inom objektet. Sparsamt till allmän förekomst finns av död ved. Arter som påträffas är lingon, blåbär, tuvull, vitmossor, kråkbär, klockljung och ljung. I de fuktigare partierna finns mycket myrtilja och flaskstarr. Övriga arter som björkticka, björnmossa, vargmjolk, fnösketicka, skägglav, manlav, violticka, sprängticka, gammelgranslav, brunpudrad nållav (NT), kattfotslav och långfliksmossa påträffas. Gnag från brun barkbock, barrträdlöpare, större mörghorre, granbarkgnagare, thomsons trägnagare och grönhjon (NT) påträffas. Spillkråka (NT) noterades. Den norra delen - Bjällermossen - är nästan orörd och skyddad som naturreservat. Något lokal hydrologisk påverkan med närliggande vägar och diken, samt hyggen.

Area: 129,1 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: brunpudrad nållav (NT), kattfotslav, långfliksmossa, thomsons trägnagare, grönhjon (NT), spillkråka (NT)

Generellt biotopskydd: -



Myrtilja, *Narthecium ossifragum*, är en växt som förekommer på öppna myrar, kärr och fukthedar.

Arten påträffades vid flera av fältbesöken i Svenljunga kommun och ses här i naturvårdsobjekt 857. I Blekinge län är Myrtilja fridlyst (SFS 2007:845).

Naturvärdesobjekt 858 *

Objektet utgörs av varierad och kuperad betesmark söder om Rödassjön, med sjönära läge, som är glest bevuxen av spärrgreniga lövträd, exempelvis ek, lind, björk och ask. Flera träd är gamla och grova, och det finns spår av hamling. Djuren betar ut i sjön och öppna fuktängar förekommer. Enkelbeckasin noterades i den betade miljön vid sjön. Växtsamhället i övrigt domineras av hävdgynnade arter som bockrot, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, slättergubbe (VU) och gökärt. Backtimjan (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 7,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slättergubbe (VU), rostfläck, lönnlav, guldlocksmossa, enkelbekasin

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 865 *

Objektet utgörs av långsträckt betesmark vid Rösarp som till stor del är bevuxen av hävdpräglade lövträd, exempelvis ek, bok, lönn, alm, lind och björk. Gamla och grova träd förekommer spritt. Floran varierar och utgörs av exempelvis svinrot, stagg, gråfibbla, käringtand, knägräs och liten blåklocka. Slättergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 3,9 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: grönvit nattviol, västlig hakmossa, krushättemossa, guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 874

Roassjön är en klarvattensjö med sand- och lerbotten som är belägen i ett barrskogsområde med inslag av jordbruk. Vegetationen består av mycket kortskottsväxter främst notblomster samt flytbladsväxter som gäddnate och gul och vit näckros. I strandzonen finns starr och längre upp en lövträdsridå med betesmark ut mot sjön. Flera stugtomter med tillhörande bryggor går ned till sjön. Vid musselinventering av Naturcentrum under 2011 påträffades rikliga bestånd av allmän dammussla, skal av den mer ovanliga större dammussla noterades också. I samband med inventeringen observerades även gädda, mört, abborre och flodkräfta.

Area: 7,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodkräfta (CR)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 875

Objektet utgörs av liten välhävdad betsmark vid Kärralund nästan helt utan träd- och buskskikt. Få hävdgynnade arter som gråfibbla, knägräs och stenmåra förekommer, mer allmänna ängsväxter finns spridda över ytan. Ängssvampar finns också. Opåverkad. Objektet kantar myrkomplex och jordbruksmark.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 887

Objektet utgörs av sydvästvänd blockig rasbrant med lövnaturskog vid Hid. Asp och ek dominerar, enstaka lind, lönn, glasbjörk, klibbal och gran. Löv- och granlågor finns sparsamt, håligheter i träd, mosklädda block och lodytor allmänt. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Objektet kantas av b.la lövskog och jordbruksmark.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 889 *

Objektet utgörs av öppen betesmark norr om Ryalyckan av frisk till fuktig karaktär. Kvävegynnade växter som veketåg, och smörblomma finns spridda över skiftet. Dock dominerar hävdgynnade arter som stagg, gråfibbla, slåttergubbe (VU), ängsvädd, blodrot, vårbrodd och gökärt.

Area: 0,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 892 *

Objektet utgörs av vidlyftig betesmark vid Boda som är av pastoral karaktär med flera spärrgreniga ekar, björkar och aplar. Marken är lätt böljande med rik förekomst av odlingsrösen. Hävdgynnade arter dominerar, exempelvis ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, slåttergubbe (VU), stenmåra och prästkrage.

Area: 6,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 893 *

Objektet utgörs av varierad barrsumpskog norr om Övre Backa med inslag av björk, och som är tydligt påverkad av ett uträtat dike som rinner genom området. Den västra delen består av en något upphöjd tallmosse. Övriga delar är sumpskog som bitvis är tätt bevuxen av undertryckt gran och bitvis har förekomst av gammal tall och gran. Lägre vegetation utgörs av arter som pors, tuvull, blåbär, blåtåtel, ljung, tranbär, hjortron och klockljung.

Skötselöförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Det stora dike som går genom området har en dränerande effekt vilket påverkar vegetationen. Åtgärder som syftar till att hindra vattenflödet i diket kommer att få en positiv effekt på objektets naturvärden. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 5,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: kattfotslav, långfliksmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa, blåmossa, missne, tjäder

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 894 *

Objektet utgörs av gles ekskog med inslag av björk i anslutning till hus nära Fegen. Enstaka senvuxna äldre ekar förekommer. I övrigt dominerar medelålders träd. Död ved finns sparsamt. Återkommande röjningar gör att ljusinsläppet är relativt stort.

Skötselöförslag: Fortsatt regelbunden röjning i området eftersom det gynnar ek. Släpp dock gärna upp enstaka ekplantor. Försiktig borttagning av gran i den norra delen av objektet. Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 1,4 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, klippfrulania

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 896 *

Öster om Ararp ligger ett myrkomplex med Krypplingsmossen och Glupemossen. Objektet är varierande med blockrik och kuperad barrskog, myrholmar med barrskog, fuktstråk med blåtåtel, björksumpskog samt öppen och skogsbevuxen myr. Trädsiktet domineras av tall med inslag av gran och björk. Även dvärgbjörk och en hittas i objektet. Flera tallar finns i ålder 140 år och eventuellt äldre, gran 130–140 år. Död ved är tämligen allmänt, mer i vissa områden. Torrakor finns av äldre och grövre träd. Vegetationen domineras av tuvull, kråkbär och pors. Även vargmjolk, violticka, björkticka, vednål och gammelgranlav, tallört och skarp dropptaggsvamp hittas. Vissa delar kantar hygge, utan skyddszon. Lokal påverkan från diken som genomkorsar objektet.

Area: 285,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: tallört, dropptaggsvamp

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 897 *

Objektet utgörs av gårdsnära betesmark vid Boda som är öppen i norr och bevuxen av asp, rönn och björk i söder. Det finns flera grova och håliga aspar. I norr dominerar hävdgynnade växter som stagg, gråfibbla, käringtand, ängsvädd, liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, slåttergubbe (VU), backtimjan (NT) och knägräs.

Area: 0,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), backtimjan (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 900

Sydväst om Överbyn ligger en nordvästvärd blockig rasbrant med lövnaturskog. Asp, ek, rönn, sälg och björk, enstaka lönn och gran finns. Stort inslag av senvuxna träd, många skrymslen. Högstubbar, torrträd, lågor förekommer, liksom mossklädda block och lodytor. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har tidigare noterats. Avverkning har gjorts tätt inpå objektet i den östra delen.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 901 *

Objektet utgörs av liten betesmark norr om Sandhem som är glest bevuxen av björk, tall, asp och en. Ris från röjning finns kvar. Hävdgynnade arter som liten blåklocka, blodrot, vårbrodd, gökärt, ängsvädd, svartkämpe, gråfibbla, käringtand, slåttergubbe (VU) och åkervädd dominerar fältskiktet.

Area: 0,6 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: slåttergubbe (VU), törnskata

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 902 *

Området är beläget väster om Övre Backa och domineras av en svagt välvd mosse som är glest bevuxen av tall. Tallarna är senvuxna och flera är gamla, även gammal gran finns i mossekanten. I omkringliggande laggkärr växer björk och klibbal. Hydrologin är relativt opåverkad. Vegetationen består av växter som kråkbär, tranbär, ljung, klockljung, tuvull, blåtåtel, odon och blåbär.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Avsatt skyddszon runt objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 5,5 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: långfliksmossa, vågig sidenmossa, kattfotslav, tjäder

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 904 *

Öster om Höghult, ligger Store mosse som är ett objekt som till största delen består av skog i form av skogsbevuxen myr och blandsumpskog. Området varierar även med öppna myrgläntor, halvöppna och mer slutna partier. Större öppna ytor saknas. Slutna partier har rikligt med död ved av främst gran i olika nedbrytningsstadier, dock få riktigt murkna lågor. Skogen domineras av tall, gran och glasbjörk, men även en förekommer. Stor åldersvariation finns i trädskiktet, och flera grova tallar är 150–200 år. Även gran 120–160 år står på fastmarksholmar i myren. I fältskiktet dominerar blåtåtel, myrlilja, tuvtåtel, vitmossor, tranbär, lingon, blåbär, pors, ljung, klockljung och trådstarr. Även blåmossa, klibbticka, fnösketicka, björkticka och gransotdyna (NT) förekommer. Gnag från vågbandad barkbock, thomsons trägnagare och bronsjon hittas. Avverkning har skett i närområdet.

Area: 18,8 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: blåmossa, vågbandad barkbock, thomsons trägnagare, bronsjon, gransotdyna (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 906 *

Vid Övre Backa ligger en ekskog på kuperad mark, bitvis blockrik, i anslutning till Fegen. Stort inslag finns av lind, bok, gran, asp, rönn. Frekvent förekomst av senvuxen ek, även gammal asp, lind och bok förekommer. Död ved finns spritt över området. Kröntäckningen är hög och lokalklimatet är fuktigt. I fältskiktet finns arter som blåbär, liljekonvalj, kruståtel, ängsvädd, gökärt och teveronika. Grynig filtlav (NT) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Skötselförslag: Avsatt området för dess höga naturvärden. Försiktig borttagning av gran för att gynna lövträd, främst ek. Vid enstaka ekar i områdets kantzoner bör även lövsly tas bort. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: lunglav (NT), lönnlav, almlav (VU), klippfrullania, guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 907 *

Nordväst om Bäckalund ligger ett varierande objekt med bl a Lillesjön och som domineras av skogsbevuxen myr. Öppen myr finns, men håller på att växa igen. Även bäck rinner igenom. Tall ca 80 – 100 år dominerar, och föryngring av gran hittas på flera ställen framför allt vid dikningar. Vegetationen består bland annat av blåtåtel, ljung, vitmossor och kråkbär. Objektet fortsätter utanför kommungränsen. Ett par diken och vägar korsar objektet. I sydvästra området ligger även en blockig höjd som verkar ha avverkats. På gränsen i södra hörnet ligger en ås där man utvinner grus.

Area: 17,6 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 913

Objektet utgörs av betad fuktäng längs vägen vid Snärsnäs. Blåtåtel, granspira (NT), hirsstarr, klockljung, knägräs, krypvide, stagg, stenmåra och ängsvädd finns. I trädskiktet är främst björkar glest utställda, även buskar som björnbär och hassel förekommer.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): granspira (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 914 *

Objektet utgörs av lövskogsparti som domineras av ek i brant ostsluttning i anslutning till bebyggelsen vid Mjöbäck. Förutom ek finns rikligt med asp, vårtbjörk, sälg och hassel. Väster om den kraftledningsgata som korsar objektet ökar inslaget av tall och gran, och bitvis finns det här rikligt med död granved. Flera ekar påverkas negativt av uppväxande gran i den västra delen av objektet. Trädåldern domineras av medelålders träd, men allmän förekomst av gammal ek förekommer. I den västra delen finns även enstaka gamla tallar.

Skötselöverslag: Avsatt området för dess höga naturvärden och dess läge i direkt anslutning till bostadsområden i Mjöbäck. Frihuggning av ek bör ske omgående i den västra delen av objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 4,7

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: lunglav (NT), klippfrullania, fällmossa, vågbandad barkbock

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 916 *

Objektet utgörs av varierad barrsumpskog sydväst om Övre Backa med inslag av björk och klibbal. Skogen är flerskiktad och har god förekomst av gammal tall och gran.

Fastmarksholmar i nordväst har de största träden. Död ved finns både som stående och liggande träd samt i olika nedbrytningsstadier. Markvegetationen utgörs av vitmossor, räffelmossa, tuvull, blåtåtel, missne, blåmossa och kråklöver.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Avsatt skyddszoner så att kommande avverkningsåtgärder inte får en negativ påverkan på objektets naturvärden.

Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: kattfotslav, granbarkgnagare, blåmossa, västlig hakmossa, vågig sidenmossa, långfliksmossa, missne

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 917

Objektet utgörs av välhävdat betesmark intill Mjöåån vid Öbranstorp. Enstaka björk, al och rönn. Frisk-fuktig-våt mark med gökblomster, hirsstarr, prästkrage, revfibbla, skallror, stagg, stenmåra, veketåg, älggräs och ängsvädd. Rödlänke (NT) och granspira (NT) har tidigare noterats. Objektet kantas av jordbruksmark.

Area: 1,0 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): rödlänke (NT), granspira (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 918 *

Objektet utgörs av barrsumpskog öster om Svanabo med stort inslag av björk och klibbal. Medelålders träd dominerar, och flera granar har ett undertryckt växtsätt. Död ved finns allmänt och är växtplats för björkticka, eldticka och alticka. Markvegetationen består i stort av björnmossa, vitmossa, tuvull och blåbär.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivande avverknings påverkar objektet negativt. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas naturligt. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 1,2 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, vågig sidenmossa, långfliksmossa, missne

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 920 *

Objektet utgörs av begränsat granbestånd nordost om Yttre Sånabo med stort inslag av tall, björk, al, bok. Död ved förekommer rikligt, både i stående och liggande form samt i olika faser. Klibbticka, fnöskticka, granmussling, vitmossa, björnmossa, husmossa, krypven, topplösa, tuvull förekommer.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivande avverknings påverkar objektet negativt. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt objektet där träd- och buskskikt kan utvecklas naturligt. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 0,5 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: krushättemossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa, långfliksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 922

Objektet utgörs av betesmark norr om Öbranstorp. Den östra delen är tydligt kvävepåverkad men här finns fint trädsikt med bl.a ek och oxel. I övrigt frisk, och fuktigare mot väster. Fältsikt med hirsstarr, fläcknycklar, stagg, stenmåra och veketåg.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): fläcknycklar

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 923 *

Objektet utgörs av fuktig medelålders granskog ostnordost om Yttre Sånabo med inslag av tall, björk, al och bok. Död ved förekommer allmänt, både som torrakor, högstubbe och i liggande form. Klibbticka, styvskinn, björnmossa, vitmossa, husmossa, revlumner, harsyra och krypven finns.

Skötselförslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Omgivningarna består av planterad granskog. Det är viktigt att det avsätts en skyddszon runt objektet för att minska påverkan från kommande avverkningar. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 0,6 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: västlig hakmossa, vågig sidenmossa, långfliksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 924

Stora Hallången är en långsmal sjö vid Överlida som i öster kantas av branta trädklädda sluttningar. Sjön har god ekologisk status baserat på förekomsten av fisk. Försurning motverkas genom kalkning. Det finns definitiva vandringshinder nedströms. Strandlumner (NT) och flytsäv (VU) har tidigare noterats. I den norra delen av objektet finns mer bebyggelse och hus än vid resten av sjön. Jordbruksmark och skogsbruksmark med bl a hyggen kantar sjön i flera områden, dock med viss skyddszon.

Area: 138,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): strandlumner (NT), flytsäv (VU)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 926 *

Objektet utgörs av ohävdad betesmark vid Yttre Sånabo. Marken, som mestadels är frisk, är svagt kvävepåverkad och under igenväxande med lövsly, örnbräken, älgört, tuvtåtel, vecketåg och brännässla. Enstaka hävdgynnade arter som vårbrodd, liten blåklocka, gråfibbla, svartkämpar, grönvit nattviol och blodrot finns ännu kvar. Mot gården står en hamlad ask (NE) och i den södra delen finns en gammal apel. Slåttergubbe (VU) är känd från området, men kunde inte återfinnas vid fältbesöket 2016.

Area: 2,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: grönvit nattviol

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 927

Nordöst om Asserbo, vid torpet Finnabo intill Finnabosjön finns en sekundär lövnaturskog med glasbjörk, ek, lönn och asp samt enstaka lind, sälg och gran. Gamla aspar med bohål, gamla ekar och gammal lind förekommer sparsamt. Området har även kulturhistoriska värden. Arter som lunglav (NT) och grynnig filtav (NT) har noterats i området. Lövnaturskogen kantas av produktionsskog med barr.

Area: 2,3 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynnig filtav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 929

Söder om Ljungvik, vid resterna av soldattorpet Göpåsen, finns en tidigare betad gles lövskog med glasbjörk, rönn, säl, fågelbär samt enstaka gran, oxel och apel. Gamla lövträd och torrträd är allmänna. Här finns även fläckar med gräsmarksväxter. Hyggen omger objektet i alla riktningar.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 930

Väster om Ölsbo ligger en glest skogsbevuxen men ändå öppen myr med fuktäng. Viss dikning har skett inom objektet och avverkning har gjorts tätt inpå. Väg kantar i den östra delen av objektet.

Area: 11,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 931

Väster om Ölsbo ligger en skogsbevuxen myr. Viss dikning har skett inom objektet och avverkning har gjorts tätt inpå. Väg korsar även myren.

Area: 2,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 932

Objektet utgörs av sekundär lövnaturskog i ostsluttning vid Ölsbo. Asp, ek och gran, enstaka lind, lönn, oxel, säl, rönn och fågelbär finns. Gamla aspar med bohål förekommer rikligt. Gammal ek, torrträd, högstubbar finns sparsamt. Riklig förekomst finns av grova träd. Odlingssälen finns. Arterna lunglav (NT) och grynnig filtav (NT) har tidigare noterats. Omgivningen är starkt präglad av skogsbruk med kalhyggen där avverkning har skett tätt inpå objektet, och stor del är ung barrskog.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynnig filtav (NT)

Generellt biotopskydd: odlingsröse

Naturvärdesobjekt 933

Norr om Ölsbo ligger Järpamossen som är en förhållandevis opåverkad myr med öppna och skogsbevuxna delar samt inslag av myrgölar. Myren breder ut sig längs ett bäcksystem mellan Ljungsjön, Hällasjön och Rullesjön. Omgivningen och närområdet är starkt präglad av skogsbruk med kalhyggen där avverkning har skett tätt inpå objektet, och stor del är ung barrskog. Under våtmarksinventeringen klassades objektet klass 1.

Area: 32,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 934

Norr om Ölsbo ligger ett objekt dominerat av glest skogsbevuxen myr med inslag av öppen myr. Omgivningen och närområdet är starkt präglad av skogsbruk med kalhyggen där avverkning har skett tätt inpå objektet, och stor del är ung barrskog.

Area: 3,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 936 *

Vid Joarsbo ligger en öppen betesmark med trädklädda delar där björk, ek och bok dominerar. Bitvis finns fin hävdgynnad flora, men ungefär hälften av objektet är gammal åker som är svagt kvävepåverkad. I fältskiktet återfinns bland annat svartkämpar, ärenpris, blodrot, liten blåklocka, vårbrodd, stagg, jungfrulin, gråfibblemattor, hirsstarr, ängsfryle och prästkrage. Betesmarken har en strand mot Fegen, men närmast stranden är hävden svag och där finns även ett visst slyuppslag. Övriga delar är välhävdade. Vid viken i öster står några klena hamlade askar. Varken slättergubbe (VU) eller granspira (NT) kunde återfinnas vid inventeringen 2016.

Area: 5,2 ha

Naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter: -

Generellt biotopskydd: stenmur, odlingsröse

Naturvärdesobjekt 937 *

Objektet utgörs av bokskog väster om Joarsbo med ökat inslag av gran och björk i den norra delen. Omgivningen är präglad av planterad gran. Åldersstrukturen är varierad och flera gamla träd finns. Död ved förekommer sparsamt liksom hålträd. Markvegetationen är gles med vårfryle, blåbär och kruståtel.

Skötselöverslag: Bevara området och låt det till stor del få utvecklas fritt. Utöka möjligheten för lövbeståndet genom att hugga bort gran i den norra delen av objektet. Åtgärder som ökar mängden död ved är också positiva för naturvärdet.

Area: 1,1 ha

Naturvärdesklass: 3

Naturvårdsarter: krushättemossa vågig sidenmossa, västlig hakmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 938

Furubergs västsida är en bergbrant. Här växer barrnaturskog, delvis hällmarksskog, med tall och gran, inslag av björk samt enstaka ek, rönn och sälg. Området är blockrikt med många skrymslen. Senvuxna träd förekommer allmänt. Döende träd, torrträd, lågor är sparsamt förekommande. Avverkning har skett i närområdet.

Area: 2,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.):

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 939

Längs Älingabäcken, väster om Ällebäckstorp, står en blandsumpskog med naturskogskvaliteter. Gran dominerar med stort inslag av glasbjörk, inslag av tall samt enstaka klibbal. Allmänt med senvuxna träd och lågor. Skogen är en översvämningsskog. Avverkning har skett tätt inpå.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 943

Objektet utgörs av gransumpskog vid Ällebäckstorp. Inslag finns av tall och björk. Rikligt med senvuxna granar förekommer. Torrträd av tall, högstubbar av björk finns samt granlångor med sparsam förekomst. En liten bäck rinner genom området. Produktionsskog omger objektet, med hygge i väst.

Area: 0,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 944

Objektet utgörs av ostvänd bergbrant på Furuberget. Gran dominerar, och inslag av rönn, vårtbjörk och hassel förekommer. Sparsam förekomst finns av lövträdslågor samt klen död hasselled. Högstubbar av gran finns. Lodytor och block med mossfäll finns rikligt. Värdefull kryptogamflora. Kalhygge kantar objekt.

Area: 0,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 945

Objektet utgörs av stor öppen betesmark intill Ätran vid Vränglarp. Objektet har främst värde som fågellokal då stora delar är gammal åkermark. Två korvsjöar förekommer. Fältskikt med bl.a fackelblomster, gökblomster, hirsstarr, ängsviol, skräppor, veketåg och älggräs. Sånglärka (NT) har tidigare noterats. Omgivningen består av jordbruksmark.

Area: 11,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 946

Vid Ätran, i höjd med Ulvshed ligger en större flack dalgång som domineras av högörtfuktäng och högstarräng. Mitt i området ligger en mindre vattensamling med öppen vattenspegel. I sluttningarna finns friskäng med inslag av ängsväxter som backnejlika och liten blåklocka. Ängsplärka (NT) har tidigare noterats. Jordbruksmark omger objektet.

Area: 11,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): ängsplärka (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 949

Vid kyrkan i Östra Frölunda står ett fyrtiotal värdefulla lönnar, majoriteten hamlade. Rik förekomst finns av läderlappslav, även grymig filtlav, guldlocksmossa och kyrkogårdslav har noterats.

Area: 0,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): läderlappslav (NT), grymig filtlav (NT), guldlocksmossa

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 952

Nordöst om Strömsnäs ligger en tämligen stor bäck som rinner från Vitasjön och österut mot Ätran. Vid landsvägen rinner den genom en lövbevuxen ravin med främst klibbal, sälg och rönn men även ek, gråal, björk och hägg. Bäckens är väl beskuggad. Årsungar av öring har noterats. Väg korsar objektet i norr. Jordbruksmark omger. Vid lövskogsinventeringen klassades skogen klass 3.

Area: 3,2 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 955

Objektet utgörs av grova ädellövträd vid Mölneby: lönn, alm, lind och ek. Gammal lönn och alm är allmänt förekommande. Enstaka lågor finns också. Objektet är gårdsnära och omges av jordbruksmark.

Area: 0,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 963

Objektet utgörs av trädklädd betesmark vid Ararp. Enstaka värdefull björk, ek och en. Även asp, vildapel och hassel förekommer. Svag-välhävddad, opåverkad frisk mark med arter som hirsstarr, knägräs, stagg, ängsvädd och ärenpris. Objektet kantar jordbruksmark och mark med lövträd.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 964

Objektet utgörs av Lillån från utloppet av kraftverkstuben från Såken till utloppet i Ätran, vid Mostorp. Delvis finns goda förutsättningar för öring. Svagt strömmande-strömmande, med forsande och lugnflytande partier. Beskuggning god och främst av lövträd, gott om död ved. Flera vägar korsar objektet. Avverkning har skett i närområdet.

Area: 0,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 968

Objektet utgörs av halvöppen, svag-välhävddad betesmark vid Övre Drägvade. Marken är frisk och relativt artrik med bl.a hirsstarr, knägräs, prästkrage, revfibbla, stagg och ängsvädd. Flera värdefulla lindar (vissa hamlade) och ekar förekommer längs vägen. Objektet kantas av produktionsskog och jordbruksmark. Viss plockhuggning/avverkning kan ha skett inom betesmarken.

Area: 2,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 971

Objektet utgörs av betad lövnaturskog vid Kvarnagärde. Ek dominerar, med inslag av klibbal, ask, asp, glasbjörk samt enstaka lönn, lind, rönn och hägg. Några skyddsvärda ekar, lindar och askar står vid gården i norr. Gammal asp och lind förekommer. Arterna lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats. Objektet kantar bäck i söder.

Area: 7,4 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): lunglav (NT), grynig filtlav (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 974

Vid St. Apelnäs ligger Apelnäsbäcken som nedströms vägen har blockrik miljö med fint grus emellan. Uppströms vägen mot dämnet med ålkista är bäcken kvillande och uppdelad i flera åfåror med block och grus. Här finns ett litet bestånd av flodpärlmussla (EN). Bäckens har hög skuggning av främst löv. En kraftledningsgata korsar objektet centralt.

Area: 0,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodpärlmussla (EN)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 976

Söder om Broholmen ligger en fuktäng som troligen är ohävdad sedan en tid. Hirsstarr, pors, veketåg, älggräs och ängsvädd förekommer i fältskiktet. Enstaka al och björk finns.

Opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Objektet omges av jordbruksmark.

Area: 1,1 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 978

Vid Mjöbäck flödar Högvadsån från Gumperedshölj till Lilla Nabbasjön. Sträckan mellan Torsås och Kvarnsjö är ett kärnområde för flodpärlmussla (EN). Elfiske visar på abborre, lake, mört, gädda, elritsa, öring, lax och ål i Högvadsån. Ån går förbi reningsverk och omges till stor del av skogsmiljöer och jordbruksmark.

Area: 5,8 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): flodpärlmussla (EN)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 983

Objektet utgörs av strömmande-forsande parti av Ätran vid Veka. Här finns en gammal dammbyggnad som skapar ett vandringshinder för fisk, partiellt för öring. Död ved finns i måttlig mängd. Objektet omges till större delen av jordbruksmark.

Area: 1,5 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 989

Ätran vid Buttorp innehåller forsande, strömmande och små lugnflytande partier. Huvudfåran är bitvis kraftigt rensad, men i övriga ytor och i sidofåror syns inga tydliga spår av rensning. Den gamla kvarndammen utgör vandringshinder för fisk. Bytesrester och spillning från utter (NT) har noterats. Ån kantas till stor del av jordbruksmark och skog, men uppväxande hygge finns i närområdet (med liten skyddszon mot vattenförekomen).

Area: 3,6 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): utter (NT)

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 996

Forsande-strömmande sträcka av Ätran vid Forsaberg. Fåran delar upp sig så att öar bildas. Rester av en dammbyggnad finns i den nedre delen men utgör inte vandringshinder för fisk vid högvatten. Bitvis finns möjliga lekplatser för öring. Död ved förekommer. Väg korsar objektet i norr. Ån kantas av skog och i vissa delar av jordbruksmark.

Area: 2,9 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 1023

Objektet utgörs av Bergabäcken uppströms Ätran fram till kraftstationen vid Bergfors där ett vandringshinder som är definitivt för öring förekommer. Bäckan har ett naturligt meandrande lopp med bitvis mycket goda miljöer för öring. Vid elfiske har gott om årsungar fångats. En väg korsar objektet centralt. Ån kantas av skog, men flödar genom jordbruksmark.

Area: 2,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Naturvärdesobjekt 1024

Objektet utgörs av grannaturskog i nordvästvänd bergbrant på Ramnaberget, sydöst om Nedergården. Enstaka tall, björk, asp, rönn och lind förekommer. Gammal grov gran och senvuxna granar är allmänt förekommande, liksom döende träd, högstubbar, torrakor och lågor. Här finns hållar och block m.m. Objektet kantar dikad mosse och produktionsskog.

Area: 1,7 ha

Prel. naturvärdesklass: 2

Naturvårdsarter (Artportalen m.fl.): -

Generellt biotopskydd: -

Obesökta objekt klass 3

I tabell 1 hittas alla objekt som pekades ut som naturvärdesobjekt i förstudien, men som ej har besökts.

Tabell 1. Tabellen ger en sammanfattning av samtliga naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, som inte är fältinventerade under 2016 - 2017. I tabellen finns även tre naturvärdesobjekt med klass 4, visst naturvärde, som identifierades på kommunens mark i samband med fältinventeringen 2016.

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
1	3	Sydvästvänd brant med äldre blandskog ned mot Såken. Skogen har avverkats ovanför branten vilket gett svag-måttlig negativ påverkan.	Skog och träd		0,5
2	3	Såken är en flikig sjö med flera öar. Stränderna är i allmänhet klippiga och stupar brant ned i vattnet. Sjön har goda förhållanden vad gäller försurning och övergödning. Fortsätter utanför kommungräns.	Djup sjö	klockgentiana (VU), strandviol (NT), granspira (NT)	357,6
4	3	Jällsjön är en liten sjö omgiven av mosse och tallsumpskog. Myrsjöar har ofta stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö		0,9
6	3	Spångaån mellan Rudesjön och Höljasjöarna. Öring, elritsa, gädda, lake samt signalkräfta förekommer i ån (elfiske 2007). Ån bedöms ha måttlig ekologisk status.	Vattendrag		0,9
7	3	Höljasjöarna är två små sammanhängande sjöar i Spångåns vattensystem. Lövskog kantar stränderna, därefter tar produktionsbarrskog över. Hasselmus har noterats i närheten.	Djup sjö		4,2
8	3	Spångaån från Höljasjöarna till utloppet i Såken. Ån har måttlig ekologisk status. Vid Hinnared får ån ett meandrande lopp. Öring, elritsa, gädda, lake och signalkräfta förekommer.	Vattendrag		5,7
10	3	Området utgörs av ett bergstup ned mot Såken samt skogen ovanför branten. Här finns bland annat rikligt med lodytor, vilket skapar värdefulla miljöer för bland annat mossor. Området har höga värden för fågellivet.	Skog och träd		2,6
11	3	Ädellövträd omgivna av produktionsbarrskog nordväst om Ramslund.	Skog och träd		0,2
12	3	Litet område med bokskog nordväst om Ramslund.	Skog och träd		0,1
13	3	Bokskog vid Olshult i västsluttning ned mot Såken.	Skog och träd		0,8
14	3	Äldre barrskog på Stora mossen, som omges av trädklädd mosse.	Skog och träd		1,7
15	3	Delvis trädklädd mosse. I öster öppnare med förekomst av öppet vatten i gölar. Ett dike finns i den västra delen.	Myr		8,2
17	3	Äldre ädellövskog samt ädellövträd vid betesmark mellan Nygårdan och Storelyckan. I	Skog och träd		4,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		trädsiktet finns bland annat ek, rönn, björk, ask och klibbal. Flera hålträd förekommer.			
19	3	Litet parti med alsumpskog vid Stomsbacken.	Skog och träd		0,3
21	3	Vid Stomsbacken ligger en ädellövskog i en sluttning. I trädsiktet finns ask, asp, klibbal och gran. Hassel och asksly utgör busksiktet.	Skog och träd		3,2
22	3	Smal bård med äldre lövträd i öppen gräsmark.	Skog och träd		0,4
24	3	Blandlövskog med asp och björk i söder och klibbal och björk i norr. Inslag av gran, ask, ek, tall, säl, apel, lönn och rönn. Dikat i norr. Frisk gräs-örttyp. I busksiktet finns hassel, brakved och viden.	Skog och träd		2,2
26	3	Äldre ädellövträd vid skogsbilväg. Avverkat runt omkring.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	0,3
30	3	Blandlövskog med ek, björk, al, säl och asp. Även gran förekommer. Gamla träd saknas. I busksiktet finns brakved och en.	Skog och träd		1,6
33	3	Lommasjön är en myrsjö på gränsen av kommunen. Den fortsätter även söder om kommungräns. Myrsjöar har ofta stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö	buskskvätta (NT)	0,5
35	3	Lövsogsbestånd på en kulle. Klen-medelgrov ek i glest-tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av gran. Litet inslag av klen-medelgrov björk och asp. Bitvis inslag av grål. Enstaka tall, säl, i busksiktet förekommer hassel, en och brakved.	Skog och träd		3,5
39	3	Myr vid Pjukabo som är mestadels trädklädd men öppen i väster. Produktionsskog omger förutom i nordväst där åkermark tar vid.	Myr		7,3
40	3	Alskog med klen-medelgrov klibbal längs Ätran vid Hillared. Stort inslag av björk. Även inslag av gran, asp, säl och hägg. I fältsiktet har tidigare noterats rankstarr, springkorn, ormbär, rockentrav, dvärghäxört, blomvass och bäckbräsa.	Skog och träd		0,2
41	3	Alskog med klen-medelgrov klibbal längs Ätran vid Hillared. Stort inslag av björk. Även inslag av gran, asp, säl och hägg. I fältsiktet har tidigare noterats rankstarr, springkorn, ormbär, rockentrav, dvärghäxört, blomvass och bäckbräsa.	Skog och träd		2,9
44	3	Ekhage med medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av lönn och klen-medelgrov björk. Enstaka säl, rönn och unggran. I busksiktet förekommer hassel och fältsiktet är av frisk gräs-örttyp.	Skog och träd	almlav (VU), gulvit blekspik (VU), grå jordlav (VU)	2,3
48	3	Veka Öjasjö ligger omgiven av produktionsskog av gran och tall. Sjön är inte försurad, men biologiska data saknas. Fortsätter öster om	Djup sjö		4,3

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		kommungräns.			
49	3	Veka Öjasjö ligger omgiven av produktionsskog av gran och tall. Sjön är inte försurad, men biologiska data saknas. Fortsätter öster om kommungräns.	Djup sjö		1,7
50	3	Glest lövskogsbestånd med medelgrov-grov ek. Inslag av björk samt enstaka rönn. Odlingrösen allmänna. Fältskikt av frisk gräs- och gräs-ristyp.	Skog och träd		1,7
51	3	Hedekskog, delvis betad. Grov ek dominerar med inslag av björk, asp och rönn. I buskskiktet finns hassel, brakved och en. Fältskiktet är av frisk gräs-ris/örttyp. En väg skär den sydvästra delen av området.	Skog och träd		8,2
52	3	Litet bestånd med ädellövskog som omges av åkrar och ett kalhygge.	Skog och träd		0,3
54	3	Talldominerad sumpskog som ansluter till Lockerydsmossen, men en väg avgränsar vilket har gett svag lokal påverkan.	Skog och träd		3,3
56	3	Myr kring tjärnen Kvarnsjön, öppen i öster, med tallsumpskog i norr och söder. Påverkad av omgivande skogsbruk och dikning.	Myr		11,4
58	3	Lommasjön är en myrsjö på gränsen av kommunen. Den fortsätter även söder om kommungräns. Myrsjöar har ofta stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö	buskskvätta (NT)	1,2
60	3	Gärdesmossen och Holmamossen, glest trädklädda med tall. I väster rinner en bäck, som även utgör kommungräns. Kvarngölen ligger i den södra delen av området. Myren är relativt naturlig.	Myr		22,3
62	3	Medelgrov bok i glest bestånd på en kulle omgiven av betesmarker. Enstaka gran och björk. I den södra delen litet inslag av grov ek. Enstaka torrakor och hålträd. Fältskiktet är av torr grästyp, eller saknas helt.	Skog och träd		2,5
64	3	Öppen myr kring bäck vid Båghuset. Bäckens utgör kommungräns. Myren är förhållandevis naturlig och opåverkad.	Myr		6,2
68	3	Boskog på ostsidan av rullstensås. Gränsar i väst till åkermark och i öst till barrskog. Klen-medelgrov bok i ganska tätt bestånd. Inslag av gran, ek och björk. I buskskiktet återfinns glest med hassel. Fältskiktet saknas mest. Hasselmus har tidigare noterats.	Skog och träd	hasselmus	2,5
70	3	Luckig lövskog med rönn, ek, bok, björk, klibbal och apel. Bitvis inslag av gran. Hassel förekommer i buskskiktet. Fältskiktet är av frisk gräs-typ.	Skog och träd		3,8
71	3	I Nässjön skjuter en 800 m lång rullstensås ut söderifrån. Sjön är inte försurad. I sjön har flytsäv (VU) noterats.	Djup sjö	flytsäv (VU)	61,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
72	3	Öppna och trädklädda odlingsmarker samt bäck vid Ävje mellan Kalvsjön och Torasjön. Området ligger på en grusås. Längs landsvägen står enstaka grova ekar med rödlistade lavar.	Äng och betesmark	grynig filtlav (NT), skuggorangelav (NT), månlåsbräken (NT), åkerkål (NT), slåttergubbe (VU)	10,9
73	3	En del av Örsjön ligger inom Svenljunga kommun. Sjön har måttlig ekologisk status.	Djup sjö		18,7
74	3	Trädklädd betesmark med bestånd av slåttergubbe (VU), samt arter som ängsvädd, svinrot och stenmåra. Gran och asp förekommer i trädskiktet.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	0,6
75	3	Ohävdad, trädklädd betesmark stadd i igenväxning. Gran och olika lövträd i trädskiktet.	Äng och betesmark		0,7
76	3	Ädellövskog precis norr om Ätran vid Yttre Skåpanäs. Litet inslag av gran, främst i öster.	Skog och träd		0,6
81	3	Ljusemossen är en mestadels öppen-glest trädklädd myr, med tätare trädklädda delar. Dikning har skett vilket påverkar hydrologin, men mossen har ändå biotopkvaliteter i form av storlek, form och relativ naturlighet.	Myr		27,4
82	3	Kalvsjön är en något större, avlång sjö med värden för bl. a fågellivet. Sjön har måttlig ekologisk status, p.g.a problem med förurning och hydromorfologiska förändringar. Längs stränderna förekommer bitvis värdefull flora.	Djup sjö	skaftslamkrypa (EN), klockgentiana (VU), strandlumner (NT)	722,4
83	3	Lövskogslund vid Nättsjö, nedanför en kulle som är avverkad.	Skog och träd		0,8
84	3	Lövskogslund vid Nättsjö.	Skog och träd		0,5
85	3	Vid Nättsjö ligger ett område med ädellövskog. Den södra delen är en betad skog med klen-medelgrov ek med inslag av säl, asp och björk samt enstaka gran. Hassel och skogsolvon. I norr finns medelgrov bok och ek i tätt bestånd, samt enstaka rönn,	Skog och träd	borsttåg (NT)	5,9
87	3	Bokskog längs väg vid Frackebo. Lunglav (NT) och ädellav (EN) förekommer.	Skog och träd	lunglav (NT), ädellav (EN)	0,8
89	3	Lövskog vid Svenstorp med klen-medelgrov björk och bok i tätt bestånd. Litet inslag av gran. Enstaka rönn, säl och medelgrov asp. Kring husen enstaka grov ask och lönn samt en mycket grov bok. Enstaka lågor.	Skog och träd		3,2
90	3	Mestadels trädklädd myr där tall dominerar. Några fastmarksholmar med tallskog finns. Myren är flikig och i södra delen rinner en bäck. Området är förhållandevis naturligt.	Myr		24,4
91	3	Ädellövskog mot Kalvsjöns västra strand. I söder dominerar medelgrov-grov ek, och skogen övergår i norr mot bokskog. Inslag av gran, björk, lind, asp, säl, ask, rönn. Enstaka	Skog och träd	klockgentiana (VU)	9,3

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		torrakor och hålträd. Hassel i buskskikt. Torr gräs-ristyp. Betad.			
93	3	Boskog med klen-medelgrov bok samt inslag av ek, björk och asp. Fläckvis fältskikt av torr-frisk gräs-ristyp.	Skog och träd		1,8
94	3	Boskog vid Fegens strand. Inslag av ek, björk och asp. Buskskikt saknas och fältskikt av torr-frisk gräsristyp förekommer fläckvis.	Skog och träd		1
96	3	Boskogsbestånd på kulle utmed Kalvsjöns västra strand. Klen-medelgrov bok, inslag av gran, tall, björk och ek. Enstaka grov bok och ek. En i buskskikt, fältskikt av torr örttyp.	Skog och träd	klockgentiana (VU)	2,6
100	3	Ohävdad betesmark med mycket jungfrulin, en del ängsvädd och stenmåra trots lång tids ohävd. I kanten mot tomten två mäktiga lönnar och två lika mäktiga blodbokar. Buskskiktet tättnar snabbt från söder i form av björk och salix-arter.	Äng och betesmark	grynig filtlav (NT)	1,7
108	3	Litet område med klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av tall, rönn, sälg och asp samt enstaka gran. I buskskiktet förekommer brakved och en. Fältskiktet är av frisk gräsristyp.	Skog och träd		0,6
109	3	Lövskog med klen-medelgrov björk och inslag av klen-medelgrov ek. Enstaka tall. Tidigare betat, nu igenväxt.	Skog och träd		2
110	3	Ekskog med medelgrov-grov ek. Inslag av björk och gran samt enstaka rönn, bok, tall och asp. Fältskikt av torr örttyp, buskskikt saknas.	Skog och träd		0,5
111	3	Dunge med ek och björk i tätt bestånd. Inslag av asp, tall och gran. Fältskikt av frisk gräs-ristyp. Området har åtminstone tidigare betats.	Skog och träd		0,4
115	3	Uppströms kraftverket vid Skåpanäs vidgas Ätran till en sjö. Ån har här bedömts till måttlig ekologisk status.	Djup sjö		91,7
117	3	Lövskogsklädda kullar vid Kalvsjöns västra strand. Bok dominerar med inslag av gran, ek och björk. Grov bok förekommer. Fältskikt av torr gräs-ristyp.	Skog och träd		1,9
121	3	Öppen-glest trädklädd myr som kantas av en bård av gran och tall. Utanför denna ansluter kalavverkade områden och ungskog.	Myr		3,2
122	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,2
128	3	Ädellövskog vid Lommaholmen ned mot Kalvsjöns strand. Ek och lind dominerar. Vid stranden är klockgentiana (VU) noterad.	Skog och träd	klockgentiana (VU), lunglav (NT)	0,5
129	3	Strandvåtmark intill Rödesjön. En väg avgränsar området i väster.	Limnisk strand		0,8
131	3	Mestadels öppen, långsträckt myr kring Skållebogölar. Området gränsar till Nordre	Myr		15,3

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Svansjön. Myren kantas av en bård med tall och gran, sedan ansluter avverkade områden på flera sidor. Bäck rinner genom myren.			
132	3	Trädklädd betesmark vid Bökenäs som ansluter till öppet vatten. Igenväxt och bör restaureras. Slåttergubbe (VU), svinrot och stenmåra förekommer.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1,5
133	3	Ädellövskogsbestånd i sluttning ned mot Kalvsjön på östra sidan. Bok (öster) och ek (väster) dominerar, inslag av gran, björk, rönn, lind och asp. Fältskikt av torr-frisk gräs-ristyp och örttyp.	Skog och träd	sommarfibbla (NT)	4
134	3	Avsnörd vik av Kalvsjön norr om Bökenäs. Sjön har bedömts inneha måttlig ekologisk status.	Grund sjö		15
135	3	Litet boksöksbestånd i blockrik sluttning ned mot Kalvsjöns västra strand. Inslag av björk och gran. Enstaka grov bok förekommer. Fältskikt av torr-frisk lågörttyp.	Skog och träd		2,9
138	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,1
139	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,4
140	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand	klockgentiana (VU)	2,4
141	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,8
143	3	Lövskog vid Tovhult. Öster om vägen triviallövskog med björk och klibbal, enstaka ek, bok och sälg. Väster om vägen ekskog med inslag av gran, tall, björk, bok, lind, asp, ask, sälg och rönn. En och sly av ek, björk och rönn i buskskikt.	Skog och träd		4,2
144	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		1
149	3	Löv- och barrblandskog i brant på Kvarnåsaabergets sydsluttning.	Skog och träd		0,6
151	3	Blandlövskog vid Vallen. Björk och asp dominerar med inslag av klibbal, ek och gran. Enstaka lågor och hålträd förekommer. Brakved, hägg och hassel i buskskiktet.	Skog och träd		5,6
152	3	Ekskog på kulle vid Boda. Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. Enstaka unggran samt grov ek, björk och lind. En grov bok. Övergår mot norr i tät slyskog med björk, rönn och ek. Hassel i buskskikt. Torr-frisk gräs-örttyp.	Skog och träd		1,5
153	3	Avlång betesmark som är mycket igenväxt.	Äng och	slåttergubbe (VU)	0,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Slåttergubbe (VU), svinrot och ängsvädd förekommer liksom en skyddsvärd lind i norra delen.	betesmark		
154	3	Ekskogsklädd kulle intill Ätran. Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av gran och klen-medelgrov björk. Enstaka lind, rönn, asp och tall. Hassel samt sly av lind, ek och rönn i buskskiktet. Fällmossa på ek i östra kanten. Tidigare betad.	Skog och träd		2,2
156	3	Ädellövskog vid Vattumosse. I söder med inslag av gran.	Skog och träd		1,3
157	3	Ädellövskog med inslag av gran strax öster om Vattumosse.	Skog och träd		1,5
159	3	Gles ädellövskog som domineras av ek. Inslag av björk, lind, sälg, rönn, apel, asp, ask. Fältskikt av torr-frisk gräs-örttyp. Området är åtminstone tidigare betat.	Skog och träd		0,9
161	3	Litet bestånd med äldre ädellövträd, främst ek, vid Skeppshult.	Skog och träd		0,4
166	3	Öppen våtmark som omges av produktionsskog och avverkade ytor.	Myr		1,6
167	3	Granskog i västvänd brant.	Skog och träd		0,3
168	3	Mestadels öppen myr, dock trädklädd i sydväst. En bäck rinner i den norra delen. Viss dikningspåverkan.	Myr		6,7
169	3	Blandsumpskog kring bäck väster om Åsamossen.	Skog och träd		1,5
170	3	Strandskog som domineras av klibbal längs Kalvsjöns nordvästra strand. Inslag av björk.	Skog och träd		2,3
171	3	Liten, mestadels öppen, myr med förekomst av öppet vatten. Förhållandevis naturlig.	Myr		2,8
172	3	Rödasjön ligger precis norr om Rösarp och är förbunden med Kalvsjön.	Grund sjö		9,7
173	3	Glest trädklädd myr, tätare trädskikt i kanterna. Myren gränsar till sjö. Tall dominerar i kanterna med lövinslag. Viss negativ påverkan från anslutande väg samt från avverkningar.	Myr		5,3
176	3	Boskog med inslag av gran, asp, ek, björk, lind och sälg. Enstaka torrakor och hålträd. Ansluter till strand och sjö.	Skog och träd		9,3
177	3	Blandlövskog med klen rönn och sälg som övergår i medelgrov björk och grov asp. Inslag av grov ek och bok, samt gran. Hassel glest i buskskikt.	Skog och träd		1,2
178	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,4
179	3	Strandvåtmarker som är mestadels trädfria vid Rösarpsviken samt Kalvsjöns västra strand. Avverkningar har bitvis skett nära inpå.	Limnisk strand		0,2

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
180	3	Strandvåtmark intill avsnörd vik av Kalvsjön. Barrskog, delvis avverkad, ansluter norr om.	Limnisk strand		1,3
181	3	Litet bestånd med bok vid Lommaholmen. Inslag av gran.	Skog och träd	lunglav (NT)	1,2
182	3	Ulemossen är en trädklädd mosse där tall dominerar. Litet öppet parti i söder. Avverkningar har påverkat negativt.	Myr		10
183	3	Lövskogslund och hagmarksskog vid Skållebo. Hamlade askar förekommer.	Skog och träd	gulvit blekspik (VU), slåttergubbe (VU), grynig filtlav (NT)	1,2
184	3	Lövskog vid Hässelhult. Medelgrov-grov ek i glest-tätt bestånd. Bitvis inslag av gran. Inslag av klen-medelgrov asp och bok. Enstaka lönn och björk. Hassel i buskskikt.	Skog och träd		2,6
186	3	Näsgölen ligger omgiven av en smal bård av öppen myr som övergår i barrskog som delvis är avverkad. Närheten till Fegen och att den ligger i en myr innebär att sjön troligen har stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö		1,2
187	3	Liten lövskogsklädd brant som omges av ungskog. En bäck rinner i områdets utkant.	Skog och träd		0,2
190	3	Ädellövskog i brant sluttning ned mot Fegen. Bok dominerar med inslag av ek, björk och gran.	Skog och träd		3
193	3	Lövskog med björk och klibbal vid Näs, som ansluter till Fegens strand. En bäck rinner genom området.	Skog och träd		0,9
194	3	Äldre lövskog längs vägen till Näs.	Skog och träd		0,8
198	3	Ohävdad betesmark vid Sandhuset som ligger vid Fegens strand. En del värden i trädsiktet samt i den nord(östra) delen som är opåverkad av produktionshöjande åtgärder.	Äng och betesmark		1,3
199	3	Bokskog på kulle vid Västra Fegens strand. Litet inslag av björk samt enstaka tall och asp. Fältskiktet är av torr gräs-ristyp.	Skog och träd		2
200	3	Blandsumpskog som omges av avverkade områden.	Skog och träd		1,2
203	3	Strandvåtmark kring Hörnesjön. Avverkning har skett nära inpå och utloppet från sjön är utträtat vilket drar ned naturvärdet något.	Limnisk strand		3,8
204	3	Hörnesjön ligger i en myr och bidrar positivt till biologisk mångfald. Myrsjöar har ofta stor betydelse för bl.a fågellivet.	Grund sjö		2,4
206	3	Blandlövskog med ek, lind, bok samt enstaka björk, rönn, asp och gran. Området ligger vid Kalvsjöns strand.	Skog och träd		0,7
207	3	Bokskog vid Lommaholmen med klen-medelgrov bok samt inslag av gran.	Skog och träd		0,5
208	3	Öppen-glest trädklädd myr mellan Kalvsjön och	Myr		11,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Fursjön. En väg skär området.			
209	3	Barrsumpskog med gran och tall. Ett hygge ansluter norr om området.	Skog och träd		0,5
214	3	Litet bestånd med ädellövsog vid Tranered.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	0,2
216	3	Betesmark vid Nygård intill Ätran. Öppet-nästan slutet trädskikt. Marken är igenväxande. Revfibbla och slåttergubbe har noterats.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1
217	3	Betesmark vid Nygård stadd i igenväxning. Troligen obetad sedan 15–20 år, ändå dröjer sig bl.a. ängsvädd och prästkrage kvar.	Äng och betesmark		1
218	3	Lövängsrest vid Kassbo. Området omges av barrskogsplanteringar.	Skog och träd		0,7
220	3	Storasjön är en långsmal sjö som ligger till hälften inom kommunen. Den har bedömts till måttlig ekologisk status och har vissa problem med försurning och att vandringshinder förekommer nedströms. Området är värdefullt för fågellivet.	Djup sjö		116,4
222	3	Ädellövsog vid Åsebo. Omges av barrskog och åkermark. Enstaka värdefull ask och lönn vid vägen.	Skog och träd	lunglav (NT), grynig filtlav (NT)	0,7
231	3	Ekskog vid Kalvs kyrka. Klen-medelgrov ek, inslag av medelgrov-grov tall. Även björk, asp, sälg, rönn och fågelbär. Brakved och glest i buskskikt. Området är strandnära och innehåller även liten sandstrand.	Skog och träd	almlav (VU), tidigare klockgentiana (VU), men ej återfunnen 2007	3,3
239	3	Barrsumpskog. En väg skär objektet i två delar.	Skog och träd		1,4
241	3	Öppen strandvåtmark vid Fursjöns västra strand.	Limnisk strand		2,7
242	3	Mestadels öppen strandvåtmark vid Kalvsjöns östra strand. Delvis påverkad av dikning.	Limnisk strand		9,6
243	3	Björkskog i västsluttning ned mot Fursjön. Enstaka grov asp samt medelgrov-grov ek. Hassel och hägg i buskskiktet.	Skog och träd		1,4
247	3	Spaden är en oligotrof sjö på kommungräns. Riklig övervattensvegetation, även gäddnate, näckrosor och notblomster förekommer. Sjön har en artrik fiskfauna och värden för fågellivet. Försurning och vandringshinder är dock negativt för naturvärdet.	Djup sjö		166,5
249	3	Barrskog intill bäck. Avverkningar omger väster och öster om.	Skog och träd		2,5
250	3	Öppen strandvåtmark längs Fursjön. Bladvass, blåttåtel och pors förekommer.	Limnisk strand		1,9
253	3	Ädellövsog med ek, bok, lind och lönn, även björk, rönn och gran. Skogen är belägen i en sluttning ned mot Kyrkviken, en vik av Kalvsjön.	Skog och träd		1,9
256	3	Björkamossen är en glest trädklädd myr med	Myr		22,1

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		öppna partier i centrala delar. Lokal påverkan från dikning, främst i norr och söder. Avverkning har skett nära inpå.			
258	3	Trädklädd betesmark på torr grusås med svag-ingen hävd. Goda förutsättningar för fin torrängsflora. Björk, asp, lönn, ek, rönn, tall, gran och sälg förekommer. Guldsandbi har noterats i väggkant i öster.	Äng och betesmark	guldsandbi (NT)	0,9
262	3	Betesmark vid Guttorp, ohävdad och under igenväxning.	Äng och betesmark		1,3
263	3	Betesmark vid Guttorp, ohävdad och under igenväxning.	Äng och betesmark		0,8
265	3	Lövskog i sydvästbrant, inslag av gran i lägre liggande delar.	Skog och träd		1,3
268	3	Litet bestånd med tallskog intill öppen myr.	Skog och träd		0,5
269	3	Trädklädd betesmark där ek dominerar, bitvis grov. Även björk och enstaka hägg, gran, tall och rönn. Kuperad mark, med odlingsrösen. En skyddsvärd ek med fällmossa.	Skog och träd		4,3
270	3	Gåsamossen är en mestadels öppen myr som i söder angränsar till å. Väg avgränsar i öster. Myren är relativt orörd.	Myr		57,4
274	3	Trädklädd betesmark med främst gran och björk. Marken är ohävdad.	Äng och betesmark		0,5
275	3	Flerskiktad ädellövskog vid Rydet. Omges av åkrar och avverkade områden.	Skog och träd		2,7
278	3	Trädklädd betesmark, med relativt många värdefulla ekar och aspar. Bitvis ganska opåverkad flora.	Äng och betesmark		4
283	3	Blandlövskog i sluttning. Klibbal dominerar, med inslag av björk och ek främst i kanterna. Enstaka sälg, hägg och ung gran. Hassel i buskskikt. Fältskikt av fuktig örttyp.	Skog och träd		1,5
290	3	Betesmark vid Baskered som är stadd i igenväxning, men här finns värden i trädskikt och i floran. Angränsar till välhävdad betesmark.	Äng och betesmark		1,5
293	3	Skogsbete vid Gunnarsbo med ett antal grova tallar och granar.	Skog och träd		20,6
294	3	Vännebosjön har problem med försurning, men kalkning har gett önskad effekt. Vandringshinder förekommer nedströms sjön vilket dock är negativt för naturvärdet.	Djup sjö		32,9
296	3	Del av Uttermossen som fortsätter väster om kommunen. Den del som är i kommunen är mest glest trädklädd med tall, men öppna partier förekommer. Några bäckar och en göl förekommer.	Myr		12,2
314	3	Liten betesmark vid Klovarp, i öster trädklädd. Vissa floravärden men behöver restaureras.	Äng och betesmark		0,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
315	3	Lövskog, möjligen betad, med medelgrov-grov ek, grov björk, asp och rönn. Gran, mest i öster, och lönn förekommer också.	Skog och träd		3
318	3	Tidigare betad ekskog med inslag av björk, gran, asp. Brakved och en förekommer i buskskiktet.	Skog och träd		3,5
324	3	Barrskog kring bäck i dalgång vid Gebo.	Skog och träd		0,7
326	3	Västvänd brant med gran och lövträd vid Björkelund.	Skog och träd		1,4
328	3	Älesjön har bedömts till måttlig ekologisk status. Vandringshinder är negativt för naturvärdet. Sjön har problem med försurning men detta motverkas genom kalkning.	Djup sjö	klockgentiana (VU), borsttåg (NT), strandlumner (NT)	24,3
330	3	Strandvåtmark intill Åstarpasjön. Mest öppen men mot kanterna buskar och lövträd.	Myr		1,1
332	3	Öppen betesmark med vissa hävdgynnade arter som stagg, stenmåra, slåttergubbe (VU), knägräs och revfibbla. Kvävepåverkad.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	2
333	3	Öppen betesmark, påverkad av produktionshöjande åtgärder. Här finns ändå enstaka slåttergubbe (VU), stagg och prästkrage.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1,1
339	3	Ekebergsmossen och Myrbäckskärret har öppna, glest trädklädda samt sumpskogspartier. Området är relativt opåverkat av mänskliga ingrepp.	Myr		51,8
344	3	Västvänd brant som domineras av gran med inslag av lövträd.	Skog och träd		1,1
345	3	Ekåsamossen är en glest trädklädd mosse som domineras av tall. I väster övergår den till en mestadels öppen mosse. En fastmarksholme förekommer, och i norr ligger Svaletjärn. Mossen är relativt opåverkad och varierad.	Myr		8,8
346	3	Del av Uttermossen som fortsätter väster om kommunen. Den del som är inom kommunen är mest glest trädklädd med tall, men öppna partier förekommer. Några bäckar och en göl förekommer.	Myr		2
349	3	Tjärnsmosse är en öppen-glest trädklädd myr med en tjärn. Svag lokal påverkan från dikning och intilliggande avverkning, men myren är förhållandevis naturlig.	Myr		21,3
350	3	Torr och mager gammal slåtteräng. Kvar dröjer sig fortfarande bl.a. ängshavre och ängsvädd. Ett antal grova gamla björkar finns. Marken växer igen med björksly och gran.	Äng och betesmark		0,4
351	3	Öppen betesmark med till stor del kvävepåverkad flora. Dock förekommer rikligt med sten- och gulmåra samt ängsvädd. Tidigare har här funnits vanlig backsippa (VU) och backtimjan (NT).	Äng och betesmark	vanlig backsippa (VU), backtimjan (NT)	0,9

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
352	3	Mager och torr gammal slåttad grusås med stora förutsättningar att bli både artrik och värdefull. Många gamla björkar. I fältskikt finns ännu kvar mycket svinrot och ängsvädd.	Äng och betesmark		1,4
355	3	Barrsumpskog intill trädklädd myr vid Trollsjön.	Skog och träd		1,1
356	3	Blandsumpskog med gran och lövträd kring bäck vid Bergsholm.	Skog och träd		0,5
357	3	Blandsumpskog söder om Skogen. Avverkat öster om.	Skog och träd		0,8
363	3	Bäckmiljö med lövträd längs Kvarnatorpsån.	Skog och träd		0,2
368	3	Ädellövskog i ostsluttning. Ek dominerar, inslag av bl a gran. Förhållandevis gles.	Skog och träd		1,9
371	3	Lövskogslund, troligen tidigare betad. Inslag av gran främst i väster.	Skog och träd		2,1
374	3	Klibbalsumpskog med stort inslag av gran samt enstaka tall och glasbjörk. Området är översilat och har riklig förekomst av död ved. Håliga alar, torrträd och lågor förekommer. Liten bäck rinner i området.	Skog och träd		1,5
376	3	Ekskog med medelgrov-grov ek, inslag av björk och asp. Enstaka ask. Hassel och brakved i buskskiktet. Fältskikt av gräs-örttyp.	Skog och träd		1,2
378	3	Mindre bestånd med barrskog som domineras av gran. En bäck rinner i den östra delen av området.	Skog och träd		0,8
379	3	Buttorps mosse är en mestadels öppen mosse som skärs av en väg i nord-sydlig riktning. Svag lokal påverkan från dikning. Trädklädd i kanterna.	Myr		27,6
381	3	Gles hagmarksskog med ek, åtminstone tidigare betad. Enstaka björk och klibbal samt grov ask förekommer.	Skog och träd		2,1
382	3	Barrskog vid Lilla Byrhult.	Skog och träd		0,6
385	3	Lövskogslund med ek, asp och björk. En i buskskikt.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	1,4
387	3	Litet bestånd med äldre granskog intill Björsjöns strand.	Skog och träd		0,6
390	3	Åsamossen är en glest trädklädd myr. I söder går ett dike där lövträd samt ung gran och tall börjat växa in. I övrigt dominerar tall på myren.	Myr		22,9
392	3	Lövskogklädd kulle vid Mjoghult. Medelgrov-grov ek, inslag av medelgrov-grov björk. Enstaka rönn och asp. Skogen betades tidigare, ev. fortfarande.	Skog och träd		2,4
395	3	Hjärtaredsmossen är mest trädklädd med tall. En bäck rinner genom mossen som närmast vattnet är öppen. Tjärnen Tranesjön ligger i den nordöstra delen. Mossen är lokalt svagt	Myr		29,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		påverkad av anslutande avverkning och dikning.			
396	3	Igenväxande betesmark, endast mindre delar är helt skuggfria, Grov ek, hirsstarr och ängsvädd är några av de värden som finns.	Äng och betesmark		1
397	3	Mossodling som sedan blivit slåttermad, nu använd som betesmark. I år dock inte betad, ohävdarter som vassstarr, vass m.m. börjar etablera sig. Även älggräs, vecketåg förekommer.	Äng och betesmark		1,2
401	3	Strandvåtmark intill Lillån vid Bäckäng. En lövträdsridå avgränsar mot åkermark i öster.	Limnisk strand		0,6
402	3	Strandvåtmark längs Lillån vid Bäckäng. Marken är i huvudsak öppen, men i öster står en lövträdsridå.	Limnisk strand		0,6
405	3	Betesmark till stora delar bevuxen med björk, som når ned till Ätrans strand där albuketter står. Korvsjö med öppenvatten, även två små vattensamlingar. Mandelblom, grönvit nattviol, prästkrage, skogsklöver, gökärt, vårbrodd och ängsvädd förekommer i fältskiktet.	Äng och betesmark	grönvit nattviol	2,8
408	3	Ohävdad fuktig-blöt betesmark intill Håcksviksån vid Gräsdal. Marken är stadd i igenväxning. Det strandnära läget motiverar restaureringsåtgärder.	Äng och betesmark		0,7
410	3	Öppen betesmark väster om Ätran vid Hagalund. Domineras av fuktäng, men här finns även torrare partier med ängsskallra, ängshavre, skogsklöver, liten blålocka och gökärt.	Äng och betesmark		2,3
411	3	Mogasjön ligger öster om Håcksvik. Den har inte fått någon bedömning av ekologisk status. Tidigare har här noterats flytsäv (VU) och borsttåg (NT).	Djup sjö	flytsäv (VU), borsttåg (NT)	21,5
413	3	Gräskan är en oligotrof skogssjö med ett största djup om 15,2 m, som delvis ligger inom kommunen. Vandringshinder nedströms samt försurning är negativt, vilket gett bedömningen måttlig ekologisk status. Sjön har en tämligen artrik fiskfauna.	Djup sjö		45,1
416	3	Skrubbemossen ligger längs en bäck strax norr om Ammamossen. Myren är öppen-glest trädklädd med tall. Svag lokal påverkan från dikning.	Myr		47,9
418	3	Ekebergsmossen och Myrbäckskärret har öppna, glest trädklädda samt sumpskogspartier. Området är relativt opåverkat av mänskliga ingrepp.	Myr		17,5
420	3	Strandvåtmark vid Lillån. Mot ån står bl.a. klibbal. I öster förekommer gran.	Limnisk strand		3,8
421	3	Strandvåtmark intill Stångån, glest klädd med främst klibbal.	Limnisk strand		0,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
422	3	Några större öppna mader som inte betas intill Ätran vid Kolarp. Vegetation består främst av högvuxen starr och älggräs. Även klockgentiana (VU) har noterats från den sydöstra delen. Värdefullt område för fåglar.	Äng och betesmark	klockgentiana (VU), sävspurv (VU), buskskvätta (NT)	16,9
423	3	Litet bestånd med barrsumpskog i svacka sydost om Anfastorp. Avverkat i nära anslutning öster om.	Skog och träd		0,3
424	3	Trädklädd betesmark vid Hålabäckstorp. Ganska artfattig flora med blodrot, gökärt, liten blåklocka, svartkämpar och ängsvädd. Flera värdefulla träd: björk, ek, rönn och säl. Delar av området med svag-tydlig kvävepåverkan.	Äng och betesmark		1,5
425	3	Myr vid Rullån, mest trädklädd men öppen närmast ån som meandrar sig fram. Förhållandevis opåverkad.	Myr		14,7
427	3	Längs Ätran ligger blöta, ohävdade mader som till stor del är öppna men bitvis håller på att växa igen med videsnår. Ett mindre småvatten ligger nära ån. Vissa fågelvärden, bl.a har enkelbeckasin och sävspurv (VU) noterats.	Äng och betesmark	enkelbeckasin, sävspurv (VU)	14,2
432	3	Öppen till glest trädklädd mosse som omges av åkrar och barrskog. Mestadels intakta kantzoner med löv- och barrträd. Förhållandevis naturlig.	Myr		9,4
433	3	Öppen till glest trädklädd mosse som omges av åkrar och barrskog. Mestadels intakta kantzoner med löv- och barrträd. Förhållandevis naturlig.	Myr		4,1
434	3	Ekåsamossen är en glest trädklädd mosse som domineras av tall. I väster övergår den till en mestadels öppen mosse. En fastmarksholme förekommer, och i norr ligger Svaletjärn. Mossen är relativt opåverkad och varierad.	Myr		12,7
436	3	Brostorpamossen, en mestadels öppen mosse med en göl - Mossasjö. En del variation förekommer och myren är förhållandevis naturlig och opåverkad.	Myr		54,9
437	3	Relativt artrik gammal äng, trots en långt gången igenväxning. Måttlig förekomst av darrgräs, rikligt med ängsvädd. Dessutom är mer allmänna ängsväxter vanliga. I trädskiktet finns gran och lövträd.	Äng och betesmark		1,8
438	3	Långsmalt kärr längs Flybäcken. Mestadels öppet, trädklätt mot kanterna. Förhållandevis opåverkat.	Myr		38,5
439	3	Inganåsasjön, Nabbasjön och L. Nabbasjön är tätt sammanbundna, långsmala sjöar i en nord-sydlig sprickdal. På den östra dalsidan reser sig berget tvärt ur sjön. Måttlig ekologisk status eftersom vandringshinder finns, samt problem	Djup sjö		23,8

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		med förurning.			
440	3	Rybackamossen är en öppen-trädklädd mosse som ansluter till den lilla sjön Kvarnsjön. Avverkningar har skett i nära anslutning sydost om men i övrigt är mossen förhållandevis naturlig och opåverkad.	Myr		13,4
441	3	Öppen-trädklädd mosse vid Båstjärn. En bäck rinner söderut från Båstjärn. Svag lokal påverkan från anslutande avverkning.	Myr		37,1
442	3	Mosse söder om Vrångebo. Bitvis mycket blöt, ett antal tjärnar ingår också i objektet, liksom Kvarnbäcken. Anslutande avverkning har gett negativ påverkan men området är ändå förhållandevis naturligt och varierat.	Myr		41,5
446	3	Litet ekdominerat bestånd vid Karsbo. Omges av åkrar samt en avverkad yta. Glest med hassel och en i buskskikt. Lågor förekommer.	Skog och träd		0,6
451	3	Betesmark vid Källenas intill Yttersjön. En väldigt grov ek, en grov lind och, minst tre hamlade askar. Floran klart påverkad av ohävd och igenväxning, men de vanliga ängsväxterna finns samt lite svinrot och slåttergubbe (VU). Stort slyuppslag.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1,9
452	3	Högmossen är en glest trädklädd myr med tuvor och svagt utvecklade strängar. Omges av avverkade ytor. Svag lokal påverkan från äldre dikning.	Myr		9,6
454	3	Lövskog, åtminstone tidigare betad, med många värdefulla träd - bok, ask (vissa hamlade), ek, asp och lönn runt gården Ingärdebo. I fältskiktet finns bl.a. jungfrulin och fläcknycklar.	Skog och träd	fläcknycklar	5,6
455	3	Lövskog norr om Källtorp, fortsätter i smal bård längs åkerkant. Trädsiktet utgörs av björk, asp, en och sälg.	Skog och träd	lunglav (NT)	6,4
458	3	Objektet utgörs av fyra trädklädda åkerholmar vid Klägghult, som åtminstone tidigare betades. Medelgrov-grov lind dominerar med inslag av medelgrov-grov ek. Bitvis tätt med asp och björk, enstaka gran, lönn och sälg.	Skog och träd		2,2
462	3	Delvis trädklädd myr, en bäck rinner i den norra delen. Svag påverkan från anslutande avverkning.	Myr		10,5
463	3	Gölamossen är en öppen-glest trädklädd myr med en liten göl. Myren är förhållandevis opåverkad.	Myr		22
464	3	Mosse norr om Hålasjön, mest trädklädd med tall men öppna partier förekommer. Svag lokal påverkan från omgivande avverkningar. Gölen Kampatjärn ligger i myrens norra del.	Myr		14,9
465	3	Äldre barrskog på kulle öster om Kampatjärn. Brunpudrad nållav (NT) på björkhögstubbe,	Skog och träd	brunpudrad nållav (NT),	7,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		även stubbtrådmossa (NT) och kornknutmossa (NT) påträffade.		strubbtrådmossa (NT), kornknutmossa (NT)	
467	3	Barrskogsklädd tvär västvänd brant intill Inganäsasjön. Gran dominerar, med litet lövinslag.	Skog och träd		1,4
470	3	Mosse väster om Hålasjön, trädklädd med öppna partier. En bäck rinner i den södra delen och en göl ligger i den norra delen.	Myr		6,4
471	3	Mosse kring bäck, ansluter till Hålasjön i söder. Mest glest trädklädd, öppet kring bäcken. Anslutande avverkning har gett svag lokal påverkan.	Myr		12,8
472	3	Grandominerad västvänd brant med stort lövinslag framförallt i den södra delen.	Skog och träd		1
473	3	Östvänd brant ned mot Gölamossen. Gran dominerar med inslag av lövträd. Bitvis luckigt. Lodytor förekommer.	Skog och träd		2,9
474	3	Västvänd barrskogsklädd brant. Viss olikåldrighet förekommer.	Skog och träd		0,8
478	3	Ädellövträd vid Källhult. Ek och björk, glest med en i buskskiktet.	Skog och träd		0,6
482	3	Kroksjön ligger delvis inom kommunen. Sjön har bedömts till måttlig ekologisk status. Försurning och vandringshinder i vattensystemet är negativt för naturvärdet. Försurning motverkas genom kalkning.	Djup sjö		11,1
484	3	Trädklädd betesmark vid Mellan-Bäck. Medelgrov-grov ek, litet inslag av medelgrov björk. Enstaka grov lind och asp. Fältskikt av frisk grästyp.	Äng och betesmark		2,3
492	3	Hölsjön är direkt förbunden med Fegens norra del, och har bedömts till måttlig ekologisk status. Flytsäv (VU) har tidigare noterats.	Djup sjö	flytsäv (VU)	17,2
495	3	Östvänd brant med löv- och barrblandskog.	Skog och träd		1,2
497	3	Hagmarksskog vid Kårte som domineras av gran i nordost, men övergår i blandskog i sydväst.	Skog och träd		3,4
498	3	Välhävdat betesmark vid Holmsjön med en del hävdgynnad flora som stenmåra, knägräs, stagg och revfibbla.	Äng och betesmark		0,6
505	3	Ekskog med inslag av tall och gran. Lågor förekommer. Lunglav (NT) och dvärgbägarlav (NT) har noterats.	Skog och träd	lunglav (NT), dvärgbägarlav (NT)	2,6
506	3	Ostvänd brant med grova granar samt inslag av lövträd vid Kleven.	Skog och träd		1,8
507	3	Mosse söder om Hålasjön. Mest trädklädd med tall men öppen längs den bäck som rinner i nord-sydlig riktning. Avverkningar har gjorts i nära anslutning vilket lett till svag lokal	Myr		11,9

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		påverkan.			
508	3	Ädellövskog sydväst om Pajered. Skogen har tidigare hävdats genom bete.	Skog och träd	åkerkål (NT)	1
509	3	Mosse längs bäck som mynnar i Storasjön. Mest öppen, men trädklädd mot kanterna. En väg skär området.	Myr		6,1
512	3	Lövrik barrnaturskog norr om Sjöbo. Angränsar till Storasjöns norra strand.	Skog och träd		2,9
516	3	Lövrik barrnaturskog med gran och björk samt inslag av ek.	Skog och träd		0,9
517	3	Litet bestånd med äldre ädellövträd norr om Hussered.	Skog och träd		0,4
519	3	Ädellövskog i sluttning ned mot Kättarpsån.	Skog och träd		0,7
520	3	Trädklädd betesmark vid Storäng. Trädskitet är bitvis slutet.	Äng och betesmark		1,2
522	3	Lövdominerad hagmarksskog i Gammalsjö, med enstaka värdefulla ekar.	Skog och träd		1,4
526	3	Ekskog vid Kummeludden vid Västra Fegens norra strand.	Skog och träd	lunglav (NT)	1,6
529	3	Restaurerad betesmark med terrasskanter, rösen och stensättning. Viss hävdgynnad flora med gökärt, ängsvädd och stenmåra förekommer.	Äng och betesmark		2,5
531	3	Blandsumpskog öster om Ätran som i söder övergår till en torrare blandskog med inslag av grövre tall.	Skog och träd		0,8
532	3	Längs Ätrans östra sida löper en bergbrant. Lodytor och grova block ger gott om skrymslen. Gran dominerar, inslag av rönn, björk och tall. Gott om grövre lågor och vindfällan. Inslag av alsumpskog med alsockar. Korallav, stor revmossa, västlig hakmossa.	Skog och träd	stor revmossa, västlig hakmossa	0,2
533	3	Längs Ätrans östra sida löper en bergbrant. Lodytor och grova block ger gott om skrymslen. Gran dominerar, inslag av rönn, björk och tall. Gott om grövre lågor och vindfällan. Inslag av alsumpskog med alsockar. Korallav, stor revmossa, västlig hakmossa.	Skog och träd	stor revmossa, västlig hakmossa	0,3
534	3	Ridå med klibbal längs ett 400 m långt avsnitt av Ätrans västra strand. Gamla klibbalbuketter och rikligt med död ved i form av torrakor och högstubbar. Det ligger även gott om död ved i vattnet längs strandkanten.	Skog och träd		1,1
535	3	Betesmark med ohävd och/eller svag hävd under många år. Viss hävdgynnad flora som stagg, stenmåra och ängsvädd finns kvar. Torr-frisk mark med enstaka värdefulla bokar och ekar. Opåverkad av produktionshöjande åtgärder.	Äng och betesmark		1,4
536	3	Mosse väster om Fornebo. Mest glest	Myr		86,5

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		trädklädd med tall, tätare trädklädda partier förekommer också. Bäckar rinner i den västra respektive den östra delen. Viss påverkan från dikning, vägdragning och avverkning.			
537	3	Äldre lövrik barrskog, fastmarksholme i en myr som brukas för torvtäkt. Väg avgränsar i väster.	Skog och träd		0,7
539	3	Kolsjömossen är en trädklädd myr, mestadels med glest trädtecke. Några tjärnar ingår i objektet, liksom enstaka fastmarksholmar med äldre granskog. Svag lokal påverkan från dikning.	Myr		0,7
540	3	Lövskogslund i nordsluttning vid Slätthult. Trädsiktet består av klibbal, ask, rönn, björk och asp med inslag av gran. Hassel i busksiktet.	Skog och träd		1,4
541	3	Lövskog vid Slätthult, en bäck rinner genom området. I trädsiktet finns asp, björk, klibbal, sälg och rönn.	Skog och träd		0,9
545	3	Lövskogslund i nordvästsluttning vid Sandsjönäs.	Skog och träd		0,8
547	3	Trädklädd betesmark med en del värdefulla träd, bl a ek, ask, lönn. Svag eller ingen hävd sedan länge, ändå finns slåttergubbe (VU), ängshavre och ängsvädd kvar.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1,4
549	3	Längs en grusväg ligger en sydvänd sluttning med sandig mark och torräng med gott om svinrot, även slåttergubbe (VU), mosippa (EN), ljung, ängshavre, gökärt, ängsviol och ängsvädd.	Äng och betesmark	mosippa (EN), slåttergubbe (VU)	0,1
550	3	Buttorps mosse är en mestadels öppen mosse som skärs av en väg i nord-sydlig riktning. Svag lokal påverkan från dikning. Trädklädd i kanterna.	Myr		14,7
555	3	Kroksjön är en mindre sjö som ligger omgiven av myrmark och barrskog som delvis är avverkad.	Djup sjö		8,9
556	3	Igenväxande betesmark vid Picke. Hävdgynnade arter som granspira (NT), svinrot och ängsvädd finns kvar.	Äng och betesmark	granspira (NT)	0,3
559	3	Myr längs Lysjöån, fortsätter utanför kommungräns. Mest trädklädd, men närmast ån är myren öppen. Lokal påverkan från intilliggande avverkningar.	Myr		11,1
562	3	Igenväxande äng vid Granhallatorp. Stagg och stenmåra frekvent förekommande, här finns även ängsvädd, slåttergubbe (VU) och smörboll.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU), smörboll.	2,8
563	3	Lövskogslund i kant mot åker vid Granhallatorp. I trädsiktet finns björk, al, ek, lönn, rönn, sälg, alm, ask och apel. Hassel och en förekommer i busksiktet.	Skog och träd		1,2
564	3	Blandsumpskog nedanför sluttning öster om	Skog och		0,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Stenstorp. Området fortsätter även utanför kommungräns.	träd		
565	3	Granskog längs bäck söder om Picke.	Skog och träd		0,8
567	3	Blandlövskog längs Ätran vid Buttorp. Klibbal och björk dominerar med inslag av ek, lönn, ask, rönn, hassel, hägg och sälg. En del grov klibbal på socklar förekommer. Högstubbar och lågor av al samt torrakor förekommer också.	Skog och träd		2
568	3	Blandlövskog längs Ätran vid Buttorp. Klibbal och björk dominerar med inslag av ek, lönn, ask, rönn, hassel, hägg och sälg. En del grov klibbal på socklar förekommer. Högstubbar och lågor av al samt torrakor förekommer också.	Skog och träd		0,2
569	3	Mosse med några tjärnar söder om Borryd. Mest glest trädklädd. Förhållandevis opåverkad men svag lokal påverkan från dikning och avverkning finns.	Myr		49,9
570	3	Lövrik äldre barrskog i sydvänd brant på Björsjöberg.	Skog och träd		5,6
575	3	Vid Stackebo ligger en torr-frisk, bitvis nästan fuktig betesmark. Ganska igenväxt och stora delar ohävdade. Endast svagt betat de senaste 10-20 åren. Viss hävdgynnad flora finns ännu kvar.	Äng och betesmark		1,3
576	3	Ett öppet betat flodplan med vattensamlingar. Området avgränsas av en betad erosionsbrant glest bevuxen av ek och björk. Här finns en viss ängsflora av svinrot, ängsviol och liten blåkllocka. En öppen sandblotta ger bra förutsättningar för steklar.	Äng och betesmark		4,1
577	3	Vid Bållatorp växer en hedekskog med stort inslag av asp, även björk. Enstaka gran, ask, lönn och sälg. Bitvis finns gott om torrakor och hålträd. Brakved och hassel i buskskiktet. Området har tidigare betats.	Skog och träd		8,1
584	3	Västvänd brant med blandskog norr om Skönabäck.	Skog och träd		1,4
585	3	Öppen betesmark intill Ätran vid Hagalund. Marken är av strandängskaraktär och en värdefull miljö för vadare. En ridå med klibbal finns längs ån.	Äng och betesmark		2,4
588	3	Igenväxande betesmark intill Rysjön. Närheten till vatten höjer naturvärdet.	Äng och betesmark		1,8
590	3	Ett område med flera småvatten och vattenfyllda rester av åslingor. Omgivande marker hävdas inte längre och har en tämligen trivial flora. Småvattnen ger förutsättningar för en rik evertebratfauna och för amfibier.	Småvatten		1,9
591	3	Liten betesmark med förhållandevis gles flora: blodrot, blåsuga, gökärt, prästkrage, smultron, svartkämpar, våbrodd, örnbräken. Torr-frisk	Äng och betesmark		0,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		välhävdat mark, ingen-svag kvävepåverkan.			
592	3	Igenväxande betesmark i Ängalund som stått ohävdad i många år. Floravärden finns dock som snabbt kan komma tillbaka vid restaurering och återupptagen hävd.	Äng och betesmark		0,5
593	3	Svagt hävdad betesmark vid Gunnboås. Glest med ängsväxter som blåsuga, gökärt, stenmåra, svartkämpar, vårbrodd. Frisk mark, svag-ingen kvävepåverkan. Halvöppen med: asp, björk, ek, lönn och oxel i trädskiktet.	Äng och betesmark		0,7
595	3	Öppen betesmark vid Kvarnåsen med värdefull hävdgynnad flora, som dock täcks till stor del av örnbräken.	Äng och betesmark		1
601	3	Stommamossen och Hallamossen är mestadels glest trädklädda, men trädskiktet tätar i kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag lokal påverkan från dikning och avverkning.	Myr		20,1
602	3	Del av Råmossen, som ingår i större myrkomplex med Breamossen. Fortsätter utanför kommungräns. Inom kommunen är myren mest glest trädklädd med inslag av mindre öppna partier. Dikning har gett svag lokal påverkan.	Myr		19,1
603	3	Stommamossen och Hallamossen är mestadels glest trädklädda, men trädskiktet tätar i kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag lokal påverkan från dikning och avverkning.	Myr		1,4
604	3	Stommamossen och Hallamossen är mestadels glest trädklädda, men trädskiktet tätar i kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag lokal påverkan från dikning och avverkning.	Myr		35
605	3	Stommamossen och Hallamossen är mestadels glest trädklädda, men trädskiktet tätar i kanterna. Öppna partier förekommer. Ansluter till Lillesjön, bäck rinner genom myren. Svag lokal påverkan från dikning och avverkning.	Myr		12,9
606	3	Litet bestånd med ädellövträd nordväst om Fjärhult. Omges av avverkade ytor. Grynig filtav (NT) har noterats.	Skog och träd	grynig filtav (NT)	0,5
607	3	Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd myr som omsluter stora delar av Apelnässjön. Bäcker rinner genom myren som är förhållandevis opåverkad.	Myr		2,4
608	3	Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd myr som omsluter stora delar av Apelnässjön. Bäcker rinner genom myren som är förhållandevis opåverkad.	Myr		5
609	3	Stora Sjömossen är en mestadels trädklädd myr som omsluter stora delar av Apelnässjön.	Myr		1,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Bäckar rinner genom myren som är förhållandevis opåverkad.			
610	3	Öppen-glest trädklädd mosse med skogbevuxna små fastmarksholmar. En bäck rinner från den norra delen. Svag lokal påverkan från anslutande avverkningar.	Myr		48,8
611	3	Skitnarågmossen är en mestadels trädklädd myr med glesare trädskikt i väster. Myren är påverkad av dikning och omgivande avverkning.	Myr		27,2
612	3	Ekdominerat bestånd norr om Torp. Inslag av björk, rönn och asp samt enstaka gran och ek. Glest med brakved och en i buskskiktet.	Skog och träd		2,3
618	3	Hålasjön är en myrsjö som ligger mellan Linsbomossen och Tassamossen.	Djup sjö		12
619	3	Store mossen är en öppen-glest trädklädd myr. Tätare trädklädda partier dominerade av tall förekommer. En bäck rinner genom myren. Förhållandevis opåverkad, även om anslutande avverkning och dikning gett svag lokal påverkan. Fortsätter utanför kommungräns.	Myr		56,3
621	3	Simmesjön har bedömts till måttlig ekologisk status. Vattenkvaliteten är god för både försurning och övergödning. Det finns definitiva vandringshinder nedströms sjön, vilket är negativt för naturvärdet.	Djup sjö		87,5
623	3	Lövskog med klibbal, björk, asp, ek, rönn samt inslag av gran. Övergår mot norr i glesare hagmarksskog. Gott om torrakor, lågor och hålträd. Hassel i buskskikt.	Skog och träd		4,3
626	3	Porsagöl är en myrsjö. Myrsjöar har ofta stor betydelse för bl.a fågellivet.	Djup sjö		3,1
627	3	Öppen betesmark vid Kolarp. Ansluter i nordost till Bergabäcken.	Äng och betesmark		6,7
628	3	Ohävdad betesmark vid Kolarp, största delen björkdominerad, en del äldre björk. Igenväxande med bl a aspsly. En del hävdgynnad flora som slättergubbe (VU), svinrot, prästkrage, revfibbla och gökärt finns ännu kvar.	Äng och betesmark	slättergubbe (VU)	3
631	3	Mader intill Ätran vid Ringestena, några betas fortfarande av nötdjur. Värdefullt för fågelfaunan: gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, ängsbiplärka (NT), buskskvätta (NT) har noterats. I ohävdade delar tar älgört, fackelblomster och videört över.	Äng och betesmark	gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, ängsbiplärka (NT), buskskvätta (NT)	14
632	3	Mader intill Ätran vid Ringestena, några betas fortfarande av nötdjur. Värdefullt för fågelfaunan: gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, ängsbiplärka, buskskvätta har noterats. I ohävdade delar tar älgört, fackelblomster och videört över.	Äng och betesmark	gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, ängsbiplärka (NT), buskskvätta (NT)	9,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
634	3	Ingegärdebo gårdssjö ligger i östra kanten av kommunen. Storlom häckar regelbundet i sjön.	Djup sjö	storlom	14,5
635	3	Lövskog vid Österåsen. Grynig filtlav har noterats.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	1,3
638	3	Området utgör en del av Hästhagsmossen, som fortsätter utanför kommungränsen. Mossen är glest trädklädd, och svagt påverkad av anslutande avverkningar.	Myr		4,3
641	3	Ohävdad betesmark med vissa floravärden. Återupptagen hävd skulle höja naturvärdet.	Äng och betesmark		0,8
643	3	Betesmark vid Roasjö där en liten del innehåller ängsvädd, brudborste och hirsstarr. Stora delar är kvävepåverkade och innehåller skräppor och nässlor. Fin hassel och någon äldre ek förekommer.	Äng och betesmark		1,6
646	3	Litet bestånd med lövskog vid gården Brattåsen.	Skog och träd	trubbdaggkåpa (NT)	0,4
647	3	Lövbrännelik successionsmark med lövträd vid Hallen.	Skog och träd		0,9
651	3	Kvarnsjön ansluter till Rybackamossen som är en bitvis öppen myr.	Djup sjö		6,6
652	3	Litet område med äldre ädellövträd i åkerkant vid Ånarp. Lind, ask, bok och ek förekommer.	Skog och träd		0,3
653	3	Litet område med ädla lövträd ned mot sjön. Ek, ask, lind och bok förekommer. Närmast sjön finns klibbal.	Skog och träd		0,6
656	3	Åkerholme med grov ek i glest bestånd och med inslag av medelgrov björk. Åtminstone tidigare beteshävd.	Skog och träd		0,8
659	3	Stora Lasjön är en mindre sjö som omges av en bård av myrmark.	Djup sjö		1,8
660	3	Lövskog med medelgrov klibbal och björk. Inslag av gran och grov asp, enstaka rönn och ek. Gott om torrakor, lågor och hålträd. Glest med hassel i buskskiktet.	Skog och träd		1,1
661	3	En del av Dräggsjön ligger inom kommunen. Försurningen i sjön motverkas genom kalkning.	Djup sjö		7,6
662	3	Ullasjösjön är den näringsrikaste sjön i kommunen. Den är mycket fiskrik och utgör en viktig rastplats för fågel.	Djup sjö		11,6
663	3	Gammal sandtäkt som verkar betad av häst. Olika typer av sandmiljöer med olika rasvinklar, lodrät-plana. Området är delvis bevuxet med örter som renfana och röllika. Insektslivet verkar rikt, bl a har brun sandjägare noterats.	Sandmiljö		2,2
664	3	Ett sumpskogsområde med björk- och alsumpskog och i nordost öppet kärr med bl.a älggräs. Genom området rinner en liten bäck. Längst i nordost mot gården, står en allé av ask, samt flera gamla grova rönnar och sälgar.	Skog och träd		1,5
666	3	Skogsbete vid Kårte som domineras av gran.	Skog och		1,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
			träd		
668	3	Vid Hestra står flera gamla lönnar, varav några är hamlade. Några av lönnarna är mulmträd. Grynig filtlav (NT) och skrovellav (NT) har noterats.	Skog och träd	grynig filtlav (NT), skrovellav (NT)	0,4
670	3	Ekskog söder om Grobo. Litet inslag av asp och björk, enstaka rönn, apel och gran. Bitvis slyuppslag av björk och asp.	Skog och träd		1,2
672	3	Området utgör en del av Hästhagsmossen, som fortsätter utanför kommungränsen. Mossen är glest trädklädd, och svagt påverkad av anslutande avverkningar.	Myr		3,7
673	3	Två små ängar vid Grankilen. I floran finns bl.a. ängsskallra och knägräs.	Äng och betesmark		0,1
674	3	Betesmark som stått ohävdad sedan minst 10 år. Viss hävdgynnad flora finns dock kvar, bl.a. svinrot och darrgräs. Även några hamlade björkar förekommer. Objektet fortsätter söder om kommungräns.	Äng och betesmark		0,4
675	3	Mosse vid Hallåsen, ingår i större myrkomplex som fortsätter utanför kommungränsen. Trädklädd i norra delen, öppnar sedan upp sig kring en tjärn.	Myr		7,5
676	3	Naturskogsartad lövskog på fastmarksholme i myr.	Skog och träd		4,3
677	3	Lövbrännelik successionsmark. Speciellt i den östra delen är trädsiktet glest.	Skog och träd		13,9
678	3	Hyltenäsa och Hjortenäsa mossar är ett öppet-glest trädklätt myrkomplex, med mer tätt trädklädda delar. Lokal svag påverkan från vägdragning, anslutande avverkning och dikning.	Myr		99
679	3	Ekskog med inslag av björk, tall och gran.	Skog och träd		0,6
681	3	Ballasjön är belägen söder om Boderås. Här finns uppgifter om flytsäv (VU), klotgräs (VU) och strandlummer (NT) vid de norra stränderna.	Djup sjö	flytsäv (VU), klotgräs (VU), strandlummer (NT)	32,6
685	3	Lilla Hissjön är en del av Hiåns vattensystem. Ån har här bedömts till måttlig ekologisk status eftersom den är försurad. Data saknas om kalkningen har önskad effekt. I Hiån finns också en damm men det är oklart om den utgör ett vandringshinder.	Djup sjö		6,9
687	3	Större, delvis restaurerad betesmark med viss hävdgynnad flora som stenmåra, ängsvädd och gökärt. Flera stensättningar, rösen och terrasser förekommer. Floran håller på att återkomma i restaurerade delar.	Äng och betesmark		6,9
688	3	Våksjön är en myrsjö som ingår i ett myrkomplex.	Djup sjö		4,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
689	3	Vikasjön ingår i ett myrkomplex	Djup sjö		4,5
690	3	Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid Åstarp. Både öppna och trädklädda partier förekommer.	Myr		1,3
691	3	Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid Åstarp. Både öppna och trädklädda partier förekommer.	Myr		0,7
692	3	Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid Åstarp. Både öppna och trädklädda partier förekommer.	Myr		8,8
693	3	Våtmarker kring Assman och Röstorpasjö, vid Åstarp. Både öppna och trädklädda partier förekommer.	Myr		0,2
694	3	Igenväxande betesmark intill Åstarpasjön. Vissa floravärden och närheten till vatten är positivt för naturvärdet.	Äng och betesmark		0,7
696	3	Igenväxande björkhage vid Åstarp. Ängsvädd och stagg förekommer.	Äng och betesmark		0,8
698	3	Litet bestånd med äldre tallskog vid Tossemossen.	Skog och träd		0,6
701	3	Nordsjön är en myrsjö som ingår i ett myrkomplex.	Djup sjö		3,6
703	3	Litet bestånd med äldre barrsumpskog nordväst om Axelfors.	Skog och träd		0,2
704	3	Gransumpskog norr om Annelund.	Skog och träd		0,8
705	3	Svag hävdad betesmark med en del hävdgynnad flora som stagg, knägräs, stenmåra, revfibbla och ljung. Bitvis igenväxande med gran.	Äng och betesmark		1
706	3	Gransumpskog kring bäck vid Rosensskog.	Skog och träd		1,5
707	3	Skärsjön är relativt opåverkad med ett pH runt 7, och har ornitologiska värden, med bl a häckande storlom.	Djup sjö	storlom	10,7
709	3	En liten del av Tostamossen ligger inom kommunen. Mossen är öppen-glest trädklädd och förhållandevis opåverkad. I söder rinner Höljebäcken. Svag lokal påverkan från vägdragning.	Myr		9,4
710	3	En liten del av Tostamossen ligger inom kommunen. Mossen är öppen-glest trädklädd och förhållandevis opåverkad. I söder rinner Höljebäcken. Svag lokal påverkan från vägdragning.	Myr		17
712	3	Lövskog vid Yttre Målhult. Här förekommer björk, ek, sälg, asp, klibbal och gran.	Skog och träd		1
713	3	Längs vägen öster om Yttre Målhult står ädellövträd, främst ek. I norr sluttar marken brant åt öster.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	1,1
715	3	Mosse vid tjärnen Lillesjön. Myren är flikig och	Myr		15,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		mestadels glest trädklädd. Den är förhållandevis opåverkad av mänskliga ingrepp.			
717	3	Fuktig, äldre granskog med inslag av lövträd. Kavlabrobäcken rinner genom området. Avverkning har skett i nära anslutning söder om området.	Skog och träd		1,2
718	3	Lövskogslund vid skogsväg söder om Rosensskog. Litet inslag av gran.	Skog och träd	västlig njurlav (VU)	2,3
719	3	Barrskog i sydvänd sluttning väster om Agnsjön. Gran dominerar med stort lövinslag i högre liggande delar.	Skog och träd		1,2
720	3	Ällesjön är en myrsjö i västra kanten av kommunen.	Djup sjö		2,9
721	3	Agnsjön är en myrsjö som omges av en liten öppen myr.	Djup sjö		1,4
723	3	Åstarpasjön ligger väster om golfbanan i Åstarp, längs Assman. I Assman är förhållandena vad gäller förurning och övergödning goda.	Djup sjö		11
727	3	Lillesjön ligger söder om Assman och omges av en liten myr som delvis är öppen.	Djup sjö		1,2
730	3	Mosse norr om Sjökullen som är glest trädklädd. Två små gölar förekommer. Stark lokal påverkan från torvtäkt i södra delen. Även svag lokal påverkan från anslutande avverkningar.	Myr		29,2
731	3	Sjön Opperhalen är förbunden med den större klarvattensjön Visen. En mindre del ligger inom kommunen. Sjön har problem med förurning och vandringshinder finns nedströms vilket är negativt, men den har bedömts ha måttlig ekologisk status.	Djup sjö		18,3
732	3	Visen är en stor, ganska djup klarvattensjö med steniga, klippiga delvis branta stränder. Flera näs delar sjön i flikiga vattenytor. Sjön har problem med förurning, som motverkas av kalkning. Nedströms finns vandringshinder. Liten del inom kommun.	Djup sjö		23,5
733	3	Trädklädd betesmark med vissa floravärden. I trädskiktet förekommer björk, asp, ek och ask, varav en del är något grövre.	Äng och betesmark		0,8
735	3	Blandskog kring bäck vid Övre Stångsjön.	Skog och träd		0,8
737	3	Alridå längs båda sidor om Assman vid Riskulla. Klen-medelgrov gråal och klibbal. Bitvis stort inslag av grov gran. Även hägg och björk förekommer. Fältskikt av fuktig örttyp.	Skog och träd		3
738	3	Alridå längs båda sidor om Assman vid Riskulla. Klen-medelgrov gråal och klibbal. Bitvis stort inslag av grov gran. Även hägg och björk förekommer. Fältskikt av fuktig örttyp.	Skog och träd		2,1

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
739	3	På östra sidan om Ätran, vid Store kile, ligger ett större betat område. Närmast ån består det av öppen betesmark. En brantare lövträdsbevuxen erosionssluttning löper mitt i området där det växer bl a ek, asp, sälg, tall, klibbal och hägg.	Äng och betesmark	lunglav (NT)	6,3
740	3	Ohävdad betesmark intill Ätran och en vegetationsrik korvsjö med bl a vattenaloe och dyblad samt rik förekomst av trollsländor. Viss hävdgynnad flora som slåttergubbe (VU), knägräs, vårbrodd, gökärt och harstarr finns.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	3
741	3	Korvsjö intill Ätran som helt omges av skog. I korvsjöns ytterkurva finns en erosionsbrant som huvudsakligen är bevuxen med gran samt en del gråal och tall.	Småvatten		0,8
742	3	Ohävdad betesmark i sluttning ned mot Ätran vid Axelforshed. Närmast ån finns en friskäng, och därefter en sänka med högortfuktäng och lågstarräng med hirsstarr. I sluttningen är marken torrare där fårsvingel dominerar. Viss hävdgynnad flora.	Äng och betesmark		0,9
743	3	I en skarp ytterkurva har Ätran skapat en erosionsbrant som delvis är mycket brant och delvis mer sluttande med en större källmiljö och en bäck. Vid källmiljön står gran och allmänt med död ved. Längs stranden dominerar klibbal, grova alar förekommer.	Skog och träd		0,8
747	3	Lövskog vid Karkashult.	Skog och träd		0,5
748	3	Lövskog vid en bäck i Karkashult.	Skog och träd		1
749	3	Igenväxande, ohävdad trädklädd betesmark vid Bergagärde. I en torrbacke bakom ladugården återfinns ängsvädd, backtimjan (NT) och knägräs.	Äng och betesmark	backtimjan (NT)	1,2
753	3	Sjön Karken är en långsmal sjö med delvis branta stränder som är mestadels skogklädda. Sjön kalkas för att motverka försurning.	Djup sjö		90,8
755	3	Ostvärd brant med blandskog ned mot Dalabäcken.	Skog och träd		1
756	3	Betesmark vid Ramnäs, som till hälften täcks av sluten granskog. Resten är öppet med viss hävdgynnad flora. Ansluter till en bäck.	Äng och betesmark		0,8
757	3	Barrskog vid en bäck intill en myr i Hundhult.	Skog och träd		0,4
758	3	Litet bestånd med ädellövskog vid Hundhult.	Skog och träd		0,5
759	3	Ohävdad betesmark under igenväxning i Skrotås med vissa floravärden. Gran och lövträd i trädskiktet.	Äng och betesmark		3,4
761	3	Ohävdad betesmark vid Skrotås med enstaka hävdgynnad flora som knägräs, stagg och	Äng och betesmark		0,6

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		ängsvädd. Även örnbräken och veketåg förekommer. Marken är torr-frisk och opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Mest öppet med enstaka asp och björk.			
762	3	Holsjön är i sin nordöstra del grund och har låglänta stränder och där finns öarna Stenö och Ängö med ett rikligt fågelliv. Sjön har problem med försurning och partiella vandringshinder förekommer nedströms. Värdefull för fågellivet.	Djup sjö		572,4
764	3	Klovarapasjön ligger i Långemosse. Myren i sig är kraftigt påverkad av dikning men myrsjön har troligen stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö	borsttåg (NT)	4,7
765	3	Hagmarksskog, åtminstone tidigare betad, med medelgrov-grov ek, inslag av rönn, björk, gran, sälg och asp. Hassel i buskskiktet. Blomskägglav och gullpudra har tidigare noterats i området.	Skog och träd	blomskägglav, gullpudra	3,7
767	3	Lövängsrest vid Flenstorp med enstaka hamlade gamla askar.	Skog och träd		0,7
768	3	Ekskog med inslag av björk, rönn och gran. Glest med hassel och brakved i buskskiktet. Området har tidigare hävdats genom bete.	Skog och träd		1,3
772	3	En större korvsjö vid Ätran ligger intill en hög västvänd erosionssluttning där skogen har avverkats. Området mellan korvsjön och Ätran är bevuxet med ung granskog.	Småvatten		0,5
773	3	Holmsjön ingår i myrkomplex med Trolle mosse.	Djup sjö		14
777	3	Mossasjön ingår i ett myrkomplex med Trolle mosse. Som myrsjö har den troligen stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö		3,8
780	3	Hulsjön är en liten sjö som omges av en bård av öppen myr.	Djup sjö		1,1
781	3	Mosse norr om Ugglebo med två gölar, den ena kallas Stora Agnsjön. Svag lokal påverkan från kraftledning och anslutande avverkningar.	Myr		23,3
782	3	Litet bestånd med äldre granskog med stort inslag av tall intill en myr vid Rackeryd.	Skog och träd		0,2
783	3	Litet bestånd med äldre granskog med stort inslag av tall intill en myr vid Rackeryd.	Skog och träd		0,2
784	3	Litet bestånd med äldre granskog med stort inslag av tall intill en myr vid Rackeryd.	Skog och träd		0,7
786	3	Bredsjömossen är en något större, öppen-glest trädklädd myr med mestadels intakt kantskog. Några bäckar/dråg rinner genom myren. Svag lokal påverkan från dikning och närliggande avverkning. Svagt utbildade strängstrukturer förekommer.	Myr	orre	80,2
787	3	På Mosjömossen står en bitvis gles äldre tallsumpskog på norra sidan om en göl. Skogen omges helt av avverkade ytor.	Skog och träd		5,9

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
789	3	Kring ett biflöde till Ätran, där detta rinner upp i ån, står en äldre blandskog med bla gran.	Skog och träd		0,4
790	3	Tobomossen är glest trädklädd med tall. En liten göl ligger i den västra delen. Lokal påverkan från dikning och vägdragning.	Myr		42,1
794	3	Haga Lillesjö är en liten myrsjö. Myrsjöar har ofta stor betydelse för fågellivet.	Djup sjö		0,3
795	3	Trädklädd myr intill Holsjön. Fortsätter längs en bäck. Svag lokal påverkan från vägdragning, i övrigt relativt naturlig.	Myr		21,3
796	3	Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom myren och genom tjärnen. Öppna och trädklädda partier förekommer. Avverkning bitvis i nära anslutning.	Myr		19,6
797	3	Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom myren och genom tjärnen. Öppna och trädklädda partier förekommer. Avverkning bitvis i nära anslutning.	Myr		30,9
799	3	Rudesjön omges av en myrbård som sedan övergår i barrskog. Spångaån som rinner genom sjön har måttlig ekologisk status.	Djup sjö		2
802	3	Blandsumpskog som domineras av gran kring en bäck sydväst om Boda.	Skog och träd		1,2
803	3	Korvsjö längs Ätran.	Småvatten		0,3
804	3	Nordväst om Svedjorna ligger ett brandfält där naturvårdsbränning skett. Enstaka äldre tallar står kvar. En bäck går genom området.	Skog och träd		10,6
805	3	Äldre lövrik barrskog intill en torvtäkt.	Skog och träd		1,5
806	3	Fastmarksholme med äldre lövrik skog.	Skog och träd		0,8
808	3	Korvsjö längs Ätran.	Småvatten		0,4
814	3	Korvsjö längs Ätran.	Småvatten		1,2
816	3	Bestånd med äldre tallskog som omges av avverkade ytor.	Skog och träd		0,5
817	3	Fuktig äldre tallskog intill en bäck. Avverkning har skett nordväst och sydost om området.	Skog och träd		1,4
818	3	Korvsjö längs Ätran.	Småvatten		0,2
820	3	Barrskog i en dalgång längs en meandrande bäck väster om Ätran.	Skog och träd		0,5
823	3	Avsnörd meanderslinga längs Ätran.	Småvatten		0,6
824	3	Vid Kvarnen finns en igenväxande betesmark med björkar och lövsly. Här finns fortfarande viss hävdgynnad flora som stagg, stenmåra och knägräs.	Äng och betesmark		1,1
826	3	Hagmarksskog med främst ek kring Borgaholm. Vid vägen står en värdefull ek med fällmossa. Även grynig filtlav har noterats i området.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	1,2

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
827	3	Bjällesjön är en myrsjö i denvästra kanten av kommunen.	Djup sjö		0,7
828	3	St. Fiskesjö vid Sjöganäs är en mindre tjärn som omges av barrskog och myrmark.	Djup sjö		3,1
829	3	Lilla Fiskesjö är en tjärn som ligger i anslutning till Stora Fiskesjö och omges av myrmark.	Djup sjö		1,1
831	3	Myrkomplex med Holmamossen vid Ällesjön samt myr vid Iglasjön. En bäck går genom myren och genom tjärnen. Öppna och trädklädda partier förekommer. Avverkning bitvis i nära anslutning.	Myr		3,8
832	3	Igenväxande betesmark vid Svensås. Obetad och till drygt hälften rejält igenväxt, resten är endat något igenväxt. Medelgrov ek, mycket stagg och ljung samt en del knägräs är några av de värden som finns.	Äng och betesmark		1,4
834	3	Högalidsmossen är en öppen mosse med trädklädda kanter. En bäck rinner i den södra delen. Svag lokal påverkan från dikning och anslutande avverkning, men förhållandevis opåverkad.	Myr		30,2
836	3	Vid Strömsås ligger en betesmark som har stått ohävdad i många år. Här finns dock förutsättningar för en värdefull hävdgynnad flora. Stora delar tätt med gran. Restaurering krävs.	Äng och betesmark		0,8
837	3	Avsnörd meanderslinga längs Ätran.	Småvatten		0,2
838	3	Avsnörd meanderslinga längs Ätran.	Småvatten		0,3
839	3	Betesmark vid Hiå. Obetad och i söder helt slutet av björksly. Fortfarande mycket stagg och hirsstarr. Frisk-fuktig mark. I norr ligger en anlagd damm.	Äng och betesmark		2,6
841	3	Kärr kring Hiån och Hyltebäcken vid Hestra. Öppet närmast vattnet men i kanterna finns sumpskog. Lokal påverkan från dikning.	Myr		20,8
842	3	Korsvjö/avsnörd meanderslinga vid Ätran.	Småvatten		0,8
843	3	Betesmark vid Gullskog intill Ätran. I området ligger gamla åslingor och ett småvatten med öppen vattenspegel. Bland ängsväxter märks bockrot, backnejlika (NT), stenmåra, knägräs, grönvit nattviol, ängsviol, liten blåklocka, blåsuga och harstarr.	Äng och betesmark	backnejlika (NT), grönvit nattviol	5,8
844	3	Längs grusvägen finns en ca 400 m lång sydvästvärd väggen som blommar rikligt. Här finns bl a ängsväxter som svinrot, bockrot, höskallra, liten blåklocka och skogsklöver. Dessutom finns rikligt med åkervädd där väddsandbi sökte föda.	Äng och betesmark	väddsandbi	0,4
845	3	En bäckravin med blandlövskog av främst klibbal och rönn med inslag av gran. Ravinen har branta sidor och mängden grövre död ved är tämligen stor. Bäckens skulle kunna lämpa sig	Skog och träd		0,4

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		som lekområde för öring.			
847	3	Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer sig från den omgivande gnejs-berggrunden. Berget utgörs här av hyperit. Växtligheten är därför mycket artrikare på Holmaberget än i det omgivande landskapet. I sluttningen mot väst växer lind och ek m.m.	Skog och träd		0,5
848	3	Myr vid tjärnen Häggsjön som är öppen-trädklädd. Den norra delen tycks påverkad av äldre torvtäkt och dikning.	Myr		22
850	3	Korvsjö längs Ätran	Småvatten		0,1
853	3	Korvsjö längs Ätran	Småvatten		0,1
855	3	Korvsjö längs Ätran	Småvatten		0,2
856	3	Liten övergiven åker med tre grova, tidigare hamlade askar. Inte slagen men angiven som äng. Sparsam förekomst av brudborste, även hundäxing. Guldlocksmossa och fällmossa på ask.	Äng och betesmark	guldlocksmossa, fällmossa	0,2
859	3	Vid en torprest finns äldre tall och lövträd. Området omges av avverkade ytor.	Skog och träd		1,1
860	3	Sandig erosionsbrant vid Åbygget, sydvästvärd brant som ligger till hälften i en fårbetad hage och till hälften i åkermark. I den del som ligger i åkermarken finns det rikligt med bar sand och blommande åkervädd och prästkrage m.m.	Sandmiljö		0,2
861	3	Öppen betesmark intill Ätran vid Yttre Hid. I erosionssluttningar och längs vägrenar finns blomrikare marker med bl.a. åkervädd och prästkrage. Väddsandbi har noterats längs vägen som avgränsar området i norr.	Äng och betesmark	väddsandbi	4,2
862	3	Korvsjö vid Hid. Omges av blandlövskog.	Småvatten		0,3
863	3	Korvsjö vid Hid. Omges av blandlövskog.	Småvatten		1,1
864	3	Lövskogklädd bäckravin kring Hidsbäcken. Bäckens rinner i ett brant porlande lopp genom en fårbetad hage. Bäckens omges här av en gles ridå av bl.a. klibbal, björk, och enstaka grövre asp. Vid vägen står en jätteek.	Skog och träd		3,3
866	3	Stora Hissjön är en del av Hiåns vattensystem. Ån har här bedömts till måttlig ekologisk status eftersom den är försurad. Data saknas om kalkningen har önskad effekt. I Hiån finns också en damm men det är oklart om den utgör ett vandringshinder.	Djup sjö		74,5
867	3	Korvsjö längs Ätran i Svenljunga.	Småvatten		0,3
868	3	Bandsjön är en tjärn som ingår i ett myrkomplex. Smal bård med öppen myr omger tjärnen vilken sedan ansluter barrskog och sumpskog.	Djup sjö		2,7
869	3	Svartsjösjön ligger i ett myrkomplex och omges av sumpskog. Myrsjöar är ofta värdefulla för fågellivet.	Djup sjö		7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
870	3	Korrasjön ligger väster om Mjöbäck och är värdefull bland annat för fågellivet.	Djup sjö		19,9
871	3	Hallasjön ligger i en dalgång med branta sluttningar som omger både väster och öster om. Sjön har ett pH runt 7.	Djup sjö		9,6
872	3	Stora Djupasjön är värdefull för fågellivet.	Djup sjö	granspira (NT)	35
873	3	Tjärnen är en myrgöl som omges av myr som är öppen närmast sjön. Som myrgöl har den troligen stor betydelse inte minst för fågellivet.	Djup sjö		0,5
876	3	Betesmark vid Kärralund som var under restaurering vid ängs- och betesmarksinventeringen år 2004. Om hävden har återupptagits kan det finnas värden idag.	Äng och betesmark		0,7
877	3	Betesmark vid Högshult. Obetad och igenväxande, särskilt i den södra delen. Fem vidkroniga värdefulla ekar i norr. I buskskiktet finns hallon och vide. Stagg och stenmåra förekommer.	Äng och betesmark		2,1
878	3	Nordvänd brant sluttning i äldre grus-/sandtäkt. Även plana ytor ingår. Små delar är vegetationsklädda men mest öppen sand-grusmark.	Sandmiljö		1,1
879	3	Sydvänd brant och plana ytor i gammal sand-/grustäkt. Mest öppen sand-grusmark, även vegetationstäckta områden finns.	Sandmiljö		1,2
880	3	Mosse vid Kärråsen. Mestadels glest trädklädd, men i kanterna finns även sumpskog. En liten göl ligger i de centrala delarna. I öster har dikning gett svag lokal påverkan. Äldre uppgifter om borsttåg (NT) föreligger.	Myr	borsttåg (NT)	24,6
881	3	Mosse vid Kärråsen. Mestadels glest trädklädd, men i kanterna finns även sumpskog. En liten göl ligger i de centrala delarna. I öster har dikning gett svag lokal påverkan. Äldre uppgifter om borsttåg (NT) föreligger.	Myr	borsttåg (NT)	4,7
882	3	Betesmark vid Tocknarås där röjning/restaurering delvis har skett. Ingen-svag hävd och relativt tätt trädsikt. I floran finns bl.a slåttergubbe (VU) och knägräs och enstaka värdefulla träd förekommer.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	1,4
883	3	Mjöasjön ligger i den västra kanten av kommunen, och gränsen går i mitten av sjön. Sjön hade vid den senaste mätningen år 2005 ett pH runt 7.	Djup sjö		38,6
884	3	Ramnasjön är en mindre sjö omgiven av öppen mark som övergår i skog. Lilla Häggån rinner igenom sjön. Försurning motverkas genom kalkning. Bottenfaunaprovtagning visar att detta fungerar. Vandringshinder finns i vattensystemet.	Djup sjö		6,3
885	3	Lilla Hallången är en långsmal sjö i nord-sydlig riktning. Sjön har problem med försurning och	Djup sjö		80,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		kalkas men biologiska data saknas. En kraftverksdamm vid sjöns utlopp mot Stora Hallången utgör ett definitivt vandringshinder för fisk.			
886	3	Sydostvänd brant med äldre blandskog vid Uvebo. Avverkning har skett norr om branten.	Skog och träd		0,6
888	3	Östvänd brant söder om Hid, klädd med blandskog.	Skog och träd		1
890	3	Lövskogslund vid Hingården. Lunglav (NT) och grynig filtlav (NT) har noterats.	Skog och träd	lunglav (NT), grynig filtlav (NT)	0,9
891	3	Öppen betesmark vid Björlida. Näringspåverkat men här finns ändå en del hävdgynnad flora som stagg, stenmåra och slåttergubbe (VU).	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	0,7
895	3	Äldre granskog längs Galtabäcken.	Skog och träd		1,4
898	3	Betesmark vid Ararp, till stor del igenväxt men med floravärden som kan öka vid en restaurering.	Äng och betesmark		0,8
899	3	Barrskogsklädd västvänd brant söder om Överbryn.	Skog och träd		2,6
903	3	I en sydostvänd brant finns ett mindre parti med äldre blandskog som omges av ungskog och avverkningar.	Skog och träd		0,5
905	3	Mestadels trädklädd myr där tall dominerar, med fyra små gölar. Svag lokal påverkan från dikning.	Myr		15,5
908	3	Liten betesmark vid Getås. En del hävdgynnade arter som blodrot, grönvit nattviol, gökärt, revfibbla, rotfibbla, stagg, stenmåra och ängsvädd. Enstaka asp, björk, gran, lönn, rönn, en och rosbuskar. Svag hävd. Delvis tydlig näringspåverkan.	Äng och betesmark	grönvit nattviol	0,2
909	3	Öppen och trädklädd mosse vid Getås. Svag påverkan från intilliggande avverkning	Myr		5,1
910	3	Myr öster om Bäckalund. Myren är öppen-glest trädklädd. I öster omges den av åkermark, och i övriga riktningar av barrskog och kalhyggen. Svag lokal påverkan från avverkningar. Hydrologisk förbunden med mossar nordväst om objektet.	Myr		10,1
911	3	Kårtesjön ingår i myrkomplexet vid Hestra- och Hultamossen och har troligen stor betydelse inte minst för fågellivet.	Djup sjö		33,4
912	3	Lillesjön ligger intill Stommamossen. Som myrgöl har den betydelse för fågellivet.	Djup sjö		6,6
914	3	Litet lövskogsparti i brant ostsluttning vid Mjöbäck. Ansluter till bebyggelse nedanför sluttningen. Medelgrov-grov ek med inslag av björk och asp samt enstaka gran och tall. En kraftledningsgata går i de högre liggande delarna.	Skog och träd	lunglav (NT)	0,8

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvärdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
915	3	Apelnässjön har ornitologiska värden. Sjön är relativt näringsfattig med starr, notblomster och näckrosor. Sjön är inte försurad.	Djup sjö	lommar (obekräftade uppg)	34,7
919	3	Fuktäng vid Öbranstorp. Var vid ängs- och betesmarksinventeringen igenväxt med sly, men restaurerbar.	Äng och betesmark		0,2
921	3	Björnsjön ligger i Vassgårdenområdet. Sjön har vissa ornitologiska värden.	Djup sjö	lommar (obekräftade uppg)	40,5
925	3	Vid Svartsjöns norra strand i Tokabo ligger en igenväxande betesmark. Vissa floravärden finns.	Äng och betesmark	borsttåg (NT)	0,8
928	3	Hagmarksskog vid Asserbo med bl. a. bok samt enstaka alm. Grynig filtlav (NT) har noterats.	Skog och träd	grynig filtlav (NT)	0,5
935	3	Ohävdad betesmark vid Klackhult med många stora granar. Här förekommer rikligt med stagg och stenmåra. Även grönvit nattviol och en del andra hävdgynnade arter förekommer. Ligger vid en välbevarad gårdsmiljö med hamlade träd och gamla byggnader.	Äng och betesmark	grönvit nattviol	2,1
940	3	Abborrsjön är en myrsjö i den östra delen av kommunen. Myrsjöar har ofta stor betydelse inte minst för fågellivet.	Djup sjö		1,7
941	3	Flymossen är öppen och glest trädklädd i kanterna. En bäck rinner i den södra kanten. Svag lokal påverkan från äldre dikning och väg.	Myr		9,5
942	3	Flymossen är öppen och glest trädklädd i kanterna. En bäck rinner i den södra kanten. Svag lokal påverkan från äldre dikning och väg.	Myr		14
947	3	Blandlövskog längs Ätran strax norr om Östra Frölunda. Gråal, asp, hägg och björk dominerar, och enstaka grov ek där fällmossa och rostfläck noterats. Tämigen stor mängd död ved både på land och i vattnet.	Skog och träd	fällmossa, rostfläck	5,6
948	3	Blandlövskog längs Ätran strax norr om Östra Frölunda. Gråal, asp, hägg och björk dominerar, enstaka grov ek där fällmossa och rostfläck noterats. Tämigen stor mängd död ved både på land och i vattnet.	Skog och träd	fällmossa, rostfläck	1,2
950	3	Hagmarksskog vid borgruinen Kinnahus intill Ätran. Medelgrov-grov ek, björk, tall, säl, apel, rönn, asp och gran. Värdefull asp, björk, ek, rönn, säl och tall finns. Svagt hävdad, bergrör täcker stora delar.	Skog och träd		1,7
951	3	Igenväxande betesmarker längs Ätran söder om Kinnahus. Partier med rester av ängsvegetation: rikligt med svinrot, gökärt, liten blåklocka, knägräs, ängsvädd, samt enstaka grönvit nattviol.	Äng och betesmark	grönvit nattviol	6,8
953	3	Småvatten och korvsjö i åkermark intill Ätran. Smal lövridå.	Småvatten		0,8
954	3	Barrsumpskog öster om Vränglarp.	Skog och träd		0,5

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
956	3	Större korvsjö med öppen vattenspegel vid Ätran. I väster kantas den av ung gråal.	Småvatten		1,4
957	3	Trädklädd mosse, öppen i centrala delar. Förhållandevis opåverkad. Del av myrkomplex med Hästömossen. Fortsätter utanför kommungräns.	Myr		6,1
958	3	Mestadels glest trädklädd myr med några öppna partier. Svag lokal påverkan från dikning men relativt orörd. Fortsätter öster om kommungräns.	Myr		10,1
959	3	Blandskogsklädd västvänd brant öster om Skönabäck. Området har ornitologiska värden.	Skog och träd		0,4
960	3	Trädklädd betesmark vid Kvarnagården. Bitvis slutet trädskikt, ek dominerar med inslag av björk, sälg, lönn, lind och asp. En del hävdgynnad flora.	Äng och betesmark		3,8
961	3	Spångån mellan Fegen och Stångån har ett meandrande lopp.	Vattendrag		4,5
962	3	Vid Boderås finns äldre hagmarker, och tidigare slåtterängar som numera är ohävdade. Trädskiktet domineras av medelgrov-grov ek, inslag av björk samt enstaka lind, ask, asp, apel, sälg, hägg. Hassel och en i buskskikt. Igenväxande.	Äng och betesmark		6,3
965	3	Remmemosse är en delvis öppen mosse, glest trädklädd i kanterna och med inslag av tallsumpskog. I den västra delen rinner en bäck. Mossen är förhållandevis orörd. I nordost förekommer ett parti som är svagt påverkat av dikning.	Myr		35,5
966	3	Trädklädd mosse, öppen i centrala delar. Förhållandevis opåverkad. Del av myrkomplex med Hästömossen. Fortsätter utanför kommungräns.	Myr		2,1
967	3	Betesmark under igenväxning i Börtégårde. Här förekommer mycket björksly och hallon. Mer allmänna hävdgynnade arter finns kvar, även slåttergubbe (VU) har noterats. Marken är ogödslad i modern tid.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	2,3
969	3	Byggesmossen är en mestadels öppen myr som är förhållandevis opåverkad av mänskliga ingrepp. Svagt utbildade strängstrukturer förekommer.	Myr		22
970	3	Långefly är en glest trädklädd mosse med både öppna- och sumpskogspartier. En bäck rinner i den södra delen. Svag lokal påverkan från angränsande väg. Myren ansluter till den lilla sjön Agnsjön i nordväst.	Myr		37,9
972	3	Äldre tallskog strax norr om Akarnemossen.	Skog och träd		0,5
973	3	Ängåsamossen breder ut sig kring tjärnen Baljesjön och utgörs av öppna och trädklädda	Myr		99,9

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		delar samt fastmarksholmar. Ytterligare två små tjärnar ingår i området. I myren syns spår av äldre dikning lokalt, vilket gett svag påverkan.			
975	3	Håvsjön är en del av Stångåns vattensystem. Här finns problem med definitiva vandringshinder samt försurning.	Grund sjö		6,1
977	3	Delvis ohävdad fuktäng, resten svagt hävdad. Enstaka hävdgynnade arter som hirsstarr och stagg. Mest öppen men enstaka al, en, gran och viden förekommer. Opåverkad av produktionshöjande åtgärder. Ett dike går genom området.	Äng och betesmark		1,1
979	3	Lilla Häggån från Stora Apelnäs till kommungränsen. Bottenfauna visar på hög status, försurning motverkas genom kalkning. Vandringshinder förekommer nedströms.	Vattendrag		1,5
980	3	Bergabäcken uppströms Bergsfors. Goda uppväxtmöjligheter, ståndplatser för öring, även lekplatser. Definitivt vandringshinder finns dock vid Bergsfors. Fisktrappa finns men är ur funktion.	Vattendrag		0,7
981	3	Öppen betesmark intill Stångån vid Håcksvik. Viss hävdgynnad flora som knägräs, revfibbla och ängsvädd förekommer. Marken är frisk-fuktig-våt. Längs ån finns en ridå av främst al, asp och björk. Vålhävdad.	Äng och betesmark		2,6
982	3	Ätran mellan Karlsdal och Ekebo. Orensad, lugnflytande sträcka. Skuggning och andelen död ved i vattnet är låg. Lekplatser eller uppväxtområden för öring saknas. Förekomsten av fisk är låg i förhållande till omgivande vatten. Vandringshinder finns.	Vattendrag		2,7
984	3	Mestadels lugnflytande sträcka av Ätran mellan Hillared och Ledsgården. Skuggningen är låg och andelen död ved i vattnet måttlig. Förutsättningar för öring saknas. Sträckan är svagt rensad. Fisktätheter är lägre än vad som kan förväntas.	Vattendrag		5,4
985	3	Ett ca 200 m långt strömmande-svagt strömmande parti av Ätran vid Ledsgården. Här finns förutsättningar för öring. Ingen-måttlig skuggning, andelen död ved i vattnet är låg. Försiktig rensning har skett.	Vattendrag		0,5
986	3	Ätran vid Kila har ett svagt strömmande till lugnflytande lopp. Ingen beskuggning och andelen död ved i vattnet är låg. I princip saknas förutsättningar för öring.	Vattendrag		1,3
987	3	Vid Kila finns en ca 200 m lång forsande-strömmande sträcka som flottledsrensats kraftigt. Lite död ved och låg beskuggning. Här finns lekplatser och uppväxtområden för öring. Sidofåror utnyttjas av öring för sin rekrytering.	Vattendrag		0,8

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
988	3	Lugnflytande sträcka uppströms Buttorp. Måttlig beskuggning med tämligen god tillgång på död ved i vattnet. Försiktig rensning har skett. Enstaka ståndplatser för större öring.	Vattendrag		2,6
990	3	Nedströms Buttorp ligger en meandrande sträcka av Ätran som här är lugnflytande. Måttlig beskuggning och död ved i måttlig mängd. Ståndplatser för större öring finns, dock saknas lekmiljöer och uppväxtområden.	Vattendrag		5,4
991	3	Ätran vid Broholm är strömmande med inslag av forsande partier i delen söder om bron. Beskuggning måttlig-låg, liten andel död ved i vattnet. Sträckan är försiktig-kraftigt rensad. Det finns möjliga lekplatser, uppväxtområden och ståndplats för öring.	Vattendrag		0,7
992	3	Mestadels lugnflytande parti av Ätran vid Hagalund. Tämligen goda ståndplatser för öring förekommer. Liten mängd död ved och beskuggningen är låg-måttlig. Rensning har förekommit.	Vattendrag		3,5
993	3	En 300 m lång strömmande sträcka av Ätran ligger söder om Hagalundssjön. Botten består av sten, sand samt enstaka block. Inga tydliga spår av rensning finns. En hel del undervattensvegetation av slinga, långa och vattenpest.	Vattendrag		0,7
994	3	Mestadels lugnflytande sträcka av Ätran söder om Hagalund. Viss rensning har skett.	Vattendrag		4,4
995	3	Lugnflytande-svagt strömmande meandrande sträcka av Ätran vid Stommen. Liten-måttlig mängd död ved i vattnet. Beskuggningen är låg-måttlig. Viss rensning har skett.	Vattendrag		9,2
997	3	Lugnflytande-svagt strömmande parti av Ätran uppströms Ljungafors. Data från elfisken saknas.	Vattendrag		7,5
998	3	Vid Ljungafors vidgar Ätran sig till en kraftverksdamm vid Ljungafors kraftstation. Kraftstationen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk, inklusive öring.	Vattendrag		2,1
999	3	Ätran från sammanflödet med Lillån till Axelfors kraftstation. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns vandringshinder nedströms.	Vattendrag		27,9
1000	3	Ätran från Ljungafors kraftstation till sammanflödet med Lillån. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns vandringshinder nedströms.	Vattendrag		2,3
1001	3	Ätran från sammanflödet med Assman till sammanflödet med Lillån vid Östra Frölunda. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns vandringshinder nedströms.	Vattendrag		45,2

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
1002	3	Ätran från Axelfors kraftstation till sammanflödet med Assman. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns vandringshinder nedströms.	Vattendrag		7,4
1003	3	Ovan Assmans utlopp i Ätran finns ett kortare forsande parti där det ligger en del död ved. Vid elfiske har här fångats enstaka öring, elritsa samt gott om bergsimpa.	Vattendrag		2,3
1004	3	Ätran från Östra Frölunda till Strömsåsen. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns vandringshinder nedströms.	Vattendrag		29,7
1005	3	Längs en rak sträcka av Ätran vid Strömsåsen ligger ett ca 1 km långt parti med svagt strömmande-forsande vatten. Ungefär en femtedel av sträckan är forsande. Området ser ut att lämpa sig väl för större öring. Död ved i liten mängd.	Vattendrag		3,4
1006	3	Ätran från Norrströmmen till Skåpanäs. Sträckan har bedömts till måttlig ekologisk status eftersom det finns flera vandringshinder nedströms. Strandzonerna är uppodlade och därmed inte naturliga vilket också är negativt.	Vattendrag		35,3
1007	3	Assman från kommungräns till kraftstation vid Bratteborg. Vattendraget har hög status vad gäller näringsämnen och förurning, men flera definitiva vandringshinder förekommer.	Vattendrag		2,3
1008	3	Assman mellan kraftstationerna Bratteborg/Strömsfors och Åstafors/Risa kvarn. Vattendraget har hög status vad gäller näringsämnen och förurning, men flera definitiva vandringshinder förekommer.	Vattendrag		2,5
1009	3	Assman mellan kraftstationer vid Risa kvarn och Fredriksborg. Vattendraget har hög status vad gäller näringsämnen och förurning, men flera definitiva vandringshinder förekommer.	Vattendrag		17,9
1010	3	Assman mellan kraftstationer i Fredriksborg och Röstorp. Vattendraget har hög status vad gäller näringsämnen och förurning, men flera definitiva vandringshinder förekommer.	Vattendrag		6,2
1011	3	Assman från kraftstation Röstorp till utloppet i Ätran. Vattendraget har hög status vad gäller näringsämnen och förurning, men flera definitiva vandringshinder förekommer.	Vattendrag		10,5
1012	3	Lillån från utloppet i Ätran till kraftstation Mölneby. Ån har bedömts till måttlig ekologisk status. Vandringshinder förekommer. Ån är försurad, vilket motverkas genom kalkning. Biologiska data för att verifiera kalkningseffekten saknas dock.	Vattendrag		0
1013	3	Lillån från Kalvsjön till kraftstation Mölneby. Ån har bedömts till måttlig ekologisk status.	Vattendrag		30,7

Naturvärdesobjekt	Prel. naturvärdesklass	Beskrivning	Naturtyp	Naturvårdsarter (artportalen m.fl.)	Area (ha)
		Vandringshinder förekommer. Ån är försurad, vilket motverkas genom kalkning. Biologiska data för att verifiera kalkningseffekten saknas dock.			
1014	3	Stångån från Mölleberg till Kalvsjön. Den sista sträckan innan utloppet kallas Kättarpsån. Ån har måttlig ekologisk status, och problem med vandringshinder och försurning. Ån kalkas.	Vattendrag		12,4
1015	3	Stångån från Håvsjön till Mölleberg. Genom Håcksvik har ån ett starkt meandrande lopp. Flera grunda sjöar och tidvis vattenfyllda mader ansluter till ån.	Vattendrag		14,2
1016	3	Stångån uppströms Håvsjön, här även kallad Håcksviksån, är kraftigt meandrande och rinner genom åkermark. Ån är starkt försurad och kalkning tycks inte ge önskad effekt.	Vattendrag		3,3
1017	3	Drägvedsån från kraftstationen i Kvarnagärde till Håvsjön har i nedre delar ett meandrande lopp. Vandringshinder förekommer. Ån är försurad men det motverkas genom kalkning.	Vattendrag		9,8
1018	3	Drägvedsån från Dräggsjön till kraftstationen i Kvarnagärde där ån vidgas till en damm. Vandringshinder förekommer. Ån är försurad men det motverkas genom kalkning.	Vattendrag		2
1019	3	Kvarnatorpsån uppströms Fegen. Ån har problem med försurning och vandringshinder. Provfisken visar på ett svagt fiskbestånd som saknar öring, men gädda, lake, abborre och elritsa förekommer.	Vattendrag		1,4
1020	3	Lillån från Herrekvarn till utloppet i Ätran. God-hög status vad gäller näringsämnen och försurning.	Vattendrag		0,4
1021	3	Lillån från Simmesjön till Herrekvarn. Kvarnen utgör ett vandringshinder. God-hög status vad gäller näringsämnen och försurning.	Vattendrag		7,4
1022	3	Bergabäcken uppströms Ätran. Denna sträcka är rätad med lugnflytande vatten. Betesmark går ned till bäcken längst i öster, där bråte ansamlas vid stängslet vilket skapar ett vandringshinder.	Vattendrag		0,6
235	4	Relativt lågvuxen blandsumpskog öster om Svenljunga. En bäck rinner genom området.	Skog och träd		4,5
292	4	Liten, välhävdat, opåverkad äng. Enstaka björk, ek, hassel och rönn. Torr-frisk mark med slåttergubbe, stenmåra, svinrot, ängshavre och ängsvädd.	Äng och betesmark	slåttergubbe (VU)	0,2
583	4	Tallsumpskog med stort inslag av gran samt glasbjörk. Gamla senvuxna granar rikligt förekommande. Talltorrakor förekommer sparsamt. Ingår i naturreservat.	Skog och träd		0,7